

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Bosutinib Onkogen 100 mg filmom obložene tablete **Bosutinib Onkogen 500 mg filmom obložene tablete** bosutinib

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Bosutinib Onkogen i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosutinib Onkogen
3. Kako uzimati Bosutinib Onkogen
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bosutinib Onkogen
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Bosutinib Onkogen i za što se koristi

Bosutinib Onkogen sadrži djelatnu tvar bosutinib. Koristi se u liječenju odraslih bolesnika s jednom vrstom leukemije koja se zove kronična mijeloična leukemija (KML) s pozitivnim Philadelphia kromosomom (Ph-pozitivni), u kojih je bolest novodijagnosticirana ili u kojih prethodni lijekovi za liječenje KML-a nisu bili uspješni ili nisu bili prikladni. Ph-pozitivna KML je rak krvi kod kojeg tijelo stvara previše određenih bijelih krvnih stanica koje se zovu granulociti.

Ako imate pitanja o djelovanju lijeka Bosutinib Onkogen ili o razlogu zašto Vam je lijek propisan, obratite se svom liječniku.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosutinib Onkogen

Nemojte uzimati Bosutinib Onkogen

- ako ste alergični na bosutinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako Vam je liječnik rekao da imate oštećenu jetru i da ne funkcionira normalno.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Bosutinib Onkogen

- **ako imate, ili ste u prošlosti imali probleme s jetrom.** Obavijestite svog liječnika ako ste imali u povijesti bolesti probleme s jetrom, uključujući hepatitis (infekciju ili upalu jetre) bilo koje vrste, ili ste u prošlosti imali bilo koji od sljedećih znakova i simptoma problema s jetrom: svrbež, žutu boju bjeloočnica ili kože, tamnu boju mokraće, bol ili nelagodu u desnom gornjem dijelu trbuha. Vaš liječnik mora zatražiti pretrage krvi kako bi provjerio funkcionira li Vaša jetra ispravno prije početka liječenja lijekom Bosutinib Onkogen, za vrijeme prva 3 mjeseca liječenja lijekom Bosutinib Onkogen i kad god je to klinički indicirano.
- **ako imate proljev i povraćate.** Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma: porast u dnevnom broju stolica (pražnjenja crijeva) u odnosu na uobičajeno, porast epizoda povraćanja, krv u povraćenom sadržaju, stolici

(pražnjenju crijeva) ili mokraći, ili ako imate crne stolice (boje katrana). Morate pitati svog liječnika može li liječenje koje uzimate protiv povraćanja povećati opasnost od srčanih aritmija. Naročito to morate pitati svog liječnika ako želite koristiti lijek koji sadrži domperidon za liječenje mučnine i/ili povraćanja. Liječenje mučnine ili povraćanja takvim lijekovima zajedno s lijekom Bosutinib Onkogen može povećati opasnost od srčanih aritmija.

- **ako imate problema s krvarenjem.** Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma kao što je neuobičajeno krvarenje ili stvaranje modrica bez ozljede.
- **ako imate infekciju.** Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma kao što su vrućica, problemi s mokraćom poput pečenja za vrijeme mokrenja, novonastali kašalj, ili novonastala grlobolja.
- **ako imate zadržavanje tekućine.** Obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih znakova i simptoma zadržavanja tekućine tijekom liječenja lijekom Bosutinib Onkogen kao što su oticanje gležnjeva, stopala ili nogu; otežano disanje, bol u prsnom košu ili kašalj (to mogu biti znakovi zadržavanja tekućine u plućima ili prsnom košu).
- **ako imate problema sa srcem.** Obavijestite svog liječnika ako imate srčani poremećaj kao što su aritmije ili poremećaj provođenja električnih impulsa pod nazivom “produljenje QT intervala”. To je uvijek važno, ali naročito ako imate česti ili dugotrajni proljev kako je gore opisano. Ako se onesvijestite (gubitak svijesti) ili imate nepravilne otkucaje srca dok uzimate Bosutinib Onkogen, odmah obavijestite liječnika jer to može biti znak ozbiljnog stanja srca.
- **ako Vam je rečeno da imate problema s bubrežima.** Obavijestite svog liječnika ako mokrite češće i u povećanim količinama, a mokraća je blijede boje ili ako mokrite rjeđe i u smanjenim količinama, a mokraća je tamne boje. Također obavijestite svog liječnika ako gubite na težini ili Vam otiču stopala, gležnjevi, noge, ruke ili lice.
- **ako ste ikada imali ili možda trenutno imate infekciju virusom hepatitisa B.** To je potrebno jer Bosutinib Onkogen može uzrokovati ponovnu aktivaciju hepatitisa B što u nekim slučajevima može rezultirati smrtnim ishodom. Prije početka liječenja liječnik će pažljivo pregledati bolesnike radi utvrđivanja eventualnih znakova te infekcije.
- **ako imate ili ste imali probleme s gušteračom.** Obavijestite svog liječnika ako osjetite bol ili nelagodu u trbuhu.
- **ako imate bilo koji od ovih simptoma: ozbiljne kožne osipe.** Obavijestite svog liječnika ako razvijete bilo koji od sljedećih znakova i simptoma: bolni osip crvene ili ljubičaste boje koji se širi i mjehuriće i/ili druge ranice koje se počinju javljati na sluznicama (primjerice, usta i usnice).
- **ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma: bol u slabinama, krv u mokraći ili smanjenu količinu mokraće.** Kada je Vaša bolest vrlo teška, Vaše tijelo možda neće moći eliminirati sve otpadne tvari iz odumirućih stanica raka. To se naziva sindrom lize tumora i može uzrokovati zatajenje bubrega i probleme sa srcem unutar 48 sati od prve doze lijeka Bosutinib Onkogen. Vaš liječnik je svjestan toga i može osigurati da ste odgovarajuće hidrirani i dati. Vam druge lijekove koji će pomoći to spriječiti.

Sunčanje/UV zaštita

Možete postati osjetljiviji na sunce ili UV zrake dok se liječite sa bosutinibom. Važno je da zaštitite područja tijela izložena suncu i koristite sredstva za sunčanje sa visokim faktorom zaštite od sunca (SPF).

Djeca i adolescenti

Bosutinib Onkogen se ne preporučuje u osoba mlađih od 18 godina. Ovaj lijek nije ispitan u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Bosutinib Onkogen

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta, vitamine i biljne lijekove. Određeni lijekovi mogu utjecati na razine lijeka Bosutinib Onkogen u Vašem tijelu. Morate obavijestiti svog liječnika ako uzimate lijekove koji sadrže djelatne tvari poput ovih navedenih u nastavku:

Sljedeće djelatne tvari mogu povećati rizik od nuspojava s lijekom Bosutinib Onkogen:

- ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol i flukonazol, koji se koriste za liječenje gljivičnih infekcija.
- klaritromicin, telitromicin, eritromicin i ciprofloksacin, koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija.
- nefazodon, koji se koristi za liječenje depresije.
- mibefradil, diltiazem i verapamil, koji se koriste za smanjivanje krvnog tlaka u osoba s visokim krvnim tlakom.
- ritonavir, lopinavir/ritonavir, indinavir, nelfinavir, sakvinavir, atazanavir, amprenavir, fosamprenavir i darunavir, koji se koriste za liječenje virusa humane imunodeficijencije (HIV)/SIDA.
- boceprevir i telaprevir, koji se koriste za liječenje hepatitisa C.
- aprepitant, koristi se za sprječavanje i kontrolu mučnine i povraćanja.
- imatinib, koji se koristi za liječenje jedne vrste leukemije.
- krizotinib, koji se koristi za liječenje jedne vrste raka pluća koja se zove rak pluća nemalih stanica.

Sljedeće djelatne tvari mogu smanjiti učinkovitost lijeka Bosutinib Onkogen:

- rifampicin, koji se koristi za liječenje tuberkuloze.
- fenitoin i karbamazepin, koji se koriste za liječenje epilepsije.
- bosentan, koji se koristi za snižavanje visokog krvnog tlaka u plućima (plućna arterijska hipertenzija).
- nafcilin, antibiotik koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija.
- gospina trava (biljni pripravak koji se nabavlja bez recepta), koja se koristi za liječenje depresije.
- efavirenz i etravirin, koji se koriste za liječenje infekcija prouzročenih virusom HIV-a/SIDA-e.
- modafinil, koji se koristi za liječenje određenih vrsta poremećaja spavanja.

Te lijekove treba izbjegavati za vrijeme Vašeg liječenja lijekom Bosutinib Onkogen. Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, obavijestite svog liječnika. Vaš liječnik može promijeniti dozu navedenih lijekova, promijeniti dozu lijeka Bosutinib Onkogen ili Vas prebaciti na drugačiji lijek.

Sljedeće djelatne tvari mogu utjecati na srčani ritam:

- amiodaron, dizopiramid, prokainamid, kinidin i sotalol, koji se koriste za liječenje srčanih poremećaja.
- klorokin, halofantrine, koji se koriste za liječenje malarije.
- antibiotici klaritromicin i moksifloksacin, koji se koriste za liječenje bakterijskih infekcija.
- haloperidol, koji se koristi za liječenje psihičkih bolesti poput shizofrenije.
- domperidone, koji se koristi za liječenje mučnine i povraćanja ili za poticanje stvaranja majčinog mlijeka.
- metadon, koji se koristi za liječenje boli.

Ti se lijekovi moraju uzimati uz oprez za vrijeme liječenja lijekom Bosutinib Onkogen. Ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, obavijestite svog liječnika.

Ovdje navedeni lijekovi možda nisu jedini koji mogu imati uzajamno djelovanje s lijekom Bosutinib Onkogen.

Bosutinib Onkogen s hranom i pićem

Nemojte uzeti Bosutinib Onkogen s grejpom ili sokom od grejpa, jer to može povećati rizik od nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Bosutinib Onkogen se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće, osim ako je to nužno, jer može naškoditi nerođenom djetetu. Ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjeti, prije uzimanja lijeka Bosutinib Onkogen zatražite savjet od svoga liječnika.

Žene koje uzimaju Bosutinib Onkogen će se savjetovati da koriste učinkovitu kontracepciju tijekom liječenja i do najmanje mjesec dana nakon zadnje doze. Povraćanje ili proljev mogu smanjiti učinkovitost peroralne kontracepcije.

Postoji rizik da liječenje lijekom Bosutinib Onkogen može uzrokovati smanjenu plodnost i možda ćete htjeti potražiti savjet oko pohranjivanja sperme prije početka liječenja.

Obavijestite svog liječnika ako dojite. Nemojte dojiti za vrijeme liječenja lijekom Bosutinib Onkogen jer bi to moglo naškoditi Vašem djetetu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako imate omaglicu, zamagljeni vid ili se osjećate neuobičajeno umorno, nemojte voziti ni upravljati strojevima sve dok te nuspojave ne prođu.

Bosutinib Onkogen sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Bosutinib Onkogen

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Bosutinib Onkogen će Vam propisati jedino liječnik koji ima iskustva s lijekovima za liječenje leukemije.

Doziranje i način primjene

Preporučena doza je 400 mg jedanput dnevno u bolesnika s novo dijagnosticiranim KML-om. Preporučena doza je 500 mg jedanput dnevno u bolesnika u kojih prethodni lijekovi za liječenje KML- a nisu bili učinkoviti ili nisu prikladni. U slučaju umjerenih ili teških problema s bubrezima, Vaš liječnik će Vam smanjiti dozu uzetu jednom dnevno za 100 mg kod umjerenih problema s bubrezima i za dodatnih 100 mg jednom dnevno kod teških problema s bubrezima. Vaš liječnik može prilagoditi dozu primjenom tableta od 100 mg ovisno o Vašem zdravstvenom stanju, o Vašem odgovoru na liječenje i/ili o bilo kojoj nuspojavi. Uzimajte tabletu (tablete) jedanput dnevno s hranom. Progutajte tabletu (tablete) cijelu/cijeles s vodom.

Ako uzmete više lijeka Bosutinib Onkogen nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više tableta lijeka Bosutinib Onkogen ili veću dozu nego što ste trebali, odmah se obratite svom liječniku za savjet. Ako je moguće, pokažite liječniku pakiranje ili ovu uputu. Možda Vam je potrebna medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Bosutinib Onkogen

Ako je od propuštene doze prošlo manje od 12 sati, uzmite svoju preporučenu dozu. Ako je od propuštene doze prošlo više od 12 sati, uzmite sljedeću dozu u predviđeno vrijeme sljedećeg dana.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene tablete.

Ako prestanete uzimati Bosutinib Onkogen

Nemojte prestati uzimati Bosutinib Onkogen ako Vam to nije rekao liječnik. Ako ne možete uzeti lijek onako kako Vam je liječnik propisao ili ako osjećate da Vam više nije potreban, odmah se obratite svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava morate odmah obavijestiti Vašeg liječnika (pogledajte također dio 2 "Što morate znati prije nego počnete uzimati Bosutinib Onkogen"):

Poremećaji krvi. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih simptoma: krvarenje, vrućicu ili lako stvaranje modrica (možda imate poremećaj krvi ili limfnog sustava).

Poremećaji jetre. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih simptoma: svrbež, žutu boju bjeloočnica ili kože, tamnu boju mokraće i bol ili nelagodu u gornjem desnom dijelu trbuha ili vrućicu.

Poremećaji želuca/crijeva. Obavijestite svog liječnika ako osjetite bol u trbuhu, žgaravicu, proljev, zatvor, mučninu i povraćanje.

Problemi sa srcem. Obavijestite svog liječnika ako imate srčani poremećaj kao što je poremećaj provođenja električnih impulsa pod nazivom "produljenje QT intervala", ili ako se onesvijestite (gubitak svijesti) ili ako imate nepravilne otkucaje srca dok uzimate Bosutinib Onkogen.

Ponovna aktivacija hepatitisa B. Ponovna pojava (ponovna aktivacija) infekcije virusom hepatitisa B ako ste u prošlosti imali hepatitis B (infekciju jetre).

Teške kožne reakcije. Odmah obavijestite svog liječnika ako imate ijedan od ovih simptoma: bolni osip crvene ili ljubičaste boje koji se širi i mjehuriće i/ili druge ranice koje se počinju javljati na sluznicama (primjerice, usta i usnice).

Nuspojave lijeka Bosutinib Onkogen mogu uključivati:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- smanjeni broj krvnih pločica, crvenih krvnih stanica i/ili neutrofila (vrsta bijelih krvnih stanica).
- proljev, povraćanje, bol u trbuhu, mučnina.
- vrućica, oticanje ruku, stopala ili lica, umor, slabost.
- infekcija dišnih putova.
- upala sluznice nosa i ždrijela (nazofaringitis).
- promjene u pretragama krvi kojima se utvrđuje utječe li Bosutinib Onkogen na Vašu jetru i/ili gušteraču, bubrege.
- smanjeni apetit.
- bol u zglobovima, bol u leđima.
- glavobolja.
- kožni osip, koji može biti praćen svrbežom i/ili je generaliziran.
- kašalj.
- nedostatak zraka.
- osjećaj nestabilnosti (omaglica).
- tekućina u plućima (pleuralni izljev).
- svrbež.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- niski broj bijelih krvnih stanica (leukopenija).
- nadražnost želuca (gastritis), krvarenje iz želuca ili crijeva.
- bol u prsnom košu, bol.
- toksično oštećenje jetre, neuobičajena jetrena funkcija uključujući poremećaj jetre.
- infekcija pluća (upala pluća), gripa, bronhitis.
- poremećeni srčani ritam koji povećava sklonost nesvjestici, omaglici i osjećaju lupanja srca.
- povećanje krvnog tlaka.
- visoke razine kalija u krvi, niske razine fosfora u krvi, prekomjerni gubitak tjelesnih tekućina dehidracija).
- bol u mišićima.
- promjene u osjećaju okusa (disgeuzija).
- akutno zatajenje bubrega, zatajenje bubrega, oštećenje bubrega.
- tekućina oko srca (perikardijalni izljev).
- zvonjava u ušima (tinitus).
- koprivnjača, akne.
- reakcija fotoosjetljivosti (osjetljivost na UV zrake, sunčane ili nekih drugih izvora svjetla).
- alergijska reakcija.
- neuobičajeno visoki krvni tlak u plućnim arterijama (plućna hipertenzija).
- akutna upala gušterače (akutni pankreatitis).
- zatajenje disanja.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- vrućica povezana s niskim brojem bijelih krvnih stanica (febrilna neutropenija).
- oštećenje jetre.
- po život opasna alergijska reakcija (anafilaktički šok).
- neuobičajeno nakupljanje tekućine u plućima (akutni plućni edem).
- izbijanje kožnih promjena.
- upala srčane ovojnice (perikarditis).
- značajno smanjenje broja granulocita (jedne vrste bijelih krvnih stanica).
- teški kožni poremećaji (multiformni eritem).
- mučnina, nedostatak zraka, nepravilni otkucaji srca, grčevi u mišićima, napadaj, zamućenost mokraće i umor povezan s poremećenim vrijednostima laboratorijskih nalaza (visoke razine kalija, mokraćne kiseline i fosfora te niske razine kalcija u krvi) koje mogu dovesti do promjena u funkciji bubrega i akutnog zatajenja bubrega – (sindrom lize tumora).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- teški kožni poremećaji (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) nastali zbog alergijske reakcije, ekfolijativni (ljuskav, koji se ljušti) osip.
- intersticijska bolest pluća (poremećaji koji uzrokuju ožiljke na plućima): znakovi uključuju kašalj, otežano disanje, bolno disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Bosutinib Onkogen

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na foliji blistera i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je pakiranje oštećeno ili ako su vidljivi znakovi nedozvoljenog rukovanja.
Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Bosutinib Onkogen sadrži

- Djelatna tvar je bosutinib. Bosutinib Onkogen filmom obložene tablete isporučuju se u različitim jačinama.
Bosutinib Onkogen 100 mg: jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg bosutiniba.
Bosutinib Onkogen 500 mg: jedna filmom obložena tableta sadrži 500 mg bosutiniba.
- Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza (E460), umrežena karmelozanatrij (E468), koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat. Film ovojnica sadrži poli(vinilni alkohol) (E1203), makrogol, talk (E553b), titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), za Bosutinib Onkogen 100 mg filmom obložene tablete, te crveni željezov oksid (E172), za Bosutinib Onkogen 500 mg filmom obložene tablete.

Kako Bosutinib Onkogen izgleda i sadržaj pakiranja

Bosutinib Onkogen 100 mg filmom obložene tablete su žute, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom "C18" na jednoj strani tablete.

Bosutinib Onkogen 100 mg je dostupan u blisterima koji sadrže 28 filmom obloženih tableta.

Bosutinib Onkogen 100 mg je dostupan u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze koji sadrže 28x1 filmom obloženu tabletu.

Bosutinib Onkogen 500 mg filmom obložene tablete su ružičaste, ovalne, bikonveksne filmom obložene tablete s oznakom "C20" na jednoj strani tablete.

Bosutinib Onkogen 500 mg je dostupan u blisterima koji sadrže 28 filmom obloženih tableta.

Bosutinib Onkogen 500 mg je dostupan u perforiranim blisterima djeljivim na jedinične doze koji sadrže 28x1 filmom obloženu tabletu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Onkogen Kft.,
Bécsi út 77-79., 1037-Budimpešta
Mađarska

Proizvođač

Coripharma ehf
Reykjavíkurvegur 78
220 Hafnarfjörður
Island

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.,
Srebrnjak 61, 10000 Zagreb,
Hrvatska
Tel: +385 1 23 96 900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Mađarska:	Bosutinib Onkogen 100 mg, 150 mg filmtableta
Hrvatska:	Bosutinib Onkogen 100 mg, 150 mg filmom obložene tablete
Poljska:	Bosutinib Onkogen, 100 mg, 150 mg, tabletki powlekane
Island:	Bosutinib Onkogen

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2024.