

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg klotrimazol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Canesten 3 tablete i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Canesten 3 tablete
3. Kako primjenjivati Canesten 3 tablete
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Canesten 3 tablete
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Canesten 3 tablete i za što se koriste

Lijek Canesten 3 tablete spada u ginekološke antimikrobne lijekove. Sadržava djelatnu tvar klotrimazol, sa širokim spektrom protugljivičnoga djelovanja.

Lijek Canesten 3 tablete upotrebljava se u bolesnica u dobi od 12. i više godina:

- za liječenje infekcija rodnice (vaginitisa) i vanjskih spolnih organa, koje uzrokuju gljivice (iz roda kvasnica *Candida*). Znakovi i simptomi takve infekcije mogu biti: bijeli, sirasti iscjedak iz rodnice. Može se također javiti bol pri mokrenju.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Canesten 3 tablete

Nemojte primjenjivati Canesten 3 tablete:

- ako ste alergični na klotrimazol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite lijek Canesten 3 tablete u slučaju:

- prve infekcije rodnice i ako ste dobi između 12 i 15 godina ili iznad 60 godina,
- infekcije rodnice tijekom prvog tromjesečja trudnoće,
- ako Vam se ponovna infekcija pojavi unutar 2 mjeseca,
- vrućice (temperatura 38°C ili više),
- boli u donjem dijelu trbuha, boli u leđima,
- neugodnog mirisa iscjetka iz rodnice,

- mučnine,
- krvarenja iz rodnice i/ili boli u ramenu.

Primjena ovog lijeka tijekom menstruacije se ne preporučuje. Liječenje treba završiti prije početka menstruacije.

Nemojte koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice, spermicide ili druge proizvode koji se primjenjuju u rodnicu tijekom primjene lijeka Canesten 1 meka kapsula za rodnicu.

Izbjegavajte spolni odnos tijekom primjene ovog lijeka, s obzirom da se infekcija može prenijeti na Vašeg partnera.

Ukoliko su u Vašeg spolnog partnera prisutni simptomi gljivične infekcije, on se također mora podvrgnuti liječenju. Liječenje spolnih partnera može pomoći u sprječavanju ponovne infekcije.

Proizvodi od lateksa, kao što su kondomi i dijafragme, mogu biti neučinkoviti kao kontracepcija.

Potrebno je izbjegavati kontakt kreme s očima. Lijek ne smijete progutati.

Djeca i adolescenti

Lijek je namijenjen odraslim bolesnicama i djevojkama u dobi od 12 i više godina. U adolescentica u dobi od 12 do 15 godina potrebna je procjena liječnika kako bi se isključili drugi uzroci simptoma te se lijek smije koristiti samo nakon savjetovanja s liječnikom.

Drugi lijekovi i Canesten 3 tablete

Obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Istodobna uporaba lijeka Canesten 3 tablete i oralnog takrolimusa i sirolimusa (lijekova koji se upotrebljavaju za sprečavanje odbacivanja presađenog organa) može dovesti do povećane razine takrolimusa odnosno sirolimusa u krvi.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća:

Klotrimazol se može koristiti tijekom trudnoće. Tijekom prvog tromjesečja trudnoće morate se posavjetovati sa svojim liječnikom prije primjene klotrimazola.

U trudnoći **ne smijete koristiti priloženi aplikator**, već se savjetuje liječenje tabletama za rodnicu koje se trebaju umetnuti u rodnicu prstom, bez aplikatora, kako bi se spriječile ozljede vrata maternice.

Dojenje:

Nema podataka o izlučivanju klotrimazola u majčino mlijeko. Međutim, sistemska apsorpcija nakon primjene je minimalna i malo je vjerojatno da će dovesti do sistemskih učinaka. Ovaj se lijek može koristiti tijekom dojenja.

Plodnost:

Nisu provedena ispitivanja u ljudi o utjecaju klotrimazola na plodnost. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala nikakav učinak lijeka na plodnost.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uporabi lijeka Canesten 3 tablete nije primijećen utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati Canesten 3 tablete

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ako se ne budete pridržavali uputa, lijek neće pravilno djelovati.

Doziranje i trajanje liječenja:

Lijek Canesten 3 tablete namijenjen je za vaginalnu primjenu (primjenu u rodnicu).

- Liječenje rodnice: tri uzastopne večeri prije odlaska u krevet, tabletu za rodnicu umetnuti u rodnicu onako kako je opisano u uputi za pravilnu uporabu. Simptomi koje uzrokuje gljivična infekcija rodnice obično se poboljšaju u roku od 7 dana od početka liječenja. Ako znakovi infekcije ne nestanu potpuno, ako se stanje pogorša ili se infekcija ponovi unutar 2 mjeseca, obratite se liječniku.
- Ako su istodobno inficirane stidne usne i područje oko njih, uz liječenje tabletama za rodnicu potrebno je i dodatno liječenje kremom za primjenu na koži (kombinirano liječenje). Ukoliko su u Vašeg partnera prisutni simptomi infekcije (npr. svrbež, upala), on se također mora podvrgnuti liječenju.

Obratite se liječniku ako se simptomi koje uzrokuje gljivična infekcija rodnice ne poboljšaju **u roku od 7 dana** od početka liječenja, da se utvrdi uzrok infekcije. Ako znakovi infekcije ne nestanu potpuno, ako se stanje pogorša ili se infekcija ponovi unutar 2 mjeseca, obratite se liječniku.

Uputa za pravilnu uporabu


Primjena tablete za rodnicu bez aplikatora (tijekom trudnoće)

Tri uzastopne večeri prije odlaska u krevet tabletu za rodnicu umetnite opranim rukama što dublje u rodnicu. Najbolje je da pritom ležite na leđima s malo savijenim nogama.


Primjena tablete za rodnicu pomoću aplikatora

Operite ruke prije nego što izvadite tabletu za rodnicu i aplikator iz pakiranja, a zatim opet nakon primjene aplikatora.


1. Izvadite aplikator iz pakiranja i izvucite klip i crveni graničnik iz kućišta aplikatora.




2. Tabletu za rodnicu namjestite u kućište aplikatora tako da je zaobljeni dio tablete okrenut prema dolje. Gurnite klip s graničnikom u kućište aplikatora dok ne čujete klik.



3. Kada čujete klik, maknite graničnik s klipa i tada aplikator oprezno gurnite u rodnicu do dijela s uzorkom.



4. Držite aplikator za dio s uzorkom i oprezno gurnite klip dok se ne zaustavi, kako bi se tableta za rodnicu ispustila.



5. Nakon uporabe rastavite sve dijelove radi čišćenja i operite temeljito u toploj (ne kipućoj) vodi sa sapunom, dobro isperite 30 sekundi i oprezno obrišite dijelove. Čuvajte u čistom i sigurnom prostoru.



Za ponovnu uporabu osigurajte da je crveni graničnik vraćen na klip aplikatora i ponovite postupak od koraka 2.

Nakon zadnje uporabe bacite aplikator na sigurno mjesto, izvan dohvata djece. Aplikator se ne smije baciti u odvod toaleta.

Upozorenje

Ako ste trudni, **ne smijete koristiti priloženi aplikator** (vidjeti dio 2. Trudnoća).

Ako je rodnicu suha, tableta za rodnicu neće se posve otopiti. Iz rodnice će se izlučiti komadići tablete, koje možete vidjeti na donjem rublju. Da biste to izbjegli, preporučujemo da lijek umetnete što dublje u rodnicu. Ako se tableta za rodnicu u jednoj noći potpuno ne otopi, preporučujemo primjenu lijeka Canesten 3 krema za rodnicu 20 mg/g.

Ako primijenite više lijeka Canesten 3 tablete nego što ste trebali

Nema podataka o slučajevima predoziranja lijekom Canesten 3 tablete. Ako ste nenamjerno upotrijebili preveliku dozu tableta za rodnicu, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste zaboravili primijeniti Canesten 3 tablete

Ako ste uvečer zaboravili primijeniti tabletu za rodnicu, upotrijebite je sljedeće jutro, odnosno čim se sjetite. Nemojte uzeti dvostruku dozu tableta za rodnicu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Canesten 3 tablete

Ako želite posve izliječiti gljivičnu infekciju i spriječiti njezino ponavljanje, ne smijete prijevremeno završiti liječenje ili odmah kad nestanu simptomi infekcije. Ako se za to ipak odlučite, velika je vjerojatnost da će se bolest ponoviti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće nuspojave zabilježene su tijekom primjene klotrimazola nakon odobrenja za stavljanje lijeka u promet, s nepoznatom učestalošću (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Na mjestu primjene mogu se javiti iritacija, edem (oteklina). Također se mogu javiti ljuštenje rodnice, iscjedak iz rodnice, krvarenje iz rodnice, nelagoda u rodnici i stidnici, eritem (crvenilo) rodnice i stidnice, osjećaj pečenja rodnice i stidnice, osjećaj svrbeža rodnice i stidnice, bol u rodnici i stidnici. Moguće su također reakcije preosjetljivosti po cijelome tijelu, koje su različite jačine. Te reakcije mogu utjecati na kožu (svrbež, crvenilo), disanje (otežano disanje), protok krvi (npr. nizak krvni tlak ili kratkotrajni gubitak svijesti) te na probavni sustav (mučnina). Može se javiti i bol u trbuhu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V.**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Canesten 3 tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što lijek Canesten 3 tablete sadrži

Djelatna tvar je klotrimazol. Jedna tableta za rodnicu sadrži 200 mg klotrimazola.

Pomoćne tvari su kalcijev laktat pentahidrat; kukuruzni škrob; kros повідon; bezvodni koloidni silicijev dioksid ; laktatna kiselina; laktoza hidrat; magnezijev stearat; hipromeloza; mikrokristalična celuloza.

Kako lijek Canesten 3 tablete izgleda i sadržaj pakiranja

Jedna kutija s lijekom Canesten 3 tablete sadrži 3 tablete za rodnicu u aluminijskom blisteru i 1 aplikator za primjenu tableta za rodnicu.

Tablete za rodnicu duguljaste su, bijele do žućkaste boje s natpisom NR na jednoj strani i oznakom BAYER na drugoj strani.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođačNositelj odobrenja

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb

Proizvođač

GP Grenzach Produktions GmbH, 79639 Grenzach-Wyhlen, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2022.