

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Dicetel 100 mg filmom obložene tablete

pinaverijev bromid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Dicetel i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dicetel
3. Kako uzimati Dicetel
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Dicetel
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Dicetel i za što se koristi

Vaše lijek se zove Dicetel 100 mg filmom obložene tablete (u ovoj uputi Dicetel). Dicetel sadrži lijek koji se zove pinaverijev bromid. Pripada skupini lijekova koji opuštaju mišiće crijeva ili žučovoda (tzv. spazmolitici).

Crijevo je dugačka mišićna cijev kroz koju prolazi hrana kako bi se probavila. Žučovod je cijev kroz koju žuč prolazi iz Vaše jetre do trbuha. Ako dođe do grčenja i prejakog stiskanja crijeva ili žučovoda, osjećat ćete bol. Ovaj lijek djeluje tako da opušta grčeve i bol.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dicetel

Nemojte uzimati Dicetel

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Nemojte uzimati Dicetel ako se ovo odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Dicetel.

- ako imate ikakvih problema s jednjakom (mišićna crijev koja spaja grlo i želudac) ili Vam se mali dio želuca povukao gore prema prsnom košu (hijatalna hernija).

Važno je da Dicetel uzmete na pravilan način kako je opisano u nastavku u dijelu "3. Kako uzimati Dicetel".

Djeca

Iskustvo primjene u djece je ograničeno, stoga se ovaj lijek ne preporučuje za primjenu u djece

Drugi lijekovi i Dicetel

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno napomenite liječniku ako uzimate druge lijekove koji olakšavaju grčeve Vaših crijeva ili žuči (takozvani antikolinergici). Dicetel može pojačati njihov učinak na grčeve.

Dicetel s hranom

Uvijek uzmite tabletu usred jela (vidjeti u nastavku pod "3. Kako uzimati Dicetel")

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dicetel se ne preporučuje koristiti tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato hoće li ovaj lijek utjecati na Vašu sposobnost vožnje ili uporabe alata ili strojeva. Prije bavljenja takvim aktivnostima vidite kako će lijek na Vas djelovati.

Dicetel sadrži laktozu i natrij.

Ako vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Dicetel?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Kako uzimati

Važno je da Dicetel uzmete na pravilan način jer može iritirati Vaš jednjak:

- uvijek uzmite tabletu usred jela
- progutajte cijelu tabletu uz punu čašu vode. Nemojte drobiti, cuclati ili žvakati tablete.

Također se preporučuje da:

- tablete rasporedite ravnomjerno tijekom dana
- pokušate uzimati tablete u isto doba svaki dan. To će Vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Koliko uzimati

Odrasli

- Uobičajena doza je 2 puta dnevno po 1 tableta.
- Liječnik može povisiti dozu na 3 puta dnevno po 1 tabletu.

Ako uzmete više Dicetela nego što ste trebali

Ako uzmete više Dicetela nego što ste trebali, obratite se odmah liječniku ili u bolnicu. Ponesite pakiranje lijeka i ovu uputu sa sobom. Mogu se javiti probavni poremećaji, kao npr. nadutost i proljev.

Ako ste zaboravili uzeti Dicetel

Ako zaboravite dozu, preskočite je. Zatim sljedeću dozu uzmite prema redovnom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ukoliko se pojavi neki od niže navedenih simptoma, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah se javite liječniku jer će Vam možda biti potrebna hitna medicinska pomoć:

- alergijska reakcija na lijek sa simptomima kao što su poteškoće s disanjem, oticanje lica, usana, jezika ili grla.

Moguće su i sljedeće nuspojave s ovim lijekom:

- problemi s jednjakom, trbuhom ili crijevima kao što su otežano gutanje, bol u trbuhu, proljev, mučnina, povraćanje. Ako se lijek ne uzima na način opisan u ovoj uputi u dijelu 3., može doći do razvoja ozljede jednjaka
- reakcije na koži (osip, svrbež, urtikarija, crvenilo)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. **Kako čuvati Dicetel?**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake "EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. **Sadržaj pakiranja i druge informacije**

Što Dicetel sadrži?

Djelatna tvar je pinaverijev bromid.

Jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg pinaverijevog bromida.

Drugi sastojci su: mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob, laktoza hidrat, silicijev dioksid koloidni bezvodni, talk, magnezijev stearat, kopoli(butadien/metakrilat) lužnati, natrijev laurilsulfat, stearatna kiselina, hipromeloza, željezov oksid žuti (E172) i željezov oksid crveni (E172).

Kako Dicetel izgleda i sadržaj pakiranja?

Okrugla, bikonveksna, žućkasto-narančasta filmom obložena tableta za primjenu kroz usta, s utisnutim "100" na jednoj strani, promjera od 11 mm.

20 ili 30 tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Viatrix Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Proizvođač

Mylan Laboratories SAS

Route De Belleville

Lieu Dit Maillard

01400 Chatillon-sur-Chalaronne

Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2023.