

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Edemid forte 500 mg tablete

furosemid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Edemid forte i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Edemid forte
3. Kako uzimati Edemid forte
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Edemid forte
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Edemid forte i za što se koristi

Edemid forte pripada skupini lijekova koje nazivamo diureticima (tablete za vodu). Oni djeluju na principu povećanja izlučivanja mokraće iz tijela, povećanjem izlučivanja vode.

Edemid forte tablete koriste se u odraslih:

- za sprječavanje akutnog zatajenja bubrega (naglog prestanka rada bubrega)
- kod kroničnog zatajenja bubrega prije uključivanja u liječenje postupkom dijalize
- u bolesnika s edemom (zadržavanjem tekućine) i povišenim krvnim tlakom
- za održavanje izlučivanja mokraće u bolesnika s kroničnim zatajenjem bubrega
- u bolesnika s nefrotskim sindromom (bolest bubrega), kada dnevna doza do 120 mg furosemda nije djelotvorna
- u bolesnika sa zatajenjem srca otpornim na liječenje, ako se dnevnom dozom od 80 mg ne postiže željeni učinak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Edemid forte

Nemojte uzimati Edemid forte:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na furosemid, sulfonamide ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate bolest bubrega i izlučivanje mokraće u potpunosti je blokirano
- ako imate smanjenu razinu kalija u krvi
- ako imate smanjenu razinu natrija u krvi
- ako ste dehidrirani zbog povraćanja, proljeva ili pretjeranog znojenja ili u stanju hipovolemije (smanjen Vam je volumen krvi uslijed nedostatka tekućine)
- ako imate teško oštećenje jetre praćeno poremećajem svijesti
- ako dojite (pogledajte dio *Trudnoća i dojenje*).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Edemid forte:

- ako imate niski krvni tlak ili ste u opasnosti da dođe do pada Vašeg krvnog tlaka
- ako ste starija osoba, ako uzimate neki drugi lijek koji može uzrokovati pad krvnog tlaka i ako imate druga medicinska stanja koja su rizik za pad krvnog tlaka
- ako imate šećernu bolest ili smanjenu toleranciju na glukozu. Tolerancija na glukozu može se smanjiti tijekom liječenja. Prikrivena šećerna bolest može postati manifestna (jasno vidljiva).
- ako imate probleme s mokrenjem, npr. teško mokrite
- ako imate giht
- ako imate cirozu jetre i tekućina Vam se nakuplja u trbušnoj šupljini
- ako imate nisku razinu proteina u krvi jer bubrezi ne rade dobro
- ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili koristite nadomjeske za sol koji sadrže kalij
- ako imate oštećen sluh jer velike doze Edemid Forte tableta mogu dovesti do privremenog gubitka sluha.
- ako ste starije dobi jer ste pod većim rizikom od razvoja nuspojava
- ako bolujete od bolesti bubrega
- ako uzimate lijek za liječenje psihičkih poremećaja (risperidon)

Utjecaj na pretrage

Recite svom liječniku ako ste sportaš i idete na doping testiranja, jer Edemid forte sadrži djelatnu tvar koja može izazvati pozitivne rezultate na doping testu.

Djeca

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece.

Drugi lijekovi i Edemid forte

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i biljne lijekove i lijekove koje ste kupili bez recepta.

Konkretno, prije uzimanja Edemid forte tableta, morate provjeriti s Vašim liječnikom ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- lijekove poznate pod nazivom nesteroidni protuupalni lijekovi – to su lijekovi protiv boli, upale ili povišene temperature, uključujući acetilsalicilatnu kiselinu (ukoliko je doza veća ili jednaka 3 g/dan)
- srčane glikozide (lijekovi za liječenje zatajenja srca i nepravilnog rada srca)
- lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma
- lijekove koji pomažu sniziti krvni tlak, npr. aliskiren
- lijekove koji mogu oštetiti bubrege (neki antibiotici)
- lijekove koji mogu oštetiti sluh (neki antibiotici – kanamicin, gentamicin, tobramicin; vankomicin, kolistin)
- litij (lijek za liječenje manije ili depresije)
- risperidon (lijek za liječenje psihoza)
- cisplatin, metotreksat (lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti)
- lijekove za liječenje infekcija (antibiotike cefalosporine)
- sukralfate (lijek za liječenje čira na dvanaestniku)
- lijekove za liječenje šećerne bolesti (inzulin ili tablete) kako bi smanjili razinu šećera u krvi
- teofilin (lijek za astmu) ili drugi lijekovi za astmu koji se najčešće udišu kroz pumpicu (tzv. beta2-simpatomimetici)
- lijekove za opuštanje mišića (mišićni relaksansi tipa kurare)
- lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin, fenobarbitol, karbamazepin)
- kolestiramin (lijek za ograničavanje unosa kolesterola i masti)
- kortikosteroide
- sladić (korijen biljke *Glycyrrhiza glabra*)
- laksative
- reboksetin (lijek za liječenje kliničkih depresija)

- amfotericin (lijek za liječenje teških gljivičnih infekcija)
- karbenoksolon (lijek za liječenje ulceracije i upale jednjaka)
- kloralhidrat (lijek za liječenje nesanice i tjeskobe)
- levotiroksin (lijek za liječenje poremećaja rada štitne žlijezde)
- ciklosporin (lijek koji se koristi kako bi smanjio imunološki odgovor)
- radiokontrastno sredstvo.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako niste sigurni koji su to lijekovi.

Edemid forte s hranom i pićem

Za vrijeme liječenja Edemid forte tabletama, pogotovo kod dugotrajnog liječenja, trebali bi konzumirati hranu bogatu kalijem, na primjer povrće, voće (osobito banane), sušene smokve, datulje, šljive itd. Alkoholna pića treba izbjegavati.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Tablete Edemid forte ne smiju se primjenjivati u trudnoći, osim ako to nije neophodno. Furosemid prolazi kroz posteljicu i stoga može izazvati nuspojave kod fetusa. Ukoliko zatrudnite za vrijeme liječenja Edemid forte tabletama, odmah ih prestanite uzimati i posavjetujte se s Vašim liječnikom.

Dojenje

Ako dojite, ne smijete uzimati Edemid forte tablete. Ukoliko je liječenje Edemid Forte tabletama krajnje neophodno, dojenje treba prekinuti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena ovog lijeka može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Za vrijeme liječenja mogu pojaviti omaglica i pospanost, osobito na početku liječenja ili kod povećavanja doze. Ukoliko to pogađa i Vas, nemojte voziti ili raditi sa strojevima.

Edemid forte sadrži laktozu

Jedna tableta sadržava 84,55 mg laktoze u obliku laktoze hidrata. Ako Vam je liječnik nekada rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po jednoj tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Edemid forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Doziranje i trajanje liječenja odredit će Vaš liječnik ovisno o Vašem stanju. Doziranje će se prilagoditi svakom pojedinom bolesniku.

Dnevna doza može iznositi od 250 mg (pola tablete) do 2000 mg (4 tablete).

Početna doza od 250 mg po potrebi se može povećati za 250 mg svakih 4 do 6 sati do maksimalno 2000 mg na dan. Rijetko je dnevna doza veća od 500 mg. Vaš liječnik će odlučiti koja Vam je doza potrebna.

Dnevna doza ne smije prelaziti 2000 mg.

Način primjene

Preporučuje se da se furosemid tablete uzimaju kroz usta, cijele, bez žvakanja, na prazan želudac i uz

puno tekućine.

Primjena u djece

Edemid Forte nije namijenjen za liječenje djece.

Stariji bolesnici

Primjenjuje se preporučeno doziranje kao u odraslih, no pošto se ovaj lijek u starijih bolesnika izlučuje sporije, doza će se postepeno prilagođavati dok se ne postigne zadovoljavajući odgovor.

Oštećenje funkcije bubrega

Liječnik će prilagoditi dozu ovog lijeka u skladu sa stanjem Vaših bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu kod bolesnika s blagim oštećenjem jetre; međutim doza može zahtijevati prilagodbu u slučajevima umjerenog do teškog oštećenja jetre.

Ako ste uzeli više Edemid forte tableta nego što ste trebali

Ako ste Vi (ili netko drugi) progutali dosta tableta odjednom, ili ako mislite da je dijete progutalo bilo koju od tableta, odmah se obratite svome liječniku ili se javite u hitnu službu najbliže bolnice. Vrlo je vjerojatno da će predoziranje uzrokovati srčane probleme i dehidraciju. Molimo Vas da ovu uputu, preostale tablete i kutiju od lijekova ponesete sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Edemid forte

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete uzimati Edemid forte

Ako želite prestati uzimati ovaj lijek, uvijek se prije toga posavjetujte s Vašim liječnikom. Čak i ako se osjećate dobro, možda će biti potrebno nastaviti uzimati ovaj lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite sljedeće, prestati uzimati Edemid forte i odmah obavijestite svog liječnika ili hitnu službu najbliže bolnice:

- osip, svrbež, oticanje usana, usta ili grla koje može uzrokovati teškoće pri gutanju ili disanju pošto navedeno mogu biti znaci teške alergijske reakcije
- crvenilo, osip ili plikove na koži praćene ljuštenjem kože ili sluznica, krvarenjem, povišenom tjelesnom temperaturom, zimicom, bolnim mišićima i općenito lošim stanjem pošto navedeno mogu biti znaci teške kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, lihenoidna reakcija)
- promjena osobnosti, smetenost, ukočenost, nevoljno drhtanje, konvulzije ili poremećaj svijesti pošto navedeno može biti uzrokovano teškim poremećajem jetre, pogotovo kod bolesnika koji već boluju od bolesti jetre.

Ostale moguće nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika):

- poremećaji elektrolita čiji simptomi mogu biti grčevi u mišićima, gubitak apetita, slabost, pospanost, povraćanje i zbunjenost, žeđ.
- dehidriranost, povećane vrijednosti masnoća.

Često (mogu se javiti u 1 na 10 bolesnika):

- povećanje gustoće krvi što može dovesti do stvaranja ugrušaka (tromba), posebice u starijih
- oštećenje funkcije bubrega
- promijenjene vrijednosti krvnih pretraga (smanjenje razine natrija i klora u krvi, povišene razine mokraćne kiseline, kreatinina i kolesterola u krvi)
- nizak krvni tlak, pad krvnog tlaka pri ustajanju praćen omaglicom
- povećani volumen mokraće

Manje često (mogu se javiti u 1 na 100 bolesnika):

- snižen broj krvnih pločica
- glavobolja, omaglica, pospanost
- povišene vrijednosti šećera u krvi
- poremećaj vida
- mučnina
- koprivnjača, svrbež, upale kože, osip, crvenilo kože, osjetljivost na svjetlo, suha koža, plikovi na koži
- grčenje mišića, slabost u mišićima
- gluhoća (ponekad ireverzibilna)

Rijetko (mogu se javiti u 1 na 1000 bolesnika):

- snižen broj bijelih krvnih stanica
- oštećenje sluha, zujanje/zvonjava u ušima
- vrućica
- upala bubrega)
- trnjenje ruku i nogu
- povraćanje, proljev
- upala krvnih žila (vaskulitis)

Vrlo rijetko (mogu se javiti u 1 na 10000 bolesnika):

- snižen broj crvenih krvnih stanica, snižen broj krvnih stanica
- upala gušterače (pankreatitis)
- giht
- poremećaj protoka žuči iz jetre u početni dio tankog crijeva
- povećane vrijednosti jetrenih enzima

Ostale nuspojave nepoznate učestalosti:

- smanjenje razine kalcija i magnezija u krvi
- nepravilan rad srca. Kod pretjeranog izlučivanja mokraće mogu se pojaviti kardiovaskularne smetnje, naročito u starijih bolesnika.
- stvaranje ugrušaka (tromba) u krvnim žilama, poremećaj cirkulacije
- simptomi poremećaja mokrenja mogu se pojaviti ili se pogoršati
- sistemski eritemski lupus
- akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP) (akutno febrilno izbijanje kožnih promjena uzrokovano lijekom)
- omaglica, nesvjestica i gubitak svijesti (uzrokovani simptomatskom hipotenzijom)
- Pseudo- Bartterov sindrom (pseudoprimarni hiperaldosteronizam)
- teško oštećenje mišićnog tkiva

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V](#)**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Edemid forte

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C, zaštićen od svjetlosti.

Lijek čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, iza oznake EXP.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Edemid forte

Djelatna tvar je furosemid.

1 tableta sadržava 500 mg furosemida.

Drugi sastojci su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; želatina; talk; natrijev škroboglikolat, vrste A; magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni.

Kako Edemid forte izgleda i sadržaj pakiranja

Edemid forte 500 mg tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete s urezom na jednoj strani.

Tableta se može prepoloviti na dva jednaka dijela.

Veličina pakiranja:

20 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

30 tableta u smeđoj staklenoj bočici, u kutiji

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb

Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2d, 9220 Lendava, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2024.