

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

**Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete
Etorikoksib JGL 90 mg filmom obložene tablete
etorikoksib**

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Etorikoksib JGL i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Etorikoksib JGL
3. Kako uzimati Etorikoksib JGL
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Etorikoksib JGL
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Etorikoksib JGL i za što se koristi

Što je Etorikoksib JGL?

- Etorikoksib JGL sadrži djelatnu tvar etorikoksib. Etorikoksib JGL je lijek iz skupine lijekova koji se zovu selektivni inhibitori ciklooksigenaze-2 (COX-2). Oni pripadaju većoj skupini lijekova koji se zovu nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID).

Za što se Etorikoksib JGL koristi?

- Ovaj lijek pomaže smanjiti bolove i oticanje (upalu) u zglobovima i mišićima u osoba u dobi od 16 godina i starijih koje imaju osteoartritis, reumatoidni artritis, ankilozantni spondilitis i giht (ulog).
- Etorikoksib JGL se također koristi za kratkotrajno liječenje umjerenog jake bola nakon stomatološkog kirurškog zahvata u osoba dobi od 16 ili više godina.

Što je osteoartritis?

Osteoartritis je bolest zglobova. Nastaje zbog postupnog trošenja hrskavice koja oblaže krajeve kostiju. To uzrokuje oticanje (upalu), bol, osjetljivost, ukočenost i tjelesnu nesposobnost.

Što je reumatoidni artritis?

Reumatoidni artritis je kronična upalna bolest zglobova. Uzrokuje bol, ukočenost, oticanje zglobova i sve veći gubitak pokretljivosti zahvaćenih zglobova. Također može uzrokovati upalu u drugim organima.

Što je giht?

Giht je bolest koju karakteriziraju iznenadni, ponavljajući napadaji jake boli, vrlo bolne upale i crvenilo zglobova. Bolest je uzrokovana odlaganjem mineralnih kristala u zglobovima.

Što je ankilozantni spondilitis?

Ankilozantni spondilitis je upalna bolest koja zahvaća kralježnicu i velike zglobove.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Etorikoksib JGL

Nemojte uzimati lijek Etorikoksib JGL

- ako ste alergični na etorikoksib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
- ako ste alergični na nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL), uključujući acetilsalicilatnu kiselinu i COX-2 inhibitore (vidjeti dio 4. „Moguće nuspojave“)
- ako imate aktivan čir na želucu ili krvarenje iz želuca ili crijeva
- ako imate ozbiljnu bolest jetre
- ako imate ozbiljnu bolest bubrega
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni ili dojite (vidjeti dio „Trudnoća, dojenje i plodnost“)
- ako ste mlađi od 16 godina
- ako imate upalnu bolest crijeva kao što je Chronova bolest, ulcerozni kolitis ili kolitis
- ako imate povišen krvni tlak koji nije dobro kontroliran lijekovima koje uzimate (provjerite sa liječnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni je li Vaš krvni tlak dobro kontroliran)
- ako Vam je liječnik dijagnosticirao srčane tegobe, uključujući zatajenje srca (umjereni ili teški oblik), anginu (bolovi u prsnom košu)
- ako ste imali srčani udar, operaciju na srcu radi ugradnje premosnice, bolest perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama ili stopalima zbog suženih ili začepljenih arterija)
- ako ste imali bilo kakav oblik moždanog udara (uključujući prolazni napadaj nalik moždanom udaru). Etorikoksib može blago povećati rizik od srčanog i moždanog udara, stoga ga ne smiju uzimati bolesnici koji su već imali srčane tegobe ili moždani udar.

Smatraćete li da se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lijek dok se ne posavjetujete sa liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Etorikoksib JGL:

- ako u povijesti bolesti imate krvarenje ili čir na želucu
- ako ste izgubili puno tekućine (ako ste dehidrirani), npr. zbog dugotrajnog povraćanja ili proljeva;
- ako ste otekli zbog zadržavanja tekućine u tijelu
- ako u povijesti bolesti imate zatajenje srca ili bilo koju drugu bolest srca
- ako u povijesti bolesti imate povišen krvni tlak. Etorikoksib JGL u nekim ljudi može povisiti krvni tlak, posebno pri uzimanju visokih doza lijeka, stoga će Vam liječnik povremeno provjeravati krvni tlak
- ako u povijesti bolesti imate bolesti jetre ili bubrega
- ako se liječite od neke infekcije, Etorikoksib JGL može maskirati ili prikriti vrućicu koja je znak infekcije
- ako imate šećernu bolest, povišen kolesterol ili pušite. Navedeno može povećati rizik od bolesti srca
- ako ste žena koja pokušava zatrudnjeti
- ako imate više od 65 godina.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, **razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja lijeka Etorikoksib JGL** kako biste provjerili je li ovaj lijek prikladan za Vas.

Djelotvornost lijeka Etorikoksib JGL slična je u starijih i mlađih odraslih bolesnika. Ako imate više od 65 godina, liječnik će Vas željeti redovito nadzirati. Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika starijih od 65 godina.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek ne smijete dati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina.

Drugi lijekovi i Etorikoksib JGL

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nakon što počnete uzimati Etorikoksib JGL, liječnik će Vas možda željeti nadzirati kako bi provjerio djeluju li lijekovi koje uzimate ispravno, osobito ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi (antikoagulanse), kao što je varfarin
- rifampicin (antibiotik)
- metotreksat (lijek koji potiskuje imunološki sustav i često se primjenjuje u liječenju reumatoidnog artritisa)
- ciklosporin ili takrolimus (lijekovi koji potiskuju imunološki sustav)
- litij (lijek koji se koristi u liječenju nekih oblika depresije)
- lijekove koji pomažu kontrolirati povišen krvni tlak i zatajenje srca, a zovu se ACE inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora, kao što su enalapril i ramipril te losartan i valsartan
- diuretike (lijekove za mokrenje)
- digoksin (lijek za liječenje zatajenja srca i nepravilnog srčanog ritma)
- minoksidil (lijek za liječenje povišenog krvnog tlaka)
- salbutamol u tabletama ili oralnoj otopini (lijek za astmu)
- tablete za sprječavanje trudnoće (kombinacija bi mogla povećati rizik od nuspojava)
- hormonsko nadomjesno liječenje (kombinacija bi mogla povećati rizik od nuspojava)
- acetilsalicilatnu kiselinu, pri uzimanju acetilsalicilatne kiseline i lijeka Etorikoksib JGL povećava se rizik od nastanka čira na želucu:
 - acetilsalicilatna kiselina za sprječavanje srčanog ili moždanog udara:
Etorikoksib JGL se može uzimati s **niskim dozama** acetilsalicilatne kiseline. Uzimate li niske doze acetilsalicilatne kiseline za sprječavanje srčanog ili moždanog udara, ne smijete prekidati liječenje acetilsalicilatnom kiselinom dok se ne posavjetujete sa svojim liječnikom.
 - acetilsalicilatna kiselina i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL):
Nemojte uzimati **visoke doze** acetilsalicilatne kiseline ili druge protuupalne lijekove dok uzimate lijek Etorikoksib JGL.

Etorikoksib JGL s hranom i pićem

Učinak lijeka Etorikoksib JGL možda će nastupiti brže kada se uzme bez hrane.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Etorikoksib JGL se ne smije uzimati tijekom trudnoće. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, nemojte uzimati ovaj lijek. Zatrudnite li, prestanite uzimati ovaj lijek i posavjetujte se s liječnikom. Razgovarajte s liječnikom ako niste sigurni ili trebate savjet.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Etorikoksib JGL u majčino mljeko u ljudi. Ako dojite ili namjeravate dojiti, posavjetujte se s liječnikom prije nego što počnete uzimati lijek Etorikoksib JGL. Ako uzimate lijek Etorikoksib JGL, ne smijete dojiti.

Plodnost

Ne preporučuje se primjena lijeka Etorikoksib JGL u žena koje pokušavaju zatrudnjeti.

Upravljanje vozilima i strojevima

U nekim su bolesnika za vrijeme uzimanja lijeka Etorikoksib JGL prijavljene omaglica i pospanost.

Nemojte voziti ako osjetite omaglicu ili pospanost.

Nemojte rukovati alatima ili strojevima ako osjetite omaglicu ili pospanost.

Etorikoksib JGL sadrži laktuzu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Etorikoksib JGL sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po filmom obloženoj tabletii, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Etorikoksib JGL

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte uzeti više od preporučene doze za Vaše stanje. Liječnik će povremeno htjeti razgovarati o Vašem liječenju. Važno je da uzimate najnižu dozu dovoljnu za ublažavanje boli i da lijek Etorikoksib JGL ne uzimate dulje nego što je potrebno. Naime, produljenim trajanjem liječenja može se povećati rizik od srčanoga i moždanog udara, posebno pri uzimanju visokih doza lijeka.

Ovaj je lijek dostupan u različitim jačinama, a ovisno o Vašoj bolesti liječnik će Vam propisati jačinu lijeka koja je prikladna za Vas.

Preporučena doza je:

Osteoartritis

Preporučena doza je 30 mg jedanput na dan, a ako je potrebno, može se povisiti do najviše doze od 60 mg jedanput na dan.

Etorikoksib JGL nije dostupan u jačini od 30 mg. Za dozu od 30 mg potrebno je uzeti drugi lijek dostupan na tržištu koji sadrži etorikoksib.

Reumatoidni artritis

Preporučena doza je 60 mg jedanput na dan, a ako je potrebno, može se povisiti do najviše doze od 90 mg jedanput na dan.

Ankilozantni spondilits

Preporučena doza je 60 mg jedanput na dan, a ako je potrebno, može se povisiti do najviše doze od 90 mg jedanput na dan.

Akutna bolna stanja

Etorikoksib se smije uzimati samo u vrijeme trajanja akutne boli.

Giht

Preporučena doza je 120 mg jedanput na dan, koja se smije uzeti samo u vrijeme trajanja akutne boli, najduže 8 dana liječenja.

Bol nakon stomatološkog kirurškog zahvata

Preporučena doza je 90 mg jedanput na dan, najduže 3 dana liječenja.

Osobe koje imaju tegobe s jetrom

- Imate li blagu bolest jetre, ne smijete uzimati više od 60 mg na dan.
- Imate li umjerenu bolest jetre, ne smijete uzimati više od **30 mg na dan**.

Primjena u djece i adolescenata

Djeca i adolescenti mlađi od 16 godina ne smiju uzimati lijek Etorikoksib JGL.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika. Kao i kod primjene drugih lijekova, potreban je oprez u starijih bolesnika.

Način primjene

Lijek Etorikoksib JGL namijenjen je za primjenu kroz usta.

Uzmite tablete jedanput na dan.

Etorikoksib JGL se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Etorikoksib JGL nego što ste trebali

Nikad ne smijete uzeti više tableta nego što Vam je preporučio liječnik. Uzmete li previše Etorikoksib JGL tableta, odmah potražite liječničku pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Etorikoksib JGL

Važno je da lijek Etorikoksib JGL uvijek uzimate kako Vam je propisao liječnik. Ako ste zaboravili uzeti lijek, sutradan samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako se u Vas pojave neki od navedenih simptoma, odmah prekinite uzimati lijek Etorikoksib JGL i razgovarajte sa svojim liječnikom (vidjeti dio 2. 'Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Etorikoksib JGL?'):

- nedostatak zraka, bol u prsnom košu, ili pojava oticanja gležnjeva ili pogoršanje istog
- žuta boja kože ili bjeloočnica (žutica) – znakovi koji ukazuju na tegobe s jetrom
- jaki ili stalni bolovi u trbuhi ili crna stolica
- alergijska reakcija – koja može uključivati kožne reakcije kao što su čirevi ili plikovi (mjehurići), ili oticanje lica, usana, jezika ili grla koje može uzrokovati otežano disanje.

Sljedeće nuspojave se mogu pojaviti tijekom liječenja lijekom Etorikoksib JGL:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- bolovi u želucu.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- suha alveola (upala i bol nakon vađenja zuba)
- oticanje nogu i/ili stopala zbog zadržavanja tekućine (edem)
- omaglica, glavobolja
- osjećaj lutanja srca (ubrzani ili nepravilni otkucaji srca), nepravilan srčani ritam (aritmija)
- povišen krvni tlak
- piskanje pri disanju ili nedostatak zraka (bronhospazam)
- zatvor, vjetrovi (prekomjerni plinovi), gastritis (upala sluznice želuca), žgaravica, proljev, probavne smetnje (dispepsija)/nelagoda u trbuhi, mučnina, povraćanje, upala jednjaka, vrijedovi (ulceracije) u ustima
- promijenjene vrijednosti pretraga krvi koje se odnose na funkciju jetre
- stvaranje modrica (krvnih podljeva)
- opća slabost i umor, simptomi nalik gripi.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- gastroenteritis (upala probavnog trakta koja uključuje i želudac i tanko crijevo/želučana viroza), infekcija gornjeg dijela dišnog sustava, infekcija mokraćnih puteva
- promjene laboratorijskih vrijednosti (smanjen broj crvenih krvnih stanica, smanjen broj bijelih krvnih stanica, smanjen broj krvnih pločica (trombocita))
- preosjetljivost (alergijske reakcije uključujući koprivnjaču koje mogu biti ozbiljne i zahtijevati hitno liječenje)
- povećan ili smanjen apetit, porast tjelesne težine
- tjeskoba, depresija, smanjena mentalna aktivnost, halucinacije (vidite, osjećate ili čujete stvari koje ne postoje)
- promjena osjeta okusa, nesanica, utrnljost ili trnci, pospanost
- zamagljen vid, nadražene i crvene oči
- zujanje u ušima, vrtoglavica (osjećaj vrtnje tijekom mirovanja)
- poremećaj srčanog ritma (atrijska fibrilacija), ubrzani puls, zatajenje srca, osjećaj stezanja, pritsika ili težine u prsnom košu (angina pektoris), srčani udar
- navale crvenila uz osjećaj vrućine, moždani udar, prolazni napadaj nalik moždanom udaru (prolazni ishemski napadaj), jako povišenje krvnog tlaka, upala krvnih žila
- kašalj, nedostatak zraka, krvarenje iz nosa
- nadutost u želucu ili crijevima, promjene u radu crijeva, suha usta, čir na želucu, upala sluznice želuca koja može postati ozbiljna i prokrvariti, sindrom nadraženog crijeva, upala gušterića
- oticanje lica, kožni osip ili svrbež, crvenilo kože
- grčevi/stezanje mišića, bolovi/ukočenost u mišićima
- povišene vrijednosti kalija u krvi, promjene u vrijednostima pretraga krvi ili mokraće koje se odnose na funkciju bubrega, teške tegobe s bubrežima
- bolovi u prsnom košu.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- angioedem (alergijska reakcija koja uključuje oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, a koja može uzrokovati otežano disanje ili gutanje što može biti ozbiljno i zahtijevati hitno liječenje)/anafilaktične/anafilaktoidne reakcije uključujući šok (ozbiljna alergijska reakcija koja zahtijeva hitno liječenje)
- smetenost, nemir
- tegobe s jetrom (hepatitis)
- snižene vrijednosti natrija u krvi
- zatajenje jetre, žuta boja kože i/ili bjeloočnica (žutica)
- teške kožne reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V.](#)*

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Etorikoksib JGL

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Etorikoksib JGL sadrži

- Djelatna tvar je etorikoksib. Jedna filmom obložena tableta sadrži 60 mg ili 90 mg etorikoksiba.
- Drugi sastojci (pomoće tvari) su:
Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza; bezvodni kalcijev hidrogenfosfat; umrežena karmelozanatrij; laktosa hidrat; hidroksipropilceluloza; magnezijev stearat.
Ovojnica tablete: hipromeloza 15 cP; laktosa hidrat; titanijev dioksid (E171); triacetin. Tablete od 60 mg također sadrže boju Indigo Carmine aluminium lake (E132) i željezov oksid, žuti (E172).

Kako Etorikoksib JGL izgleda i sadržaj pakiranja

Etorikoksib JGL filmom obložene tablete dostupne su u dvije jačine.

Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete su tamnozelene bikonveksne filmom obložene tablete oblika jabuke, s utisnutom oznakom "60" na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani, duljine približno 7,5 mm i širine približno 7,2 mm.

Etorikoksib JGL 90 mg filmom obložene tablete su bijele bikonveksne filmom obložene tablete oblika jabuke, s utisnutom oznakom "90" na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani, duljine približno 8,5 mm i širine približno 8,4 mm.

Veličine pakiranja:

Etorikoksib JGL 60 mg filmom obložene tablete: 14 tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Etorikoksib JGL 90 mg filmom obložene tablete: 14 tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Proizvođač:

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Chanelle Medical Unlimited Company, Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, H62 FH90, Irska

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA3000, Malta

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2023.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (<http://www.halmed.hr>).

