

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Finpros 5 mg filmom obložene tablete finasterid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Finpros i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finpros
3. Kako uzimati Finpros
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Finpros
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Finpros i za što se koristi

Finpros pripada klasi lijekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Djelatna tvar u lijeku Finpros je finasterid, koji djeluje tako što se veže za enzim 5-alfa-reduktazu te tako sprječava stvaranje tvari uključene u rast prostate. Posljedica toga je zaustavljanje daljnjeg povećanja prostate. Dugotrajno uzimanje lijeka Finpros često smanjuje veličinu prostate.

Zašto Vam je liječnik propisao Finpros

Finasterid je specifični inhibitor enzima i primjenjuje se u liječenju muškaraca s dobroćudnim povećanjem prostate (benignom hiperplazijom prostate - BHP). Finpros smanjuje povećanu prostatu i ublažava mokraćne simptome. Finpros će pomoći smanjiti rizik od razvoja iznenadne nemogućnosti mokrenja (akutne urinarne retencije) i potrebu za operacijom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Finpros

Nemojte uzimati Finpros

- ako ste alergični na finasterid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
- ako ste žena (pogledajte također pod „Trudnoća i dojenje“) ili dijete.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Finpros:

- ako imate ili ste imali alergijsku reakciju.
- ako imate smanjenu funkciju jetre.
- ako imate poteškoća pri potpunom pražnjenju mjehura ili jako smanjen protok mokraće, prije nego počnete uzimati Finpros liječnik Vas mora detaljno pregledati kako bi isključio druge smetnje (opstrukcije) u mokraćnom sustavu.
- ako trebate obaviti pretragu krvi koja se zove „PSA“ (prostata specifični antigen). Neophodno je da prije pretrage obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru da uzimate finasterid, jer može promijeniti rezultate pretrage.

Ako je Vaša partnerica trudna ili postoji mogućnost da ostane trudna, morate izbjeći njeno izlaganje Vašem sjemenu koje može sadržavati malu količinu lijeka (pogledajte također „Trudnoća i dojenje“).

Promjene raspoloženja i depresija

U bolesnika liječenih lijekom Finpros prijavljene su promjene raspoloženja kao što su depresivno raspoloženje, depresija i, manje često, misli o samoubojstvu. Ako se pojavi bilo koji od tih simptoma, obratite se svom liječniku za savjet što je prije moguće.

Morate redovito posjećivati svog liječnika radi periodičke kontrole i procjene napretka u liječenju.

Molimo Vas da potražite savjet liječnika ako se nešto od gore navedenog odnosi ili se ikad prije odnosilo na Vas.

Djeca

Finpros se ne smije primjenjivati u djece.

Drugi lijekovi i Finpros

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Finpros tablete obično se mogu uzimati s drugim lijekovima.

Finpros s hranom i pićem

Finpros se može uzimati s ili bez hrane.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Finpros je namijenjen isključivo muškarcima.

Ako je Vaša partnerica trudna ili postoji mogućnost da ostane trudna, morate izbjeći njeno izlaganje Vašem sjemenu koje može sadržavati malu količinu lijeka.

Žene koje su trudne ili mogu ostati trudne ne smiju rukovati prelomljenim ili zdrobljenim Finpros tabletama.

Ako trudnica koja nosi muški fetus uzme finasterid na usta ili se on apsorbira kroz kožu, dijete se može roditi s deformiranim spolnim organima.

Ako trudnica dođe u kontakt s djelatnom tvari u lijeku Finpros, potrebno je potražiti savjet liječnika. Tablete su obložene film ovojnicom koja sprječava kontakt s finasteridom uz uvjet da se tablete ne lome ili drobe.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema dokaza koji bi ukazivali da Finpros utječe na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Finpros sadrži laktozu i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Finpros

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 1 tableta dnevno.

Tableta se mora progutati cijela i ne smije se lomiti ili drobiti. Može se uzimati s ili bez hrane.

Iako se poboljšanje često uočava nakon kratkog vremena, može biti neophodno nastaviti liječenje barem 6 mjeseci. Nemojte mijenjati dozu ili prekidati liječenje bez savjetovanja sa svojim liječnikom.

Liječnik Vam može propisati Finpros u kombinaciji s drugim lijekom koje se zove doksazosin. To može pridonijeti boljoj kontroli dobroćudnog povećanja prostate.

Imate li dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Ako uzmete više Finprosa nego što ste trebali

Odmah se obratite liječniku, najbližem odjelu hitne službe ili centru za kontrolu trovanja za savjet.

Ako ste zaboravili uzeti Finpros

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite sljedeću dozu kad za nju dođe vrijeme, prema rasporedu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Finpros i odmah se obratite svom liječniku ako dobijete bilo koji od sljedećih simptoma (angiooedema):

- oticanje lica, usana, jezika ili grla,
- otežano gutanje,
- koprivnjača i otežano disanje.

Morate svom liječniku odmah prijaviti bilo kakve promjene u tkivu dojke poput kvržica, boli, povećanja tkiva dojke ili iscjетка iz bradavice jer ovo mogu biti znakovi ozbiljnog stanja, poput raka dojke.

Prilikom primjene Finprosa zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- nemogućnost postizanja erekcije,
- smanjen seksualni nagon,
- smanjen volumen ejakulata.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- osip,
- osjetljivost i/ili povećanje dojki,
- otežano postizanje ejakulacije.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- depresija,
- tjeskoba,
- suicidalne misli,
- smanjenje spolnog nagona koje se nastavilo i nakon prestanka uzimanja lijeka,
- palpitacije (osjećaj lupanja srca),
- promjene u načinu rada jetre, koje se mogu vidjeti krvnom pretragom,
- svrbež, urtikarija (koprivnjača),
- bol u testisima,
- krv u sjemenu,
- tegobe pri izbacivanju sjemena koje su se nastavile nakon prestanka uzimanja lijeka,
- nemogućnost postizanja erekcije koja se nastavila nakon prestanka uzimanja lijeka, neplodnost

i/ili slaba kakvoća sjemeni. Nakon prestanka uzimanja lijeka prijavljeno je poboljšanje kakvoće sjemeni.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Finpros

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Finpros sadrži

- Djelatna tvar je finasterid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida.
- Drugi sastojci u jezgri tablete su laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, prethodno geliran škrob, makrogol glicerolaurat, natrijev škroboglikolat i magnezijev stearat. Ovojnica tablete sadrži hipromelozu, makrogol 6000, titanijev dioksid (E171) i boju indigo carmine aluminium lake (E132). Vidjeti dio 2. „Finpros sadrži laktozu i natrij“.

Kako Finpros izgleda i sadržaj pakiranja

Finpros je plava, okrugla bikonveksna tableta s oznakom „F5“, promjera 7 mm.

Finpros je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 28 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji puta revidirana u listopadu 2025.