

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Gaviscon oralna suspenzija

natrijev alginat
natrijev hidrogenkarbonat
kalcijev karbonat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Gaviscon oralna suspenzija i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gaviscon oralnu suspenziju
3. Kako uzimati Gaviscon oralnu suspenziju
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Gaviscon oralnu suspenziju
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Gaviscon oralna suspenzija i za što se koristi

Gaviscon oralna suspenzija pripada skupini lijekova za liječenje želučanog vrijeda (čira) i refluksne bolesti (žgaravice). Ovaj lijek stvara zaštitni sloj na površini želučanog sadržaja kako bi spriječio povratak želučane kiseline iz želuca, gdje je želučana kiselina normalno prisutna, u jednjak, gdje može uzrokovati bol i nelagodu. Gaviscon oralna suspenzija se koristi za liječenje simptoma refluksa poput vraćanja želučane kiseline (regurgitacije), žgaravice i loše probave (povezane s refluksom), koji se mogu pojaviti nakon obroka i tijekom trudnoće.

Lijek je namijenjen za primjenu u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.

Obavezno se obratite svom liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gaviscon oralnu suspenziju

Nemojte uzimati Gaviscon oralnu suspenziju:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Gaviscon oralnu suspenziju.

Ukoliko simptomi potraju duže od 7 dana ili se javljaju tako da postoji potreba za čestom primjenom lijeka, obratite se liječniku. Možda će biti potrebna dodatna obrada Vaših tegoba.

Djeca i adolescenti

Gaviscon oralna suspenzija nije za primjenu u djece jer sigurnost i djelotvornost u djece mlađe od 12 godina nisu još ustanovljene. Djeca mlađa od 12 godina lijek smiju koristiti samo prema preporuci liječnika.

Drugi lijekovi i Gaviscon oralna suspenzija

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovaj lijek se ne smije primijeniti unutar dva sata nakon uzimanja nekog drugog lijeka kroz usta s obzirom na to da može utjecati na učinkovitost drugih lijekova, posebno kod primjene tetraciklina – antibiotika koji se koristi za liječenje nekih infekcija, digoksina – koji se koristi za liječenje nekih srčanih poremećaja, fluorokinolona – skupine antibiotika koju Vam može propisati liječnik, soli željeza - lijekova za liječenje niske razine željeza ili anemije, ketokonazola - lijeka za liječenje gljivičnih infekcija, neuroleptika - lijekova koji se koriste za liječenje psihijatrijskih poremećaja poput shizofrenije, tiroksina - lijeka koji se koristi za liječenje problema sa štitnjačom, penicilamina – antibiotika koji Vam može propisati liječnik, beta-blokatora (atenolol, metoprolol, propranolol) - lijekova koji se koriste za liječenje problema s krvnim tlakom, glukokortikoida - skupine steroida koje Vam liječnik može propisati npr. hidrokortizon, klorokina - lijeka koji se koristi za liječenje malarije, difosfonata (bifosfonata) - lijeka koji se koristi za liječenje slabih kostiju npr. osteoporoze i estramustina - lijeka koji se koristi za liječenje raka prostate.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Lijek smijete koristiti tijekom trudnoće i dojenja.

Gaviscon oralna suspenzija sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži 142,6 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u 10 ml. To odgovara 7,1 % preporučenog maksimalnog dnevног unosa soli za odraslu osobu.

Najveća preporučena dnevna doza ovog lijeka sadrži 1140,8 mg natrija (nalazi se u kuhinjskoj soli). To je ekvivalent 57% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrija za odrasle osobe.

Obratite se svom ljekarniku ili liječniku ako trebate uzimati Gaviscon oralnu suspenziju svakodnevno tokom dužeg vremenskog razdoblja, posebno ako su Vam savjetovali dijetu sa malo soli (na primjer u nekim slučajevima oštećenja bubrega i srčanih oboljenja).

Gaviscon oralna suspenzija sadrži kalcij.

Doza od 10 ml sadrži 64 mg kalcija, a maksimalna dnevna doza (80 ml) iznosi 512 mg. Stoga je nužan oprez ukoliko su Vam savjetovali dijetu sa smanjenim unosom kalcija. Obratite se svom liječniku prije nego uzmete ovaj lijek ako patite od bubrežnih kamenaca ili visokih razina kalcija u krvi.

Gaviscon oralna suspenzija sadrži metilparahidroksibenzoat (E218) i propilparahidroksibenzoat (E216) koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće su i odgođene reakcije).

3. Kako uzimati Gaviscon oralnu suspenziju

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Za primjenu kroz usta. Prije primjene bočicu dobro protresite.

Primjena u odraslih, uključujući starije osobe, i adolescenata starijih od 12 godina

10 – 20 ml (dvije do četiri pune čajne žličice od 5 ml) nakon obroka i prije spavanja ili kako je propisano (do najviše četiri puta na dan).

Primjena u djece mlađe od 12 godina

Lijek nije za primjenu u djece. Djeca mlađa od 12 godina lijek smiju koristiti samo prema preporuci liječnika.

Ako uzmete više Gaviscon oralne suspenzije nego što ste trebali

Ako ste uzeli previsoku dozu lijeka, možete osjetiti nadutost. Iako nije vjerojatno da će Vam visoka doza lijeka naškoditi, obavezno se obratite liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Gaviscon oralnu suspenziju

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadiли zaboravljenu dozu. Iduću dozu uzmite u običajeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Vrlo rijetko (može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba koje uzimaju lijek) zabilježena je pojava anafilaktičkih reakcija, anafilaktoidnih reakcija, preosjetljivosti, urtikarije (koprivnjače) i bronhospazma (piskanje pri disanju zbog sužavanja dišnih puteva). Simptomi mogu uključivati osip na koži, svrbež, otežano disanje, omaglicu te oticanje lica, usana, jezika ili grla.

Ako primijetite bilo koji od navedenih simptoma, ODMAH prekinite uzimati lijek i обратите се hitnoj medicinskoj pomoći.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Gaviscon oralnu suspenziju

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30 °C.

Lijek se ne smije čuvati u hladnjaku niti zamrzivaču.

Prije prve primjene lijeka, provjerite da je pakiranje neoštećeno.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja boćice: 6 mjeseci

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Gaviscon oralna suspenzija sadrži

Djelatne tvari su natrijev alginat, natrijev hidrogenkarbonat i kalcijev karbonat.

Pomoćne tvari su karbomer, metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216), saharinnatrij, natrijev hidroksid, eterično ulje paprene metvice, i pročišćena voda.

Pogledajte dio 2. ove upute.

Kako Gaviscon oralna suspenzija izgleda i sadržaj pakiranja

Gaviscon oralna suspenzija je neprozirna, bjelkasta do kremasta suspenzija s mirisom i okusom peperminta. Dostupna je u boćicama od 150 ml i 300 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**Nositelj odobrenja**

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

Proizvođač

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2022.