

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Gribero 75 mg tvrde kapsule dabigatraneteksilat

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Gribero i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gribero
3. Kako uzimati Gribero
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Gribero
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Gribero i za što se koristi

Gribero sadrži djelatnu tvar dabigatraneteksilat i pripada skupini lijekova koji se nazivaju antikoagulansi. Djeluje blokiranjem tvari u tijelu koja sudjeluje u stvaranju krvnih ugrušaka.

Gribero se primjenjuje u odraslih za:

- sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka u venama nakon kirurškog zahvata ugradnje endoproteze koljena ili kuka.

Gribero se primjenjuje u djece za:

- liječenje krvnih ugrušaka i sprječavanje ponovne pojave krvnih ugrušaka.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gribero

##### Nemojte uzimati Gribero:

- ako ste alergični na dabigatraneteksilat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate značajno smanjenu funkciju bubrega
- ako trenutno krvarite
- ako imate bolest organa u tijelu koja povećava rizik od teškog krvarenja (npr. vrijed želuca, ozljedu mozga ili krvarenje u mozgu, nedavni kirurški zahvat na mozgu ili očima)
- ako imate povećanu sklonost krvarenju. Ono može biti urođeno, nepoznatog uzroka ili uzrokovano drugim lijekovima
- ako uzimate lijekove za sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka (npr. varfarin, rivaroksaban, apiksaban ili heparin), osim kada mijenjate antikoagulacijsko liječenje, dok imate postavljenu vensku ili arterijsku cijev kroz koju dobivate heparin za održavanje njene prohodnosti ili dok se uspostavljaju pravilni otkucaji srca postupkom koji se zove kateterska ablacija radi fibrilacije atrijske
- ako imate teško oštećenu funkciju ili bolest jetre, koja bi mogla imati smrtan ishod

- ako uzimate na usta ketokonazol ili itrakonazol, lijekove za liječenje gljivičnih infekcija
- ako uzimate na usta ciklosporin, lijek za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije;
- ako uzimate dronedaron, lijek koji se primjenjuje za liječenje nepravilnih otkucaja srca
- ako uzimate kombinirani lijek koji sadrži glekaprevir i pibrentasvir, antivirusni lijek koji se primjenjuje za liječenje hepatitisa C
- ako Vam je ugrađen umjetni srčani zalistak zbog čega Vam je trajno potrebno razrjeđivanje krvi.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Gribero. Također se savjetujte s liječnikom tijekom liječenja ovim lijekom ako primijetite simptome ili se morate podvrgnuti kirurškom zahvatu.

**Obavijestite liječnika** ako imate ili ste imali medicinska stanja ili bolesti, posebice one sa sljedećeg popisa:

- ako ste pod povećanim rizikom od krvarenja, primjerice
  - ako ste nedavno krvarili
  - ako ste tijekom proteklog mjeseca bili na kirurškom zahvatu uzimanja tkiva (biopsiji)
  - ako ste imali tešku ozljedu (npr. prijelom kosti, ozljedu glave ili ozljedu koja zahtijeva kirurško liječenje)
  - ako patite od upale jednjaka ili želuca
  - ako imate probleme s vraćanjem želučanih sokova u jednjak
  - ako uzimate lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja. Pogledajte „Drugi lijekovi i Gribero“ u nastavku.
  - ako uzimate protuupalne lijekove, kao što su diklofenak, ibuprofen, piroksikam
  - ako patite od infekcije srca (bakterijski endokarditis)
  - ako imate smanjenu bubrežnu funkciju ili patite od dehidracije (simptomi uključuju osjećaj žeđi te stvaranje smanjene količine urina koji je tamne boje (koncentriran / pjeneći))
  - ako ste stariji od 75 godina
  - ako ste odrastao bolesnik i imate 50 kg ili manje
  - samo ako se primjenjuje u djece: ako dijete ima infekciju oko ili unutar mozga.
- ako ste imali srčani udar ili Vam je dijagnosticirano stanje koje povećava rizik nastanka srčanog udara
- ako imate bolest jetre koja je povezana s promjenama u nalazima krvi. U tom slučaju ne preporučuje se primjena ovog lijeka.

### **Budite posebno oprezni s lijekom Gribero**

- ako trebate imati operaciju:
 

U tom slučaju, primjenu lijeka Gribero potrebno je privremeno prekinuti zbog povećanog rizika od krvarenja tijekom ili kratko nakon operacije. Veoma je važno uzeti Gribero prije i nakon operacije točno u vrijeme kada Vam je liječnik rekao da ga uzmete.
- ako operacija uključuje uvođenje katetera ili injekciju u kralježnicu (npr. zbog epiduralne ili spinalne anestezije ili smanjenja bolova):
  - veoma je važno uzeti Gribero prije i nakon operacije točno u vrijeme kada Vam je liječnik rekao da ga uzmete.
  - odmah obavijestite svog liječnika ako osjetite utrnulost ili slabost u nogama ili tegobe s crijevima ili mokraćnim mjehurom nakon prestanka anestezije, jer to zahtijeva hitno liječenje.

- ako padnete ili se ozlijedite tijekom liječenja, posebice ako udarite glavom. Molimo, smjesta potražite medicinsko zbrinjavanje. Možda će Vas trebati pregledati liječnik, jer možete biti pod povećanim rizikom od krvarenja.
- ako znate da imate bolest koja se naziva antifosfolipidni sindrom (poremećaj imunološkog sustava koji uzrokuje povećani rizik od nastanka krvnih ugrušaka), obavijestite o tome svog liječnika koji će odlučiti postoji li potreba za izmjenom terapije.

### **Drugi lijekovi i Gribero**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. **Osobito morate obavijestiti svog liječnika prije uzimanja lijeka Gribero ako uzimate jedan od lijekova sa sljedećeg popisa:**

- lijekovi koji sprječavaju stvaranje krvnih ugrušaka (npr. varfarin, fenpropakumon, acenokumarol, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroksaban, acetilsalicilatna kiselina)
- lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol, itrakonazol), osim ako se samo nanose na kožu
- lijekovi za liječenje abnormalnih otkucaja srca (npr. amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil). Ako uzimate lijekove koji sadrže amiodaron, kinidin ili verapamil, liječnik Vam može savjetovati da primijenite sniženu dozu lijeka Gribero ovisno o stanju za koje Vam je ona propisana. Pogledajte dio 3.
- lijekovi za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije (npr. takrolimus, ciklosporin)
- kombinirani lijek koji sadrži glekaprevir i pibrentasvir (antivirusni lijek koji se primjenjuje za liječenje hepatitisa C)
- protuupalni lijekovi i lijekovi protiv bolova (npr. acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, diklofenak)
- gospina trava, biljni lijek protiv depresije
- antidepresivi koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili inhibitori ponovne pohrane serotonina-noradrenalina
- rifampicin ili klaritromicin (dva antibiotika)
- antivirusni lijekovi za liječenje AIDS-a (npr. ritonavir)
- određeni lijekovi za liječenje epilepsije (npr. karbamazepin, fenitoin).

### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Učinci lijeka Gribero na trudnoću i nerođeno dijete nisu poznati. Ne smijete uzimati ovaj lijek ako ste trudni, osim ako Vam liječnik ne savjetuje da je njegova primjena sigurna. Ako ste žena reproduktivne dobi, trebate izbjegavati trudnoću dok uzimate Gribero.

Ne smijete dojiti dok uzimate Gribero.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Gribero nema poznatih učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

### **Gribero sadrži natrij**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tvrdoj kapsuli, tj. zanemarive količine natrija.

### 3. Kako uzimati Gribero

Gribero kapsule mogu se primijeniti u odraslih i djece u dobi od 8 godina ili više koja mogu progutati cijele kapsule. Za liječenje djece ispod 8 godina postoje drugi oblici doziranja prikladni za tu dob.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

**Primjenjujte Gribero kako je preporučeno za sljedeća stanja:**

Sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon kirurškog zahvata ugradnje endoproteze koljena ili kuka

Preporučena doza je **220 mg jedanput dnevno** (uzeta u obliku 2 kapsule od 110 mg).

Ukoliko imate  **smanjenu bubrežnu funkciju** za više od pola ili ako imate **75 ili više godina**, preporučena doza je **150 mg jedanput dnevno** (uzeta u obliku 2 kapsule od 75 mg).

Ako uzimate lijekove koji sadrže **amiodaron, kinidin ili verapamil**, preporučena doza je **150 mg jedanput dnevno** (uzeta u obliku 2 kapsule od 75 mg).

Ako uzimate **lijekove koji sadrže verapamil, a imate smanjenu bubrežnu funkciju** za više od pola, morate se liječiti sniženom dozom od **75 mg** lijeka Gribero jer postoji mogućnost povećanog rizika od krvarenja.

Kod oba tipa kirurškog zahvata, liječenje se ne smije početi ukoliko postoji krvarenje iz mjesta gdje je zahvat izveden. Ukoliko liječenje ne može započeti sve do dana nakon zahvata, doziranje treba započeti s 2 kapsule jedanput dnevno.

Nakon kirurškog zahvata ugradnje endoproteze koljena

Liječenje lijekom Gribero počinje unutar 1-4 sata nakon završetka kirurškog zahvata, s uzimanjem jedne kapsule. Nakon toga se uzimaju dvije kapsule jedanput dnevno u ukupnom trajanju od 10 dana.

Nakon kirurškog zahvata ugradnje endoproteze kuka

Liječenje lijekom Gribero počinje unutar 1-4 sata nakon završetka kirurškog zahvata, s uzimanjem jedne kapsule. Nakon toga se uzimaju dvije kapsule jedanput dnevno u ukupnom trajanju od 28-35 dana.

Liječenje krvnih ugrušaka i sprječavanje ponovne pojave krvnih ugrušaka u djece

**Gribero je potrebno uzimati dvaput dnevno**, jednu dozu ujutro i jednu dozu uvečer, približno u isto vrijeme svakog dana. Potrebno je da interval doziranja iznosi što je moguće bliže razdoblju od 12 sati.

Preporučena doza ovisi o tjelesnoj težini i dobi. Vaš liječnik će odrediti ispravnu dozu. S napredovanjem liječenja Vaš liječnik može prilagoditi dozu. Nastavite s korištenjem drugih lijekova osim ako Vam liječnik ne kaže da prestanete koristiti neki lijek.

U tablici 1 prikazane su jednokratne i ukupne dnevne doze lijeka Gribero u miligramima (mg). Doze ovise o tjelesnoj težini bolesnika u kilogramima (kg) i njegovoj dobi u godinama.

Tablica 1: Tablica za doziranje Gribero kapsula

| Kombinacija tjelesna težina/dob | Jednokratna doza | Ukupna dnevna doza |
|---------------------------------|------------------|--------------------|
|---------------------------------|------------------|--------------------|

| Tjelesna težina u kg | Dob u godinama           | u mg | u mg |
|----------------------|--------------------------|------|------|
| 11 do manje od 13 kg | 8 do manje od 9 godina   | 75   | 150  |
| 13 do manje od 16 kg | 8 do manje od 11 godina  | 110  | 220  |
| 16 do manje od 21 kg | 8 do manje od 14 godina  | 110  | 220  |
| 21 do manje od 26 kg | 8 do manje od 16 godina  | 150  | 300  |
| 26 do manje od 31 kg | 8 do manje od 18 godina  | 150  | 300  |
| 31 do manje od 41 kg | 8 do manje od 18 godina  | 185  | 370  |
| 41 do manje od 51 kg | 8 do manje od 18 godina  | 220  | 440  |
| 51 do manje od 61 kg | 8 do manje od 18 godina  | 260  | 520  |
| 61 do manje od 71 kg | 8 do manje od 18 godina  | 300  | 600  |
| 71 do manje od 81 kg | 8 do manje od 18 godina  | 300  | 600  |
| 81 kg ili više       | 10 do manje od 18 godina | 300  | 600  |

Jednokratne doze za koje su potrebne kombinacije više od jedne kapsule:

- 300 mg:       dvije kapsule od 150 mg ili  
                   četiri kapsule od 75 mg
- 260 mg:       jedna kapsula od 110 mg plus jedna kapsula od 150 mg ili  
                   jedna kapsula od 110 mg plus dvije kapsule od 75 mg
- 220 mg:       dvije kapsule od 110 mg
- 185 mg:       jedna kapsula od 75 mg plus jedna kapsula od 110 mg
- 150 mg:       jedna kapsula od 150 mg ili  
                   dvije kapsule od 75 mg

### **Kako uzimati Gribero**

Gribero se može uzimati sa ili bez hrane. Kapsula se treba progutati cijela, s čašom vode kako bi se osiguralo njezino dospijevanje do želuca. Ne lomite, ne žvačite i ne praznite sadržaj iz kapsule jer može doći do povećanog rizika od krvarenja.

### **Upute za otvaranje blistera**

- Gurnite kapsule kroz foliju blistera

### **Upute za otvaranje bočice**

- Pritisnite i okrenite kako biste otvorili.

### **Promjena liječenja antikoagulansima**

Ako niste dobili posebne upute od svog liječnika, ne mijenjajte svoje antikoagulacijsko liječenje.

### **Ako uzmete više lijeka Gribero nego što ste trebali**

Uzimanje prevelike količine ovog lijeka povećava rizik od krvarenja. Odmah se obratite liječniku ako ste uzeli previše kapsula. Dostupne su mogućnosti posebnog liječenja.

### **Ako ste zaboravili uzeti Gribero**

Sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon kirurškog zahvata ugradnje endoproteze koljena ili kuka  
 Nastavite s preostalim dnevnim dozama lijeka Gribero u isto vrijeme sljedećeg dana.  
 Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

### Liječenje krvnih ugrušaka i sprječavanje ponovne pojave krvnih ugrušaka u djece

Propuštenu dozu se može još uvijek uzeti do 6 sati prije vremena sljedeće doze.  
 Propuštenu dozu treba preskočiti ako je preostalo vrijeme do sljedeće doze kraće od 6 sati.  
 Nemojte udvostručiti dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

### **Ako prestanete uzimati Gribero**

Uzimajte Gribero točno kako je propisano. Nemojte prestati uzimati ovaj lijek prije nego što ste o tome razgovarali s liječnikom jer rizik od razvoja krvnog ugruška može biti viši ako prerano prestanete s liječenjem. Obratite se liječniku ako nakon uzimanja lijeka Gribero imate probavne tegobe.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

#### 4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Gribero utječe na zgrušavanje krvi, tako da je većina nuspojava povezana sa znakovima kao što su pojava modrica ili krvarenje. Može doći do pojave velikih ili teških krvarenja, koja predstavljaju najozbiljnije nuspojave te, bez obzira na mjesto, ona mogu biti onesposobljavajuća, opasna po život ili čak dovesti do smrti. U nekim slučajevima, ova krvarenja ne moraju biti vidljiva.

Odmah obavijestite liječnika ako imate krvarenje koje se ne zaustavlja spontano ili ako imate znakove prekomjernog krvarenja (izrazita slabost, umor, bljedilo, omaglica, glavobolja ili neobjašnjeno oticanje). Liječnik će odlučiti hoće li Vas držati pod pažljivijim nadzorom ili promijeniti lijek.

Odmah obavijestite liječnika ako imate ozbiljnu alergijsku reakciju koja izaziva tegobe u disanju ili omaglicu.

Moguće nuspojave su niže navedene, klasificirane prema vjerojatnosti njihovog pojavljivanja.

Spriječavanje stvaranja krvnih ugruška nakon kirurškog zahvata ugradnje endoproteze koljena ili kuka  
**Česte nuspojave** (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- pad količine hemoglobina u krvi (tvar u crvenim krvnim stanicama)
- promijenjeni nalazi laboratorijskih pretraga jetrene funkcije.

**Manje česte nuspojave** (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- krvarenje se može razviti iz nosa, u želudac ili crijeva, iz penisa/vagine ili mokraćnog sustava uključujući krv u urinu koja daje urinu ružičastu ili crvenu boju), iz hemoroida, iz završnog dijela debelog crijeva, ispod kože, u zglob, iz ili nakon ozljede ili nakon operacije
- stvaranje krvnih podljeva (hematoma) ili modrica nakon operacije
- krv u stolici otkrivena laboratorijskim pretragama
- pad broja crvenih krvnih stanica
- smanjenje udjela krvnih stanica
- alergijska reakcija
- povraćanje
- česta meka ili tekuća stolica
- osjećaj mučnine
- sekrecija iz rane (tekućina koja curi iz kirurške rane)
- povišene vrijednosti jetrenih enzima
- žutilo kože ili bjeloočnica, izazvani problemima s jetrom ili krvlju.

**Rijetke nuspojave** (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

krvarenje

- krvarenje se može razviti u mozgu, iz kirurškog reza, iz mjesta primjene injekcije ili mjesta uvođenja katetera u venu
- krvavi iscjedak iz mjesta uvođenja katetera u venu
- iskašljavanje krvi ili krvavog sputuma

- pad broja trombocita u krvi
- pad broja crvenih krvnih stanica nakon operacije
- ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva tegobe u disanju ili omaglicu
- ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva otečenost lica ili grla
- osip na koži koji je vidljiv u obliku tamnocrvenih, izdignutih kvržica koje svrbe, izazvan alergijskom reakcijom
- iznenadna promjena kože koja utječe na njenu boju i izgled
- svrbež
- ulkus na želucu ili crijevima (uključujući ulkus na jednjaku)
- upala jednjaka i želuca
- refluks želučanog soka u jednjak
- bol u trbuhu ili želucu
- probavne tegobe
- otežano gutanje
- tekućina koja izlazi iz rane
- tekućina koja izlazi iz rane nakon operacije.

**Nepoznato** (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- otežano disanje ili piskanje
- sniženje broja ili čak nedostatak bijelih krvnih stanica (koje pomažu u borbi protiv infekcija)
- gubitak kose.

Liječenje krvnih ugrušaka i sprječavanje ponovne pojave krvnih ugrušaka u djece

**Česte nuspojave** (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- pad broja crvenih krvnih stanica u krvi
- pad broja trombocita u krvi
- osip na koži koji je vidljiv u obliku tamnocrvenih, izdignutih kvržica koje svrbe, izazvan alergijskom reakcijom
- iznenadna promjena kože koja utječe na njenu boju i izgled
- stvaranje krvnih podljeva (hematoma)
- krvarenje iz nosa
- refluks želučanog soka u jednjak
- povraćanje
- osjećaj mučnine
- česta meka ili tekuća stolica
- probavne tegobe
- gubitak kose
- povišene vrijednosti jetrenih enzima.

**Manje česte nuspojave** (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- sniženje broja bijelih krvnih stanica (koje pomažu u borbi protiv infekcija)
- krvarenje se može razviti u želudac ili crijeva, iz mozga, iz završnog dijela debelog crijeva, iz penisa/vagine ili mokraćnog sustava (uključujući krv u urinu koja daje urinu ružičastu ili crvenu boju) ili ispod kože
- pad količine hemoglobina u krvi (tvar u crvenim krvnim stanicama)
- smanjenje udjela krvnih stanica
- svrbež
- iskašljavanje krvi ili krvavog sputuma
- bol u trbuhu ili želucu
- upala jednjaka i želuca

- alergijska reakcija
- otežano gutanje
- žutilo kože ili bjeloočnica, izazvani problemima s jetrom ili krvlju.

**Nepoznato** (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- nedostatak bijelih krvnih stanica (koje pomažu u borbi protiv infekcija)
- ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva tegobe u disanju ili omaglicu
- ozbiljna alergijska reakcija koja izaziva otečenost lica ili grla
- otežano disanje ili piskanje
- krvarenje
- krvarenje se može razviti u zglob ili iz ozljede, iz mjesta kirurškog reza ili iz mjesta primjene injekcije ili mjesta uvođenja katetera u venu
- krvarenje može biti iz hemoroida
- ulkus na želucu ili crijevima (uključujući ulkus na jednjaku)
- promijenjeni nalazi laboratorijskih pretraga jetrene funkcije

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Gribero**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, blisteru ili bočici iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

### Blister i bočica

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

### Bočica

Nakon otvaranja, lijek se mora upotrijebiti u roku od 60 dana

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Gribero sadrži**

- Djelatna tvar je dabigatraneteksilat. Jedna tvrda kapsula sadrži 75 mg dabigatraneteksilata (u obliku mesilata).
- Drugi sastojci su:
  - Sadržaj kapsule: tartarata kiselina, hipromeloza (E464), talk, hidroksipropilceluloza, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat
  - Ovojnica kapsule: titanijev dioksid (E171) i hipromeloza (E464)
  - Crna tinta za označavanje: šelak (E904), propilenglikol (E1520), kalijev hidroksid (E525), crni željezov oksid (E172).



## Kako Gribero izgleda i sadržaj pakiranja

Tvrda kapsula

Kapsula veličine „2“ s bijelom, neprozirnom kapičom s crnom tintom otisnutim „MD“ i bijelim, neprozirnim tijelom s crnom tintom otisnutim „75“, koja sadrži mješavinu bijelih do svjetložutih peleta i svjetložutog granulata.

Gribero je dostupan kao:

Opa/Al/desikant PE-Al/PE blister koji sadrži 10, 30, 60, 100, 180 i 200 tvrdih kapsula.

Opa/Al/desikant PE-Al/PE blister koji sadrži 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 100 x 1, 180 x 1 i 200 x 1 tvrdih kapsula u perforiranom blisteru s jediničnom dozom.

Višestruko pakiranje koje sadrži 3 pakiranja od 60x1 tvrde kapsule (180 tvrdih kapsula) u perforiranom Opa/Al/desikant PE-Al/PE blisteru s jediničnom dozom.

Višestruko pakiranje koje sadrži 2 pakiranja od 50x1 tvrde kapsule (100 tvrdih kapsula) u perforiranom Opa/Al/desikant PE-Al/PE blisteru s jediničnom dozom.

Polipropilenska bočica s polipropilenskim navojnim zatvaračem sigurnim za djecu koja sadrži desikant i 60 tvrdih kapsula.

Nemojte progutati desikant (sredstvo za sušenje).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb, Hrvatska

### Proizvođač

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Njemačka

### **Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskoga gospodarskog prostora i Ujedinjenoj Kraljevini (Sjevernoj Irskoj) pod sljedećim nazivima:**

|            |  |
|------------|--|
| Austrija   | Dabigatranetexilat Sandoz 75 mg Hartkapseln          |
| Belgija    | Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg harde capsules     |
| Danska     | Dabigatran etexilate Sandoz                          |
| Finska     | Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg kovat kapselit     |
| Francuska  | DABIGATRAN ETEXILATE SANDOZ 75 mg, gélule            |
| Italija    | Dabigatran etexilato Sandoz                          |
| Island     | Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg hörð hylki         |
| Mađarska   | Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg kemény kapszula    |
| Nizozemska | Dabigatran etexilaat Sandoz 75 mg, harde capsules    |
| Norveška   | Dabigatran etexilate Sandoz                          |
| Njemačka   | Dabigatranetexilat 1 A Pharma 75 mg Hartkapseln      |
| Portugal   | Dabigatrano etexilato Sandoz                         |
| Španjolska | Dabigatrán etexilato Sandoz 75 mg cápsulas duras EFG |
| Švedska    | Dabigatran etexilate Sandoz 75 mg hårda kapslar      |

Ujedinjena Kraljevina Dabigatran etexilate Sandoz 75mg Hard Capsules  
(Sjeverna Irska)

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2023.**