

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Iberohexa oralne kapi, tekućina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Iberohexa i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Iberohexa
3. Kako uzimati lijek Iberohexa
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Iberohexa
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Iberohexa i za što se koristi

Iberohexa je biljni lijek za liječenje funkcionalne dispepsije s glavnim simptomima kao što su bol u želucu, žarenje u gornjem dijelu trbuha, osjećaj punoće nakon jela i rani osjećaj sitosti, ali često i gubitak apetita, prekomjerno podrigivanje i žgaravica.

Iberohexa je indiciran u odraslih starijih od 18 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati lijek Iberohexa

Nemojte uzimati lijek Iberohexa

Ako ste alergični na bilo koju od djelatnih tvari (gorka ognjica, cvijet kamilice, plod kima, listovi matičnjaka, listovi paprene metvice ili sladićev korijen) ili neke druge biljke iz porodice Apiaceae ili Asteraceae.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Iberohexa.

Obratite se liječniku ili ljekarniku nakon 7 dana ako se ne osjećate bolje, ako se osjećate lošije ili Vam se jave nove tegobe kako biste isključili osnovnu bolest

Djeca i adolescenti

Primjena lijeka Iberohexa u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena zbog nedostatka odgovarajućih podataka. Stoga se primjena u djece i adolescenata ne preporučuje.

Drugi lijekovi i Iberohexa

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nema poznatih interakcija među lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema podataka ili su podaci o primjeni lijeka Iberohexa u trudnica ograničeni. Kao mjera predostrožnosti, preporučuje se izbjegavati primjenu lijeka Iberohexa tijekom trudnoće.

Nema dovoljno podataka o izlučivanju djelatnih sastojaka lijeka Iberohexa ili njihovih metabolita u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Obratite se liječniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Iberohexa ne utječe ili zanemarljivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Iberohexa sadržava etanol

Ovaj lijek sadrži 240 mg alkohola (etanola) u 20 kapi. Količina u jednoj dozi (20 kapi / 1 ml) ovog lijeka odgovara količini koja se nalazi u manje od 7 ml piva ili 3 ml vina. Mala količina alkohola prisutna u ovom lijeku neće imati nikakav zamjetan učinak.

3. Kako uzimati lijek Iberohexa

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli stariji od 18 godina:

20 kapi 3 puta dnevno

Bolesnici sa smanjenom funkcijom bubrega ili jetre:

Nema dovoljno podataka za preporuku specifične doze u slučaju smanjene funkcije bubrega ili jetre.

Način primjene


Uzeti u malo tekućine prije jela ili uz jelo.

Kroz usta.

Protresite prije uporabe!

Bočicu s kapaljkom držite pod kutom od 45° tijekom doziranja. Nakon primjene čvrsto zatvorite ljubičasti čep.

Upute za prvu uporabu kapaljke



1. Skinuti poklopac i ukloniti bijeli dio.
2. Ljubičasti poklopac zavrnuti i stegnuti rukom kako bi se umetnula kapaljka.
3. Osigurati da je kapaljka dobro umetnuta.

Trajanje primjene

Ako simptomi traju i tijekom primjene lijeka, treba se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom (pročitajte i upozorenja u dijelu 2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati lijek Iberohexa).

Primjena u djece i adolescenata

Primjena lijeka Iberohexa u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena zbog nedostatka odgovarajućih podataka. Stoga se primjena u djece i adolescenata ne preporučuje.

Ako uzmete više lijeka Iberohexa nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli više kapi nego što je preporučeno, to ne bi trebalo imati negativan utjecaj. Ako ste uzeli značajno višu dozu od preporučene, posavjetujte se s liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Iberohexa

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Mogu se javiti alergijske reakcije sa simptomima poput problema s disanjem ili reakcija na koži poput svrbeža ili osipa. Na temelju dostupnih podataka, učestalost nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Iberohexa

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici na bočici iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj se lijek može upotrebljavati 8 tjedana nakon otvaranja bočice.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Iberohexa

Djelatne tvari su:

1 ml sadrži:

0,15 ml tekućeg ekstrakta gorke ognjice (*Iberis amara, platna tota recens*) (1:1,5 – 2,5), ekstrakcijsko otapalo etanol 50 % V/V

0,30 ml tekućeg ekstrakta cvijeta kamilice (*Matricaria recutita flos*) (1:2 – 4), ekstrakcijsko otapalo etanol 30 % V/V
0,20 ml tekućeg ekstrakta ploda kima (*Carum carvi, fructus*) (1:2,5 – 3,5), ekstrakcijsko otapalo etanol 30 % V/V
0,15 ml tekućeg ekstrakta listova matičnjaka (*Melissa officinalis, folium*) (1:2,5 – 3,5), ekstrakcijsko otapalo etanol 30 % V/V
0,10 ml tekućeg ekstrakta listova paprene metvice (*Mentha piperita, folium*) (1: 2,5 – 3,5), ekstrakcijsko otapalo etanol 30 % V/V
0,10 ml tekućeg ekstrakta korijena sladića (*Glycyrrhiza species, radix*) (1:2,5 – 3,5), ekstrakcijsko otapalo etanol 30 % V/V

Ukupan sadržaj etanola 31 % V/V

1 ml = 20 kapi

Kako Iberohexa izgleda i sadržaj pakiranja

Iberohexa je tamno smeđa, bistra do blago mutna tekućina, pakirana u tamnožute staklene bočice sa sustavom zatvaranja koji uključuje kapaljku i čep s navojem.

Veličina pakiranja: 20 ml, 50 ml ili 100 ml
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

Proizvođač

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija: Iberogast BALANCE Tropfen zum Einnehmen
Bugarska: Iberogast Compact
Hrvatska: Iberohexa oralne kapi, tekućina
Estonija: Iberoherb
Mađarska: Iberogast Select belsőleges oldatos cseppek
Litva: Iberoherb geriamasis skystis
Norveška: Iberoherb
Poljska: Iberogast Balance
Rumunjska: Iberogast Confort picături orale, soluție
Slovačka: Iberogast NEO
Slovenija: Iberohexa peroralne kapljice, raztopina
Švedska: Iberoherb

Ova uputa je zadnji put revidirana u travnju 2023.