

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

LUPOCET 1000 mg čepići

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su LUPOCET 1000 mg čepići i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće
3. Kako primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LUPOCET 1000 mg čepiće
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su LUPOCET 1000 mg čepići i za što se koriste

LUPOCET 1000 mg čepići sadrže djelatnu tvar paracetamol koji je antipiretik (pomaže pri snižavanju povišene tjelesne temperature) i analgetik (lijek protiv bolova).

LUPOCET 1000 mg čepići se koriste za simptomatsko liječenje blagih do umjerenih bolova i/ili povišene tjelesne temperature.

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu u odraslih i adolescenata starijih od 15 godina čija je tjelesna masa veća od 50 kg.

Primjena čepića osobito je pogodna za bolesnike koji ne mogu uzimati sirup, kapsule ili tablete.

Obavezno se obratite svom liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće

Nemojte primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće:

- ako ste alergični na paracetamol, soju, kikiriki ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego počnete primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće. Kod primjene ovog lijeka potreban je oprez i prethodno savjetovanje s liječnikom:

- ako ste kronično ovisni o alkoholu
- ako patite od oštećenja funkcije jetre (upala jetre, Gilbertov sindrom)
- u slučaju ranije poznatog oštećenja funkcije bubrega
- u slučaju bolesti koje mogu biti praćene smanjenom razinom glutaciona (npr. kod šećerne bolesti, HIV-a, Downovog sindroma, tumora)
- ako bolujete od teških bolesti, uključujući teško oštećenje bubrega ili sepsu (kada bakterije i njihovi toksini cirkuliraju u krvi, što dovodi do oštećenja organa) ili ako patite od

pothranjenosti, kroničnog alkoholizma ili ako ujedno uzimate flukloksacilin (antibiotik). Ozbiljno stanje koje se naziva metabolička acidoza (poremećaj krvi i tekućine) zabilježeno je u bolesnika u tim situacijama kada se paracetamol primjenjuje u redovitim dozama tijekom duljeg razdoblja ili kada se paracetamol uzima zajedno s flukloksacilinom. Simptomi metaboličke acidoze mogu uključivati: ozbiljne poteškoće s disanjem koje uključuju duboko ubrzano disanje, omamljenost, mučninu i povraćanje.

U gore navedenim slučajevima Vaš liječnik će razmotriti produljenje intervala između dvije doze i smanjenje dnevne doze lijeka.

Obavijestite svog liječnika u slučaju visoke tjelesne temperature, ako se simptomi pogoršaju ili ako nakon 3 dana ne nastupi poboljšanje.

Tijekom primjene LUPOCET 1000 mg čepića ne smiju se uzimati drugi lijekovi koji sadrže paracetamol zbog rizika od predoziranja, uključujući i lijekove koji se uzimaju na usta.

Dugotrajna uporaba viših doza lijekova protiv bolova, protivno njihovoj osnovnoj namjeni, može izazvati glavobolje, koje se u tom slučaju ne smiju liječiti povećanim dozama tih istih lijekova.

Općenito, dugotrajna navika primjene lijekova protiv bolova (analgetika), osobito u kombinaciji više djelatnih tvari s analgetskim djelovanjem, može dovesti do trajnog oštećenja bubrega uz rizik zatajenja bubrega (analgetska nefropatija).

Kod naglog prekida dugotrajne neodgovarajuće primjene visokih doza analgetika mogu se pojaviti glavobolja, umor, bolovi u mišićima, nervoza i vegetativni simptomi. Simptomi izazvani prestankom primjene nestaju kroz nekoliko dana. Do tada se ne smiju primjenjivati analgetici, a ponovna primjena ne smije se započeti bez savjetovanja s liječnikom.

Ne koristite LUPOCET 1000 mg čepiće dulje vrijeme, ni u dozama višim od preporučenih, bez savjetovanja s liječnikom ili stomatologom.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili pak niste sigurni, obratite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i LUPOCET 1000 mg čepići

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili bi mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET 1000 mg čepića:

- lijekove za liječenje gihta, kao što je probenecid: u slučaju istovremenog uzimanja s probenecidom, dozu LUPOCET 1000 mg čepića trebalo bi smanjiti, zato što razgradnja LUPOCET 1000 mg čepića može biti usporena
- lijekove za spavanje (kao što je fenobarbital), lijekove za liječenje epilepsije (kao što su fenitoin i karbamazepin), lijekove za liječenje tuberkuloze (rifampicin) i druge lijekove koji mogu oštetiti jetru. U slučaju njihovog istodobnog uzimanja s LUPOCET 1000 mg čepićima, mogu se javiti oštećenja jetre.
- lijekove za snižavanje povećanih vrijednosti masnoće u krvi (kolestiramin): ovi lijekovi mogu smanjiti apsorpciju i time djelotvornost LUPOCET 1000 mg čepića
- lijekove za liječenje infekcija HIV-om (zidovudin): povećana je sklonost smanjivanju broja bijelih krvnih stanica (neutropenija) te bi se LUPOCET 1000 mg čepići trebali istovremeno primjenjivati sa zidovudinom samo uz savjetovanje s liječnikom
- flukloksacilin (antibiotik), zbog ozbiljnog rizika od poremećaja krvi i tekućine (poznatog kao metabolička acidoza) koji se mora hitno liječiti (vidjeti dio 2.).

Učinak na rezultate laboratorijskih pretraga:

Uporaba paracetamola može utjecati na određivanje vrijednosti mokraćne kiseline i određivanje vrijednosti glukoze u krvi.

LUPOCET 1000 mg čepići s hranom, pićem i alkoholom

LUPOCET 1000 mg čepići se ne smiju primjenjivati zajedno s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

LUPOCET 1000 mg čepići mogu se primjenjivati tijekom trudnoće, ako je neophodno. Trebate uzeti najnižu moguću dozu koja Vam ublažava bol i/ili snižava vrućicu i uzimati je što je moguće kraće. Obratite se liječniku ako nije došlo do ublažavanja boli i/ili snižavanja vrućice ili ako lijek trebate uzimati češće.

Paracetamol prelazi u majčino mlijeko. Budući da dosad nisu poznati neželjeni učinci za dojenče, LUPOCET 1000 mg čepići se mogu primjenjivati tijekom dojenja u preporučenim dozama.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET 1000 mg čepići nemaju utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

LUPOCET 1000 mg čepići sadrže lecitin

Ovaj lijek sadrži lecitin porijeklom iz soje. Ako ste alergični na soju ili kikiriki, nemojte primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće.

3. Kako primjenjivati LUPOCET 1000 mg čepiće

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi i starosti (pogledajte Tablicu 1.).

Vremenski interval doziranja ovisi o simptomima i najvećoj ukupnoj dnevnoj dozi te treba iznositi najmanje 6 sati.

Ako tegobe potraju dulje od 3 dana, potrebno je posavjetovati se s liječnikom.

Tablica 1. Doziranje LUPOCET 1000 mg čepića

Tjelesna masa (starost)	Pojedinačna doza (odgovarajuća doza paracetamola)*	Najveća dnevna doza (odgovarajuća doza paracetamola)
Više od 50 kg (adolescenti stariji od 15 godina i odrasli)	1 čepić (što odgovara 1000 mg paracetamola)	4 čepića (što odgovara 4000 mg paracetamola)**

*Razmak između pojedinačnih doza mora biti najmanje 6 sati.

**Obično nije potrebno prekoračiti dozu paracetamola od 3 g/dan (što odgovara 3 čepića na dan). Ipak, u slučaju umjereno jakih bolova, doza se iznimno može povisiti na 4 g/dan (što odgovara 4 čepića na dan), što je i najveća dozvoljena dnevna doza.

Najveća dnevna doza navedena u tablici se ne smije prekoračiti.

Obratite se liječniku ili ljekarniku ako imate dojam da je djelovanje lijeka prejak ili preslabo.

Način primjene

Za rektalnu primjenu.

Čepić stavite duboko u debelo crijevo (čmar), po mogućnosti nakon pražnjenja stolice. Kako biste olakšali stavljanje čepića, možete ga zagrijati u ruci ili kratko uroniti u toplu vodu.

Trajanje liječenja

Ne preporučuje se primjena dulje od 3 dana bez savjeta liječnika. U slučaju da se unatoč primjeni lijeka tegobe ne ublaže ili se pogoršaju, potražite savjet liječnika.

U niže navedenih posebnih skupina bolesnika, liječenje je dozvoljeno uz nadzor liječnika koji će po potrebi prilagoditi doziranje (smanjiti dnevnu dozu i produljiti vremenski razmak između dvije doze lijeka):

Oštećenje funkcije jetre i/ili blago oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s poremećajem rada jetre ili bubrega, kao i s Gilbertovim sindromom, vremenski razmak između dvije pojedinačne doze treba biti najmanje 8 sati.

Teško oštećenje funkcije bubrega

U bolesnika s teškim poremećajem rada bubrega (klirens kreatinina <10 ml/min), vremenski razmak između dvije pojedinačne doze treba biti najmanje 8 sati.

Stariji bolesnici

U starijih osoba nije potrebno prilagođavanje doze.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena LUPOCET 1000 mg čepića kod djece mlađe od 15 godina, odnosno tjelesne mase ispod 50 kg, jer jačina lijeka nije prikladna za ovu skupinu bolesnika. Međutim, postoje odgovarajuće jačine i oblici lijeka prikladni za ovu skupinu bolesnika.

Ako primijenite više LUPOCET 1000 mg čepića nego što ste trebali

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika.

Tijekom primjene LUPOCET 1000 mg čepića ne smiju se uzimati drugi lijekovi koji sadrže paracetamol zbog rizika od predoziranja (uključujući lijekove koje se uzimaju na usta).

Ukupna dnevna doza paracetamola kod odraslih i adolescenata starijih od 15 godina, odnosno tjelesne mase iznad 50 kg, ne smije prelaziti 4000 mg (što odgovara 4 LUPOCET 1000 mg čepića).

U slučaju predoziranja tegobe se u pravilu javljaju unutar 24 sata i uključuju mučninu, povraćanje, gubitak apetita, blijedilo i bolove u trbuhu.

Ako ste zaboravili primijeniti LUPOCET 1000 mg čepiće

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati lijek i obavijestite odmah liječnika u slučaju pojave sljedećih nuspojava:

- reakcije preosjetljivosti kao što su crvenilo kože, kopriivnjača (vrsta kožnog osipa sa svjetlocrvenim uzdignućima koja svrbe) i šok (jako sniženje krvnog tlaka koje uzrokuje gubitak svijesti).

Rijetke (mogu se u javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- blago povećanje razine određenih jetrenih enzima (serumske transaminaze).

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- promjene u krvnoj slici, kao što su smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija) ili izraženo smanjenje određenih bijelih krvnih stanica (agranulocitoza)

- prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija
- suženje dišnih putova moguće je kod osjetljivih osoba (astma prouzročena analgeticima).

Nepoznate (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

- ozbiljno stanje koje može povećati kiselost krvi (poznato kao metabolička acidoza) u bolesnika s teškom bolešću koji uzimaju paracetamol (vidjeti dio 2.).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET 1000 mg čepiće

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUPOCET 1000 mg čepići sadrže

Djelatna tvar je paracetamol.

Jedan čepić sadrži 1000 mg paracetamola.

Pomoćne tvari u čepiću su tvrda mast i lecitin porijeklom iz soje.

Kako LUPOCET 1000 mg čepići izgledaju i sadržaj pakiranja

LUPOCET 1000 mg čepići su bijele do gotovo bijele boje, dimenzija 28 mm x 11 mm.

10 (2x5) čepića u strip (Al/PE) pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2025.