

## Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

**MST Continus 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem**  
**MST Continus 30 mg tablete s produljenim oslobađanjem**  
**MST Continus 60 mg tablete s produljenim oslobađanjem**  
**MST Continus 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem**

morfinsulfat

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je MST Continus i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati MST Continus
3. Kako uzimati MST Continus
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati MST Continus
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### **1. Što je MST Continus i za što se koristi**

MST Continus tablete s produljenim oslobađanjem sadržavaju djelatnu tvar morfinsulfat. Morfin pripada skupini jakih lijekova protiv bolova koji se zovu opiodi. Liječnik Vam je propisao ove tablete za dugotrajno ublažavanje jakih bolova.

### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati MST Continus**

#### **Nemojte uzimati MST Continus**

- ako ste alergični na morfin (kao sulfat) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
- ako imate problema s disanjem, kao što je opstruktivna bolest dišnih putova, depresiju disanja ili teška astma. Liječnik će Vam reći ako se to odnosi na Vas. Simptomi mogu uključivati otežano disanje, kašalj, sporije ili slabije disanje nego inače;
- ako ste pretrpjeli povredu glave koja uzrokuje jake glavobolje ili mučnine jer tablete mogu pogoršati te simptome ili prikriti težinu povrede;
- ako ste u stanju u kojem Vaše tanko crijevo ne radi kako treba (tzv. paralitički ileus), ako imate usporeno pražnjenje želuca ili ako imate jake bolove u trbuhu (akutni abdomen);
- ako imate akutnu jetrenu bolest;
- ako uzimate lijekove koji se zovu inhibitori monoaminoooksidaze (MAO) koji se koriste za liječenje teške depresije i Parkinsonove bolesti. Obavijestite liječnika i ako ste uzimali ovu vrstu lijekova u prethodna dva tjedna.
- prije operacije ni tijekom prva 24 sata poslije operacije.

Ovaj lijek nemojte davati djeci mlađoj od jedne godine.

### Tolerancija i ovisnost

Ovaj lijek sadrži morfin, koji je opioidni lijek. Ponavljana primjena opioida može dovesti do toga da lijek bude manje učinkovit (naviknete se na njega, što se naziva tolerancija). Također, ponavljana primjena lijeka MST Continus može dovesti do ovisnosti i zlorabe, što može rezultirati predoziranjem opasnim po život. Rizik od ovih nuspojava može se povećati uz veću dozu i dulje trajanje primjene. Ovisnost može stvoriti osjećaj kao da više ne kontrolirate to koliko lijeka trebate uzimati ili koliko često ga trebate uzimati. Rizik od razvoja ovisnosti razlikuje se od osobe do osobe. Možda Vam prijeti veći rizik od razvoja ovisnosti o lijeku MST Continus:

- ako ste Vi ili netko u Vašoj obitelji ikada prije zlorabljivali ili bili ovisni o alkoholu, lijekovima na recept ili nezakonitim drogama („ovisnost“)
- ako ste pušač
- ako ste ikada imali problema s raspoloženjem (depresija, tjeskoba ili poremećaj osobnosti) ili Vas je psihijatar liječio zbog drugih mentalnih bolesti.

Ako tijekom terapije lijekom MST Continus primijetite bilo koji od sljedećih znakova, to može biti znak da ste postali ovisni:

- imate potrebu uzimati lijek dulje nego što Vam je to savjetovao liječnik
- imate potrebu uzimati veću dozu od preporučene
- uzimate lijek iz razloga zbog kojih Vam lijek nije propisan, primjerice, „kako biste ostali smireni” ili „da biste lakše zaspali”
- u nekoliko ste navrata neuspješno pokušavali prestati s uzimanjem ili kontrolirati uzimanje ovog lijeka
- kada prestanete uzimati lijek osjećate se loše, a nakon ponovnog uzimanja lijeka osjećate se bolje („simptomi ustezanja”).

Ako primijetite bilo koji od navedenih znakova, obratite se liječniku i posavjetujte se o najboljem načinu liječenja za Vas, među ostalim i o tome kada je primjereno prekinuti liječenje te kako sigurno prekinuti liječenje (pogledajte dio 3. „Ako prestanete uzimati MST Continus“).

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako prilikom uzimanja lijeka MST Continus primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

- povećana osjetljivost na bol unatoč činjenici da uzimate povećane doze (hiperalgezija). Vaš liječnik će odlučiti trebate li promijeniti dozu ili vrstu snažnog analgetika (lijeka protiv bolova) (vidjeti dio 2.).
- slabost, umor, gubitak apetita, mučnina, povraćanje ili nizak krvni tlak. To može biti simptom nedostatke proizvodnje hormona kortizola u nadbubrežnim žlijezdama pa ćete možda morati uzimati nadomjestak hormona.
- gubitak libida, impotencija, prestanak menstruacije. To može biti uzrokovano smanjenim stvaranjem spolnog hormona.
- ako ste u prošlosti bili ovisni o drogama ili alkoholu. Također obavijestite liječnika ako tijekom uzimanja lijeka imate osjećaj da postajete ovisni o ovom lijeku. Možda ste počeli intenzivno razmišljati o tome kada možete uzeti sljedeću dozu, čak i ako vam nije potrebna za ublažavanje boli.
- simptomi apstinencije ili ovisnosti. Najčešći simptomi apstinencije navedeni su u dijelu 3. Ako nastupe, vaš liječnik može promijeniti vrstu lijeka ili vremenske razmake između doza.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako:

- imate poteškoće s normalnim disanjem, kao što je poremećaj plućne funkcije ili teška bronhalna astma. Simptomi mogu uključivati otežano disanje i kašalj;
- imate smanjenu funkciju štitnjače (hipotireoidizam), teške poteškoće s bubrezima ili jetrom, jer ćete vjerojatno trebati manju dozu;
- imate jaku glavobolju ili osjećaj mučnine, jer to može upućivati na povišen tlak u lubanji

- imate konvulzije (oboljenja koja uzrokuju grčeve, npr. epilepsija);
- imate niski krvni tlak i smanjen volumen krvi (hipotenzija zbog hipovolemije);
- imate ograničen protok zraka u dišnom sustavu
- imate srčane probleme nakon dugotrajnog plućnog oboljenja (plućno srce u uznapredovalom stadiju)
- osjetite jaku bol u gornjem dijelu trbuha koja se može širiti prema leđima, mučninu, povraćanje ili vrućicu jer to mogu biti simptomi povezani s upalom gušterače (pankreatitisom) i sustavom bilijarnog trakta;
- imate probleme s žučnim mjehurom;
- imate upalnu bolest crijeva;
- imate zatvor
- imate povećanu prostatu (hipertrofija prostate);
- imate oslabljenu funkciju adrenalne žlijezde. Vaša adrenalna žlijezda ne radi dobro što može uzrokovati simptome koji uključuju slabost, gubitak tjelesne mase, omaglica, osjećaj mučnine;
- ste ovisni ili ste nekada bili ovisni o uzimanju alkohola ili droga;
- ste imali simptome odvikavanja, kao što su uznemirenost, tjeskoba, drhtanje ili znojenje nakon prestanka konzumiranja alkohola ili droga.

Akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP) prijavljena je povezano s liječenjem lijekom MST Continus. Simptomi se obično javljaju tijekom prvih 10 dana liječenja. Obavijestite liječnika ako su se kod Vas ikada pojavili teški kožni osip ili ljuštenje kože, mjehurići na koži i/ili ranice u ustima nakon uzimanja lijeka MST Continus ili drugih opioida. Prestanite uzimati MST Continus i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma: pojava mjehurića, rašireno ljuštenje kože, gnojni prištići te prateća vrućica.

#### Poremećaji disanja povezani sa spavanjem

MST Continus može uzrokovati poremećaje disanja povezane sa spavanjem kao što su apneja u spavanju (prekidi disanja tijekom spavanja) i hipoksemija povezana sa spavanjem (niska razina kisika u krvi), ili pogoršati već postojeće probleme dok spavate. Simptomi mogu uključivati prekid disanja tijekom spavanja, buđenje noću zbog nedostatka zraka, teškoće s održavanjem neprekinutosti sna ili prekomjernu pospanost tijekom dana. Ako Vi ili netko drugi primijeti te simptome, obratite se liječniku. Liječnik može razmotriti smanjenje doze lijeka.

Ako trebate ići na bilo kakvu operaciju dok uzimate MST Continus, obavijestite liječnika, zubara ili medicinsku sestru da uzimate ove tablete.

U bolesnika koji dugotrajno uzimaju ovaj lijek može se razviti tolerancija i potreba za sve većim dozama za suzbijanje bolova. Dugotrajna primjena ovog lijeka može uzrokovati fizičku ovisnost, a nakon nagloga prekida liječenja moguć je razvoj sindroma ustezanja (može se očitovati pojavom sljedećih nuspojava: mučnina, povraćanje, proljev, tjeskoba, zimica, nevoljno drhtanje i znojenje).

Opioidi, poput morfina, mogu utjecati na hormonsku regulaciju i dovesti do hormonalnih promjena.

#### **Djeca**

Ovaj lijek se ne primjenjuje u ublažavanju boli nakon operacije kod djece. Za uputu o načinu primjene kod djece s boli uzrokovanom rakom, pogledajte dio 3. Nemojte davati djeci mlađoj od 1 godine starosti.

#### **Drugi lijekovi i MST Continus**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Istodobno uzimanje MST Continusa s nekim drugim lijekovima može smanjiti njegov terapijski učinak ili učinak istodobno primijenjenih lijekova.

Ove tablete ne smiju se koristiti istodobno i/ili unutar najmanje dva tjedna od uzimanja zadnje doze inhibitora monoaminooksidaze koji se koriste za liječenje teške depresije i Parkinsonove bolesti (vidjeti dio 2 „Nemojte uzimati”).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate:

- istodobna primjena lijeka MST Continus i sedativnih lijekova kao što su benzodiazepini ili srodni lijekovi povećava rizik od pospanosti, otežanog disanja (respiratorna depresija) i kome te može biti opasna po život. Zbog toga istodobnu primjenu treba razmotriti samo ako nisu moguće druge mogućnosti liječenja. Međutim, ako vam liječnik propiše kombinaciju lijeka MST Continus i sedativnih lijekova, on mora ograničiti doze i trajanje istodobne primjene. Obavijestite svojeg liječnika o svim sedativnim lijekovima koje uzimate i strogo se pridržavajte preporuka za doziranje koje vam je dao liječnik. Moglo bi biti korisno obavijestiti prijatelje ili rodbinu kako bi bili upoznati s prethodno navedenim znakovima i simptomima. Obratite se svojem liječniku ako primijetite takve simptome;
- lijekove protiv tjeskobe;
- lijekove za psihijatrijske ili mentalne poremećaje (kao što su fenotiazini);
- lijekove za liječenje depresije (antidepresive)
- lijekove za opuštanje mišića (mišićne relaksanse);
- lijekove za snižavanje povišenog krvnog tlaka;
- cimetidin (lijek za liječenje čira, loše probave ili žgaravice);
- određeni tip lijekova protiv mučnine ili povraćanja;
- lijekove koji sprečavaju nastanak ili olakšavaju simptome alergije (antihistaminici);
- rifampicin za liječenje tuberkuloze;
- djelovanje nekih lijekova koji se primjenjuju u terapiji za krvne ugruške (primjerice klopogrel, prasugrel ili tikagrelor) može se odgoditi ili smanjiti kada se uzimaju uz morfin
- ritonavir za liječenje AIDS-a;
- gabapentin ili pregabalin za liječenje epilepsije i boli uzrokovane oštećenjem živaca (neuropatska bol).

Također recite svom liječniku ako ste nedavno dobili anesteziju ili druge snažne analgetike (opioide).

### **MST Continus s hranom, pićem i alkoholom**

Konzumiranje alkohola za vrijeme uzimanja ovog lijeka može Vas učiniti pospanima ili povećati rizik od nastanka ozbiljnih nuspojava kao što je plitko disanje sa rizikom od prestanka disanja i gubitka svijesti. Istodobna uporaba alkohola i MST Continusa se mora izbjegavati.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne uzimajte MST Continus tijekom trudnoće ili dojenja jer može uzrokovati depresiju disanja u novorođenčeta.. Ako se tijekom trudnoće dulje vrijeme primjenjuje ovaj lijek, postoji rizik da će novorođenče imati simptome ustezanja (apstinencije) koje mora liječiti liječnik.

Primjena ovog lijeka tijekom dojenja se ne preporučuje jer se morfin izlučuje u majčino mlijeko.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ovaj lijek može prouzročiti brojne nuspojave poput pospanosti koja može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima (za potpuni popis nuspojava pogledajte poglavlje 4.). To je osobito izraženo na početku liječenja ili prilikom povećanja doze. Ako se to odnosi na Vas, ne smijete upravljati vozilima ni strojevima.

### **MST Continus sadrži laktozu i sunset yellow**

Tablete MST Continus 10 mg, MST Continus 30 mg i MST Continus 60 mg sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Tablete MST Continus 30 mg i MST Continus 60 mg sadrže boju sunset yellow FCF (E110) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

### **3. Kako uzimati MST Continus**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije početka liječenja i redovito tijekom liječenja liječnik će s Vama razgovarati o tome što možete očekivati od primjene lijeka MST Continus, kada i koliko dugo ga trebate uzimati, kada se trebate obratiti liječniku i kada trebate prekinuti primjenu (pogledajte također „Ako prestanete uzimati MST Continus“ u ovom dijelu).

Tablete progutajte cijele s čašom vode. **Nemojte ih lomiti, drobiti niti žvakati.**

**Tablete MST Continus napravljene su tako da djeluju preko 12 sati ako se progutaju cijele. Ako je tableta polomljena, zdrobljena ili sažvakana i/ili injicirana, moguća je brza apsorpcija ukupne 12-satne doze u Vaše tijelo. To može biti opasno i uzrokovati ozbiljne poteškoće poput predoziranja koje može biti smrtonosno.**

Tablete se uzimaju samo kroz usta. Gutanje zdrobljenih tableta ili injektiranje mogu uzrokovati ozbiljne nuspojave koje mogu biti smrtonosne.

Tablete morate uzimati svakih 12 sati. Na primjer, ako uzmete tabletu u 8 sati ujutro, iduću tabletu trebate uzeti u 20 sati uvečer.

#### *Odrasli*

Uobičajena je početna doza tableta od 30 mg svakih 12 sati. Međutim, doza će ovisiti o Vašim godinama, tjelesnoj težini i jačini boli. Po potrebi doza može biti povećana na 60 mg svakih 12 sati. Ako su potrebne još veće doze, doza se povećava postupno za 30 do 50%. Ako ste stariji bolesnik ili lakši od 70 kg, Vaš liječnik može predložiti manju početnu dozu. Vaš će liječnik odlučiti koliko tableta trebate uzimati.

#### *Djeca starija od jedne godine s jakom boli uzrokovanom rakom*

Djeca starija od jedne godine mogu uzimati tablete. Preporučena će doza ovisiti o njihovoj tjelesnoj težini i jačini boli. O tome treba raspraviti s liječnikom.

U djece s jakim bolovima izazvanim rakom preporučuje se 0,2 do 0,8 mg morfina na kg tjelesne težine svakih 12 sati. Doza se titrira kao u odraslih.

#### *Bol poslije operacije*

Ne preporučuje se uzimanje tableta MST Continus tijekom prva 24 sata poslije operacije, odnosno dok se ponovo ne uspostavi normalna crijevna funkcija.

Nakon toga preporučuje se doza od 20 mg svakih 12 sati za bolesnike tjelesne težine manje od 70 kg i doza od 30 mg svakih 12 sati za bolesnike tjelesne težine veće od 70 kg.

U starijih bolesnika liječenje se započinje manjim dozama.

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka za liječenje postoperativne boli u djece.

Ako još uvijek osjećate bol tijekom uzimanja ovih tableta raspravite o tome sa svojim liječnikom.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu od strane liječnika. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

#### **Ako uzmete više lijeka MST Continus nego što ste trebali**

U slučaju predoziranja odmah obavijestite liječnika ili najbližu bolnicu. Predoziranje može dovesti do: sužavanja zjenica oka, plitkog i usporenog disanja (depresija disanja), jake pospanosti koja se pogoršava sve do poremećaja svijesti, smanjenog tonusa tjelesne muskulature, usporenog rada srca i sniženog krvnog tlaka, poremećaja mozga (poznatog kao toksična leukoencefalopatija), pneumonije zbog udisanja sadržaja želuca nakon povraćanja ili stranog tijela, a simptomi mogu uključivati nedostatak zraka, kašalj i vrućicu. U težim slučajevima može dovesti do gubitaka svijesti (kome), zatajenja bubrega i smrti. Kada budete tražili medicinsku pomoć, budite sigurni da ste uzeli ovu uputu i sve preostale tablete kako biste ih mogli pokazati liječniku.

#### **Ako ste zaboravili uzeti MST Continus**

Ako se sjetite u roku od 4 sata nakon što ste propustili uzeti tabletu, uzmite ju odmah, a sljedeću tabletu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako kasnite više od 4 sata, upitajte liječnika za savjet. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

#### **Ako prestanete uzimati MST Continus**

Nemojte prekinuti liječenje ovim lijekom bez prethodnog dogovora sa svojim liječnikom. Ako želite prekinuti liječenje ovim lijekom, potražite savjet od svojeg liječnika o tome kako postupno smanjiti dozu kako biste izbjegli simptome apstinencije. Simptomi apstinencije mogu uključivati bolove u tijelu, nevoljno drhtanje (tremor), proljev, bol u trbuhu, mučninu, simptome nalik gripi, brze otkucaje srca i proširene zjenice. Psihički simptomi uključuju snažan osjećaj nezadovoljstva, tjeskobe i razdražljivost.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

**Ako se nešto od navedenoga pojavi, primjena ovog lijeka treba biti odmah prekinuta, a Vaš liječnik obaviješten:**

- Oticanje lica, usana, jezika i/ili grla što može prouzročiti teškoće pri disanju ili gutanju, stezanje u prsnoj koži, omaglica, mučnina ili nesvjestica ili omaglica prilikom ustajanja što može biti simptom ozbiljne reakcije preosjetljivosti (anafilaktička reakcija/anafilaktički šok), koja može biti i po život opasna (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).
- Osjećate se neuobičajeno ili izrazito pospano ili Vam disanje postane plitko i usporeno (respiratorna depresija) (manje često, mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba).
- Teška kožna reakcija s pojavom mjehurića, raširenim ljuštenjem kože, gnojnim prištićima te pratećom vrućicom. To može biti stanje koje se naziva akutna generalizirana egzantematozna pustuloza (AGEP).

Druge moguće nuspojave:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

- mučnina
- zatvor (ukoliko potraje obratite se liječniku)

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje do 1 na 10 osoba)

- povraćanje (ukoliko potraje obratite se liječniku)
- jaka pospanost (osobito je izražena kada prvi put počnete uzimati tablete ili kada Vam je doza povećana; ukoliko potraje obratite se liječniku)
- suha usta, bol u trbuhu, gubitak apetita
- glavobolja, smetenost, nesanica
- opća slabost organizma, omaglica
- osip, svrbež
- pojačano znojenje

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- preosjetljivost,
- promjene raspoloženja, osjećaj ogromne sreće, uznemirenost, halucinacije
- gubitak svijesti, napadaji, osjećaj bockanja u rukama i stopalima, pojačan tonus mišića, iznenadni nevoljni trzaji mišića
- oštećenje vida
- vrtoglavica
- osjećaj lupanja srca
- niski krvni tlak, crvenilo lica uz osjećaj vrućine
- otežano disanje uzorkovano tekućinom u plućima (edem pluća)
- loša probava, promjene okusa, zastoj rada crijeva (ileus)
- povišene vrijednosti jetrenih enzima (vidljivo u krvnim pretragama)
- urtikarija/koprivnjača
- otežano mokrenje
- otekline šaka, gležnjeva ili stopala (periferni edemi) malaksalost

Nepoznate nuspojave (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- ovisnost o lijeku, loše raspoloženje (disforija), poremećaji mišljenja
- apneja u spavanju (prekidi disanja tijekom spavanja)
- pojačana osjetljivost na bol (hiperalgezija)
- suženje zjenica (mioza)
- usporen rad srca
- smanjeno kašljanje
- probavne smetnje
- simptomi povezani s upalom gušterače (pankreatitisom) i sustavom bilijarnog trakta, npr. jaka bol u gornjem dijelu trbuha koja se može širiti prema leđima, mučnina, povraćanje ili vrućica
- grč mokraćovoda
- poteškoće s erekcijom, izostanak menstruacija, smanjen libido (smanjen seksualni nagon)
- simptomi apstinencije ili ovisnosti (za simptome vidjeti dio 3.: Ako prestanete uzimati lijek MST Continus)
- sindrom ustezanja u novorođenčadi

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#) Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati MST Continus**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što MST Continus sadrži**

Djelatna je tvar morfinsulfat.

Jedna tableta MST Continus 10 mg sadrži 10 mg morfinsulfata što odgovara 7,5 mg morfina.

Jedna tableta MST Continus 30 mg sadrži 30 mg morfinsulfata što odgovara 22,5 mg morfina.

Jedna tableta MST Continus 60 mg sadrži 60 mg morfinsulfata što odgovara 45 mg morfina.

Jedna tableta MST Continus 100 mg sadrži 100 mg morfinsulfata što odgovara 75 mg morfina.

Drugi sastojci:

Jezgra tablete:

laktoza, bezvodna (osim tableta od 100 mg), hidroksietilceluloza, cetostearilni alkohol, magnezijev stearat i talk.

Ovojnica tablete:

MST Continus 10 mg: polivinilni alkohol – djelomično hidroliziran, titanijev dioksid (E171), makrogol 3350, talk, željezov oksid žuti (E172), željezov oksid crveni (E172), željezov oksid crni (E172).

MST Continus 30 mg: hipromeloza (E464), makrogol 400, titanijev dioksid (E171), eritrozin (E127), indigo karmin (E132) i sunset yellow FCF (E110).

MST Continus 60 mg: hipromeloza (E464), makrogol 400, titanijev dioksid (E171), eritrozin (E127), kinolinsko žuto (E104) i sunset yellow FCF (E110).

MST Continus 100 mg: hipromeloza (E464), makrogol 400, titanijev dioksid (E171), željezov oksid žuti (E172), željezov oksid crni (E172) i indigo karmin (E132).

### **Kako MST Continus izgleda i sadržaj pakiranja**

Sve tablete su s produljenim oslobađanjem, promjera oko 7,25 mm, debljine oko 4,35 mm i nose oznaku jačine (npr. 10 mg, 30 mg itd.) na jednoj strani tablete. Tablete od 10 mg su zlatnosmeđe, od 30 mg tamnoljubičaste, od 60 mg narančaste te od 100 mg sive boje.

Tablete su pakirane u blistere koji sadrže po 10 tableta. Svaka kutija sadrži 3 do 6 blistera (30 do 60 tableta s produljenim oslobađanjem).

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja:**

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Wiedner Gürtel 13, Turm 24, OG 15, 1100 Beč, Austrija

#### **Proizvođači:**

Mundipharma DC B.V., Leusderend 16, 3832 RC Leusden, Nizozemska

#### **Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**

Medis Adria d.o.o., Buzinska cesta 58, 10 010 Zagreb – Buzin

Tel: 01 2303 446

#### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u studenom 2024.**