Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Meropenem Kalceks 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
Meropenem Kalceks 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju

meropenem

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Meropenem Kalceks i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Meropenem Kalceks
3. Kako primjenjivati Meropenem Kalceks
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Meropenem Kalceks
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Meropenem Kalceks i za što se koristi

Meropenem Kalceks sadrži djelatnu tvar koja se zove meropenem. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju karbapenemski antibiotici. Djeluje tako da ubija bakterije koje mogu uzrokovati ozbiljne infekcije.

Ovaj lijek koristi se za liječenje sljedećih infekcija u odraslih i djece u dobi od 3 mjeseca i starije:
- infekcije koje zahvaćaju pluća (pneumonije);
- infekcije pluća i bronha u bolesnika koji boluju od cistične fibroze;
- komplicirane infekcije mokraćnog sustava;
- komplicirane infekcije trbušne šupljine;
- infekcije koje se mogu pojaviti tijekom ili nakon porođaja;
- komplicirane infekcije kože i mekih tkiva;
- akutna bakterijska infekcija moždanih ovojnica (meningitis).

Ovaj lijek može se koristiti za liječenje bolesnika s niskim razinama bijelih krvnih stanica koji se nazivaju neutrofili, koji imaju vrućicu za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom.

Ovaj lijek može se koristiti u liječenju bakterijske infekcije krvi koja može biti povezana s gore navedenim tipom infekcije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Meropenem Kalceks

Nemojte primjenjivati Meropenem Kalceks
- ako ste alergični (preosjetljivi) na meropenem ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6);
- ako ste alergični (preosjetljivi) na druge antibiotike poput penicilina, cefalosporina ili karbapenema, budući da je tada moguće da ste alergični i na meropenem.

Upozorenja i mjere opreza

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

Obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite ovaj lijek ako:
- imate zdravstvene probleme, kao što su problemi s jetrom ili bubrezima;
- ste ikada imali teški proljev nakon primjene drugih antibiotika.

Možda ćete razviti pozitivan test (Coombsov test) koji ukazuje na prisutnost antitijela koja Vam mogu uništiti crvene krvne stanice. Vaš liječnik će o ovome razgovarati s Vama.

Možda ćete razviti znakove i simptome ozbiljnih kožnih reakcija (vidjeti dio 4). Ukoliko se to dogodi, odmah obavijestite liječnika ili medicinsku sestru kako bi mogli liječiti simptome.

Problemi s jetrom
Ako primijetite žutilo kože i očiju, svrbež kože, tamnu boju mokraće ili svijetlu boju stolice, obavijestite o tome svog liječnika. To može biti znak problema s jetrom koji Vaš liječnik treba provjeriti.

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od gore navedenoga na Vas, prije uzimanja ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri.

Drugi lijekovi i Meropenem Kalceks
Obavijestite svog liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo je važno jer Meropenem Kalceks može utjecati na način djelovanja drugih lijekova, a određeni lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Meropenem Kalceks.

Posebno napomenite svom liječniku ili medicinskoj sestri ako uzimate neki od sljedećih lijekova:
- probenecid (koristi se za liječenje gihta);
- valproatnu kiselinu/natrijev valproat/valpromid (koristi se za liječenje epilepsije). Meropenem se ne bi trebao primjenjivati, jer može smanjiti učinak natrijeva valproata;
- oralne antikoagulanse (lijekovi koji se uzimaju na usta za liječenje ili sprječavanje nastajanja krvnih ugrušaka).

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Preporučuje se izbjegavati primjenu meropenema tijekom trudnoće.Vaš liječnik će odlučiti trebate li ga uzimati.

Dojenje
Ako dojite ili namjeravate dojiti, važno je da o tome obavijestite svog liječnika prije početka primanja meropenema. Male količine ovoga lijeka mogu se izlučiti u majčino mlijeko i tako imati utjecaja na dojenče. Vaš liječnik će odlučiti o tome trebate li primjenjivati meropenem za vrijeme dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, glavobolja, trnci ili bockanje u koži (parestezija) povezani su s meropenemom. Bilo koja od ovih nuspojava može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Ovaj lijek može prouzročiti nevoljne pokrete mišića, što može uzrokovati da se tijelo brzo i nekontrolirano trese (konvulzije). To obično je popraćeno gubitkom svijesti. Nemojte upravljati vozilom ili raditi sa strojevima ukoliko osjetite ove nuspojave.

Meropenem Kalceks sadrži natrij
Meropenem Kalceks 500 mg: Ovaj lijek sadrži 45 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj bočici. To odgovara 2,25 % preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrija za odraslu osobu.

Meropenem Kalceks 1000 mg: Ovaj lijek sadrži 90 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj bočici. To odgovara 4,5 % preporučenog maksimalnog dnevnog unosa natrija za odraslu osobu.

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

3. Kako primjenjivati Meropenem Kalceks

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Primjena u odraslih
- Doza lijeka ovisi o vrsti infekcije koju imate, području tijela koje je zahvaćeno infekcijom te o ozbiljnosti infekcije. Vaš liječnik će odlučiti koju dozu trebate.
- Uobičajena doza za odrasle iznosi od 500 mg (miligrama) do 2 g (grama) ovisno o vrsti infekcije koju imate. Dozu ćete obično primati svakih 8 sati. Međutim, možete primiti dozu i rjeđe u slučaju da Vam bubrezi ne rade dobro (ovisno o ozbiljnosti oštećenja funkcije bubrega, primjenjivat će se doza svakih 12 sati ili svaka 24 sata).

Primjena kod djece i adolescenata
- Doza za djecu od 3 mjeseca do 12 godina starosti određuje se prema dobi i tjelesnoj težini djeteta. Uobičajena doza je između 10 mg i 40 mg meropenema po svakom kilogramu (kg) tjelesne težine djeteta. Doza se obično daje svakih 8 sati. Djeca teža od 50 kg dobit će dozu jednaku onoj za odrasle.

Kako primjenjivati Meropenem Kalceks
- Ovaj lijek dat će Vam se u veliku venu u obliku injekcije ili infuzije.
- Vaš liječnik ili medicinska sestra dat će Vam ovaj lijek.
- Međutim, neki bolesnici, obitelj ili staratelji mogu biti obučeni za primjenu ovog lijeka kod kuće. Uputa za doziranje nalazi se u ovoj uputi (u dijelu pod nazivom „Upute za davanje lijeka Meropenem Kalceks sebi ili nekom drugom kod kuće“).
- Vaša injekcija se ne smije miješati ili dodavati u otopine koje sadrže druge lijekove.
- Primjena injekcije može trajati oko 5 minuta ili između 15 do 30 minuta. Vaš liječnik ili medicinska sestra će Vam objasniti kako primijeniti ovaj lijek.
- Injekcije biste trebali primiti svakoga dana u isto vrijeme.

Ako primijenite više lijeka Meropenem Kalceks nego što ste trebali
Ako ste slučajno primili više lijeka nego što Vam je propisano, odmah obavijestite svog liječnika ili se javite u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili primijeniti Meropenem Kalceks
Ako ste propustili injekciju, trebali biste je primiti što je prije moguće. Međutim, ukoliko se bliži vrijeme za sljedeću injekciju, preskočite injekciju koju niste primili. Nemojte uzeti dvostruku dozu (dvije injekcije u isto vrijeme) kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati primjenjivati Meropenem Kalceks
Nemojte prestati koristiti ovaj lijek sve dok Vam to ne kaže Vaš liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Teške alergijske reakcije (manje često)
Ukoliko Vam se pojave simptomi teške alergijske reakcije **odmah prekinite s primjenom ovog lijeka i zatražite medicinsku pomoć**. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć. Simptomi alergijske reakcije mogu uključiti iznenadnu pojavu:
- Teškog osipa, svrbeža ili koprivnjače na koži

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

- Oticanje lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela
- Kratkoće daha, piskanja ili problema s disanjem

Ozbiljne kožne reakcije koje uključuju:
- Ozbiljna reakcija preosjetljivosti uključujući vrućicu, kožni osip i promjene u nalazima krvnih pretraga kojima se provjerava funkcija jetre (povećane razine jetrenih enzima) i povećanje jedne vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) i povećani limfni čvorovi. Ovo mogu biti znakovi sistemskog poremećaja osjetljivosti poznatog kao DRESS sindrom (učestalost nepoznata).
- Kožni poremećaj (koji se zove „akutna generalizirana egzantematozna pustuloza“) popraćen vrućicom, koji se manifestira pojavom brojnih malih mjehurića ispunjenih tekućinom koji se nalaze na velikoj površini otečene i crvene kože (učestalost nepoznata).
- Ozbiljan crveni ljuskavi osip, izbočenja na koži koja sadrže gnoj, žuljeve ili ljuštenje kože koji može biti povezana s visokom temperaturom i bolovima u zglobovima (manje često).
- Ozbiljni osipi na koži koji se često mogu pojaviti na trupu u obliku crvenkastih kružnih mrlja sa središnjim žuljevima, ljuštenje kože, čirevi u ustima, grlu, nosu, genitalijama i očima, a mogu im prethoditi vrućica i simptomi nalik gripi (Stevens-Johnsonov sindrom) ili teži oblik (toksična epidermalna nekroliza) (manje često).

Oštećenje crvenih krvnih stanica (manje često). Znakovi uključuju:
- Neočekivani gubitak daha
- Urin crvene ili smeđe boje

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, **odmah potražite medicinsku pomoć**.

Druge moguće nuspojave:

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)
- Bol u trbuhu
- Mučnina
- Povraćanje
- Proljev
- Glavobolja
- Osip na koži, svrbež kože
- Bol i upala
- Povećan broj trombocita u krvi (vidljivo u krvnim nalazima)
- Promjene u nalazima krvi, uključujući i testove koji ukazuju koliko dobro Vaša jetra radi

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
- Promjene u nalazima krvi, uključujući i testove koji ukazuju koliko dobro Vaši bubrezi rade
- Trnci i bockanje
- Gljivične infekcije usne šupljine ili rodnice (kandidijaza)
- Upala crijeva s proljevom
- Bolne vene na mjestu primjene injekcije ovog lijeka
- Promjene u nalazima krvi. Ove promjene uključuju smanjen broj trombocita (što može uzrokovati pojavu modrica), povećan broj pojedinih bijelih krvnih stanica i smanjen broj drugih vrsta bijelih krvnih stanica, te povećana količina tvari koja se naziva „bilirubin“. Vaš liječnik može zatražiti da se povremeno podvrgnete pretragama krvi.
- Ostale promjene u nalazima krvi. Simptomi uključuju učestale infekcije, visoku temperaturu i grlobolju. Vaš liječnik može zatražiti da se povremeno podvrgnete pretragama krvi.
- Snižene razine kalija u krvi (što može uzrokovati slabost, grčeve u mišićima, trnce i poremećaje srčanog ritma)
- Problemi s jetrom: žutilo kože i očiju, svrbež kože, tamna boja mokraće ili svijetla boja stolice. Ako primijetite ove znakove ili simptome, odmah posjetite liječnika.

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)
- Delirij
- Napadaji (konvulzije)

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Meropenem Kalceks

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Injekcija
Rekonstituiranu otopinu za intravensku injekciju nužno je primijeniti odmah. Vremenski interval između početka rekonstituiranja i kraja intravenskog injektiranja ne smije premašiti jedan sat.

Infuzija
Rekonstituiranu otopinu nužno je razrijediti odmah nakon rekonstitucije. Vremenski interval između početka rekonstituiranja i kraja intravenske infuzije ne smije premašiti jedan sat.

Ne zamrzavati rekonstituiranu otopinu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i etiketi bočice iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Meropenem Kalceks sadrži
- Djelatna tvar je meropenem.

Meropenem Kalceks 500 mg
Jedna bočica sadrži meropenem trihidrat što odgovara 500 mg meropenema.

Meropenem Kalceks 1000 mg
Jedna bočica sadrži meropenem trihidrat što odgovara 1000 mg meropenema.

- Drugi sastojak je natrijev karbonat.

Kako Meropenem Kalceks izgleda i sadržaj pakiranja
Meropenem je bijeli do svijetlo žuti prašak u staklenim bočicama. Bočice su pakirane u kutiji.

Veličine pakiranja: 1 ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
AS KALCEKS
Krustpils iela 71E, Rīga, LV-1057, Latvija
Tel.: +371 67083320
E-mail: kalceks@kalceks.lv

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

Proizvođač
ACS Dobfar S.p.A.
Nucleo Industriale S. Atto (loc. San Nicolò a Tordino)
64100 Teramo (TE), Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Pharmacol d.o.o.
Šestinski dol 62, 10000 Zagreb, Hrvatska
e-mail: regulatory_ph@pharmacol.hr
Tel.: +385 1 4852 947

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Danska	Meropenem Kalceks
Austrija	Meropenem Kalceks 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung Meropenem Kalceks 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
Belgija	Meropenem Kalceks 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie / poudre pour solution injectable/pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung Meropenem Kalceks 1 g poeder voor oplossing voor injectie/infusie / poudre pour solution injectable/pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
Finska	Meropenem Kalceks 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten Meropenem Kalceks 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten
Francuska	MEROPENEM KALCEKS 500 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion MEROPENEM KALCEKS 1 g poudre pour solution injectable/pour perfusion
Holandsko	Meropenem Kalceks 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie Meropenem Kalceks 1 g poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Hrvatska	Meropenem Kalceks 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Meropenem Kalceks 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju
Irska	Meropenem 500 mg powder for solution for injection/infusion Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion
Italija	Meropenem Kalceks
Latvija	Meropenem Kalceks 500 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai Meropenem Kalceks 1 g pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai
Litva	Meropenem Kalceks 500 mg milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui Meropenem Kalceks 1 g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui
Mađarska	Meropenem Kalceks 500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Meropenem Kalceks 1 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
Njemačka	Meropenem Kalceks 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung Meropenem Kalceks 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
Norveška	Meropenem Kalceks
Rumunska	Meropenem Kalceks 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă Meropenem Kalceks 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă
Slovačka	Meropenem Kalceks 500 mg prášok na injekčný/infúzny roztok Meropenem Kalceks 1 g prášok na injekčný/infúzny roztok
Slovenija	Meropenem Kalceks 500 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Meropenem Kalceks 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Španjolska	Meropenem Kalceks 500 mg polvo para solución inyectable y para perfusion EFG Meropenem Kalceks 1 g polvo para solución inyectable y para perfusion EFG
Švedska	Meropenem Kalceks

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2025.

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

Savjet/medicinske upute

Antibiotici se koriste za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama. Nemaju učinak u liječenju infekcija uzrokovanih virusima.

Ponekad infekcije uzrokovane bakterijama ne reagiraju na liječenje antibioticima. Jedan od najčešćih razloga zbog čega se ovo događa je što su bakterije koje uzrokuju infekciju otporne na antibiotik koji se uzima. To znači da one mogu preživjeti i čak se umnožavati unatoč antibiotiku.

Bakterije mogu postati otporne na antibiotike iz različitih razloga. Pažljiva primjena antibiotika može smanjiti izglede da bakterije postanu otporne na njih.

Kada Vam liječnik propiše antibiotike, oni su namijenjeni samo liječenju Vaše trenutne bolesti.

Sljedeći savjeti će pomoći u sprječavanju nastanka otpornih bakterija koje bi mogle spriječiti djelovanje antibiotika.

- Važno je da antibiotike uzimate u propisanoj dozi, u određeno vrijeme i određeni broj dana. Pročitajte upute o lijeku i ako nešto ne razumijete, upitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika da Vam objasni.
- Ne smijete uzimati antibiotike ukoliko nisu propisani isključivo Vama i trebali biste ih koristiti samo za liječenje infekcije za koju su Vam propisani.
- Ne smijete uzimati antibiotike propisane drugima, čak i ako oni imaju infekciju koja je slična Vašoj.
- Ne smijete davati drugima antibiotike koji su propisani Vama.
- Ako Vam je preostalo antibiotika nakon završetka liječenja propisanog od strane Vašeg liječnika, odnesite preostali dio u ljekarnu kako bi se propisno uklonio.

Upute za davanje lijeka Meropenem Kalceks sebi ili nekom drugom kod kuće

Neki bolesnici, obitelj i staratelji mogu biti obučeni za davanje lijeka Meropenem Kalceks kod kuće.

Upozorenje – Ovaj lijek možete dati sebi ili nekom drugom kod kuće tek nakon što su Vas liječnik ili medicinska sestra obučili.

Injekcija

Meropenem za primjenu intravenskom bolus injekcijom, potrebno je rekonstituirati sa sterilnom „vodom za injekcije“ do konačne koncentracije od 50 mg/ml.

Vrijeme rekonstitucije nije duže od 2 minute.

Infuzija

Za intravensku infuziju, bočice koje sadrže meropenem mogu se rekonstituirati izravno s otopinom natrijevog klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infuziju ili otopinom glukoze 50 mg/ml (5 %) za infuziju i razrijediti s istom otopinom do konačne koncentracije od 1 do 20 mg/ml.

Kako se priprema lijek za primjenu

- Jedna bočica je namijenjena samo za jednokratnu uporabu.
- Lijek se ne smije miješati s drugim tekućinama (otapalima), osim onima navedenim iznad. Vaš liječnik će vam objasniti koliko otapala koristiti.
- Koristite lijek odmah nakon pripreme. Nemojte ga zamrzavati.
- Operite ruke te ih dobro osušite. Očistite radni prostor.
- Uzmite bočicu lijeka Meropenem Kalceks iz pakiranja. Provjerite bočicu i rok valjanosti. Provjerite je li bočica netaknuta te da nema oštećenja.
- Uklonite obojenu kapicu i rupčićem natopljenim alkoholom očistite čep. Pustite da se čep osuši.
- Stavite novu sterilnu iglu na novu sterilnu štrcaljku, bez dodirivanja završetaka.
- Uvucite preporučenu količinu sterilne „vode za injekcije“ u štrcaljku. Količina tekućine (otapala) koja Vam je potrebna prikazana je niže u tablici:

Doza lijeka Meropenem Kalceks	Količina “vode za injekcije” potrebne za razrjeđivanje
500 mg (miligrama)	10 ml (mililitara)

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO

1 g (gram)	20 ml
1,5 g	30 ml
2 g	40 ml

Imajte na umu: Ako Vam je propisana doza ovog lijeka veća od 1 g, trebat će Vam više od jedne bočice lijeka Meropenem Kalceks. Tada možete uvući tekućinu (otapalo) iz bočica u jednu štrcaljku.

- Probušite iglom štrcaljke kroz središte gumenog čepa i ubrizgajte propisanu količinu „vode za injekcije“ u bočicu ili bočice lijeka Meropenem Kalceks.
- Izvucite iglu iz bočice i bočicu dobro protresite, dok se sav prašak ne otopi (obično ne traje dulje od 2 minute). Još jednom prebrišite alkoholom gumeni čep i pustite da se gumeni čep osuši.
- Klip štrcaljke gurnite do kraja u štrcaljku, gurnite iglu kroz gumeni čep. Morate držati i štrcaljku i bočicu, i okreniti bočicu naopako.
- Držeći kraj igle u otopini, povucite klip natrag i uvucite svu tekućinu iz bočice u štrcaljku.
- Izvucite iglu štrcaljke iz bočice i bacite praznu bočicu na sigurno mjesto.
- Štrcaljku držite uspravno s iglom okrenutom prema gore. Kucnite po štrcaljki tako da se svi mjehurići u tekućini dignu prema vrhu štrcaljke.
- Uklonite sav zrak iz štrcaljke laganim guranjem klipa dok sav zrak ne nestane.
- Ako koristite ovaj lijek kod kuće, uklonite korištene igle i pribor za infuziju koji ste koristili na propisani način. Ukoliko Vaš liječnik odluči da prestanete s liječenjem, uklonite neupotrijebljeni Meropenem Kalceks na propisani način.
- Prije primjene, vizualno pregledajte otopinu. Samo bistra, bezbojna do žuta otopina, bez čestica smije se primijeniti.

<u>Davanje injekcije</u>
Ovaj lijek možete davati kroz kratku kanilu ili venflon (intravenska kanila), ili kroz port ili centralni venski kateter.

Davanje lijeka Meropenem Kalceks kroz kratku kanilu ili venflon
- Uklonite iglu sa štrcaljke i pažljivo je odložite u posudu za odlaganje oštrog otpada.
- Obrišite kraj kratke kanile ili venskog katetera alkoholom i pustite da se osuši. Skinite kapicu s Vaše kanile i na nju spojite štrcaljku.
- Lagano gurajte klip štrcaljke dajući antibiotik ujednačeno kroz 5 minuta.
- Kada ste završili s davanjem antibiotika i ispraznili štrcaljku, uklonite štrcaljku i isperite po preporuci liječnika ili medicinske sestre.
- Zatvorite kapicom kanilu i pažljivo odložite štrcaljku u posudu za odlaganje oštrog otpada.

Davanje lijeka Meropenem Kalceks kroz port ili centralni venski kateter
- Uklonite kapicu s porta ili centralnog venskog katetera, očistite završetak alkoholom i pustite da se osuši.
- Spojite štrcaljku i lagano gurajte klip štrcaljke dajući antibiotik ujednačeno kroz 5 minuta.
- Kada ste završili s davanjem antibiotika, uklonite štrcaljku i isperite po preporuci liječnika ili medicinske sestre.
- Stavite novu čistu kapicu na vaš centralni venski kateter i pažljivo odložite štrcaljku u posudu za odlaganje oštrog otpada.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

HALMED
27 - 11 - 2025
ODOBRENO