

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Meropenem Steriscience 500 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju Meropenem Steriscience 1000 mg prašak za otopinu za injekciju/infuziju

meropenem

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Meropenem Steriscience i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Meropenem Steriscience
3. Kako primjenjivati Meropenem Steriscience
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Meropenem Steriscience
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Meropenem Steriscience i za što se koristi

Meropenem Steriscience sadrži djelatnu tvar meropenem i pripada skupini lijekova koji se nazivaju karbapenemski antibiotici. Ovaj lijek djeluje tako da uništava bakterije koje mogu uzrokovati ozbiljne infekcije.

Meropenem Steriscience se primjenjuje za liječenje sljedećih infekcija u odraslih i djece u dobi od 3 mjeseca i starijih:

- Infekcije koje zahvaćaju pluća (upala pluća),
- Infekcije pluća i bronha u bolesnika sa cističnom fibrozom,
- Komplikirane infekcije mokraćnog sustava,
- Komplikirane infekcije trbušne šupljine,
- Infekcije koje se mogu pojaviti tijekom i nakon porođaja,
- Komplikirane infekcije kože i mekih tkiva.
- Akutna bakterijska infekcija moždanih ovojnica (meningitis).

Meropenem Steriscience može se koristiti u liječenju neutropeničnih bolesnika s vrućicom za koju se sumnja da je posljedica bakterijske infekcije.

Meropenem Steriscience se može koristiti u liječenju bakterijske infekcije krvi koja može biti povezana s gore navedenim tipom infekcije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Meropenem Steriscience

Nemojte primjenjivati Meropenem Steriscience:

- ako ste alergični na meropenem ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- ako ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji drugi antibiotik poput penicilina, cefalosporina ili karbapenema jer je moguće da ste alergični i na meropenem.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Meropenem Steriscience:

- ako imate zdravstvenih tegoba, kao što su problemi s jetrom ili bubrežima
- ako ste imali teški proljev nakon primjene drugih antibiotika.

Može Vam se pojaviti pozitivan test (Coombsov test), koji ukazuje na prisutnost antitijela koja mogu uništiti crvene krvne stanice. Vaš liječnik će o tome razgovarati s Vama.

Možda ćete razviti znakove i simptome teških kožnih reakcija (pogledajte dio 4). Ako dođe do toga, odmah se obratite liječniku ili medicinskoj sestri kako bi mogli liječiti simptome.

Ako niste sigurni odnosi li se bilo što od gore navedenoga na Vas, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri prije primjene lijeka Meropenem Steriscience.

Djeca

Meropenem Steriscience se ne preporučuje za primjenu kod djece mlađe od 3 mjeseca jer sigurnost i učinkovitost meropenema u djece mlađe od 3 mjeseca nisu utvrđeni.

Drugi lijekovi i Meropenem Steriscience

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ovo je važno jer Meropenem Steriscience može utjecati na način djelovanja drugih lijekova, a isto tako određeni lijekovi mogu utjecati na djelovanje lijeka Meropenem Steriscience.

Posebno napomenite svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- Probenecid (koristi se za liječenje gihta).
- Valproatnu kiselinu/natrijev valproat/valpromid (koriste se za liječenje epilepsije). Meropenem Steriscience se ne smije primjenjivati jer može smanjiti učinak natrijevog valproata.
- Oralne antikoagulanse (koriste se u liječenju ili prevenciji krvnih ugrušaka).

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Poželjno je izbjegavati primjenu meropenema za vrijeme trudnoće. Vaš će liječnik odlučiti o tome trebate li primati meropenem.

Dojenje

Ako dojite ili namjeravate dojeti, važno je da o tome obavijestite svog liječnika prije početka primanja meropenema. Male količine ovog lijeka mogu se izlučiti u majčino mlijeko. Stoga će Vaš liječnik odlučiti o tome trebate li primjenjivati meropenem za vrijeme dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učinku lijeka na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Uzimanje lijeka Meropenem Steriscience povezano je s glavoboljom i trncima ili bockanjem kože (parestezije). Bilo koja od navedenih nuspojava može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Meropenem Steriscience može uzrokovati nevoljne pokrete mišića, što dovodi do toga da se tijelo trese brzo i nekontrolirano (konvulzije). Obično je popraćeno i gubitkom svijesti. Nemojte upravljati vozilima i strojevima ako osjetite ovu nuspojavu.

Meropenem Steriscience sadrži natrij

Meropenem Steriscience 500 mg: Ovaj lijek sadrži 45 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj dozi od 500 mg. To odgovara 2,25% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

Meropenem Steriscience 1000 mg: Ovaj lijek sadrži 90 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj dozi od 1000 mg. To odgovara 4,5% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

3. Kako primjenjivati Meropenem Steriscience

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik, ljekarnik ili medicinska sestra. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Primjena u odraslih

- Doza lijeka koju ćete dobiti ovisi o vrsti infekcije koju imate, području tijela koje je zahvaćeno te o ozbiljnosti infekcije. Vaš liječnik će odrediti kolika Vam je doza lijeka potrebna.
- Uobičajena doza za odrasle iznosi od 500 mg (miligrama) do 2000 mg (miligrama). Doza se obično prima svakih 8 sati. Međutim, dozu možete primiti i rjeđe u slučaju da Vaši bubrezi ne rade dobro.

Primjena u djece i adolescenata

- Doza za djecu od 3 mjeseca do 12 godina starosti se određuje prema dobi i tjelesnoj težini djeteta. Uobičajena doza je od 10 do 40 mg lijeka Meropenem Steriscience po svakom kilogramu tjelesne težine djeteta. Doza se obično daje svakih 8 sati. Djeca teža od 50 kg će dobiti dozu jednaku onoj kod odraslih.

Kako primjenjivati Meropenem Steriscience

- Meropenem Steriscience će Vam se dati u veliku venu u obliku injekcije ili infuzije.
- Meropenem Steriscience će Vam dati liječnik ili medicinska sestra.
- Ipak, neki bolesnici, roditelji i staratelji su obučeni za davanje lijeka Meropenem Steriscience kod kuće. Naputak za to nalazi se u ovoj uputi (u dijelu "Upute za davanje lijeka Meropenem Steriscience sebi ili nekom drugom kod kuće"). Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.
- Vaša injekcija se ne smije miješati ili dodavati u otopine koje sadrže druge lijekove.
- Primjena injekcije može trajati oko 5 minuta ili između 15 do 30 minuta. Vaš liječnik će vam reći kako dati Meropenem Steriscience.
- Vaše injekcije biste trebali primiti svakoga dana u isto vrijeme.

Ako primijenite više lijeka Meropenem Steriscience nego što ste trebali

Ako ste slučajno primili više lijeka nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom liječniku ili u najbližu bolnicu.

Ako ste zaboravili primijeniti Meropenem Steriscience

Ako ste propustili injekciju, trebali biste ju primiti što je prije moguće. Međutim, ukoliko se bliži vrijeme za sljedeću injekciju, preskočite propuštenu injekciju. Nemojte primijeniti dvostruku dozu (dvije injekcije istovremeno) kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Meropenem Steriscience

Nemojte prestati primjenjivati Meropenem Steriscience sve dok Vam to ne kaže liječnik.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Teške alergijske reakcije

Ako razvijete bilo koji od ovih znakova i simptoma, **odmah se obratite svom liječniku ili medicinskoj sestri**. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć. Znakovi i simptomi mogu uključiti iznenadnu pojavu:

- Teškog osipa, svrbeža ili koprivnjače na koži.
- Oticanja lica, usana, jezika ili drugih dijelova tijela.
- Nedostatka zraka, piskanja ili problema s disanjem.
- Ozbiljnih kožnih reakcija koje uključuju
 - Ozbiljne reakcije preosjetljivosti koje uključuju vrućicu, osip, promjene u krvnim nalazima kojima se ispituje rad jetre (povišenje jetrenih enzima) te povišenje bijelih krvnih zrnaca (eozinofilija) i povećanje limfnih čvorova. Ovo mogu biti znakovi poremećaja preosjetljivosti više organa poznatog pod nazivom sindrom DRESS.
 - Jaki crveni ljuskavi osip, kvržice na koži koje sadrže gnoj, mjehuriće ili kožu koja se ljušti, što može biti povezano s visokom temperaturom i bolovima u zglobovima.
 - Teški kožni osipi koji mogu biti kružnog oblika, često s mjehurima u sredini, ljuštenje kože, čirevi u ustima, grlu, nosu genitalijama i očima, a može im prethoditi vrućica i simptomi slični gripi (Stevens-Johnsonov sindrom) ili teži oblik (toksična epidermalna nekroliza).

Oštećenje crvenih krvnih stanica (nepoznata učestalost)

Znakovi uključuju:

- Neočekivani gubitak daha.
- Urin crvene ili smeđe boje.

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, **odmah se obratite svom liječniku**.

Druge moguće nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- Bol u trbuhu,
- Mučnina,
- Povraćanje,
- Proljev,
- Glavobolja,
- Osip na koži, svrbež,
- Bol i upala,
- Povećani broj trombocita (krvnih pločica) u krvi (vidljivo u krvnim nalazima),
- Promjene u nalazima krvi, uključujući i testove koji ukazuju na rad Vaše jetre.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- Promjene u nalazima krvi. To uključuje smanjenje broja trombocita (što može uzrokovati pojavu modrica), povećan broj pojedinih bijelih krvnih stanica, smanjen broj drugih bijelih krvnih stanica i povećanje količine tvari koja se zove 'bilirubin'. Vaš liječnik može zatražiti da se povremeno podvrgnete pretragama krvi.
- Promjene u nalazima krvi, uključujući i testove koji ukazuju na rad Vaših bubrega,
- Trnci i bockanje,
- Gljivične infekcije usne šupljine i rodnice kandidom,
- Upala crijeva s proljevom,
- Bolne vene na mjestu primjene injekcije Meropenema Steriscience,
- Ostale promjene u krvi. Simptomi uključuju učestale infekcije, visoku temperaturu i grlobolju. Vaš liječnik može zatražiti da se povremeno podvrgnete pretragama krvi.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- Napadaji (konvulzije),
- Akutna dezorijentiranosti i zbunjenost (delirij).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Meropenem Steriscience

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici bočice. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Injekcija

Nakon rekonstitucije:

Rekonstituirana otopina za intravensku injekciju mora se odmah upotrijebiti.

Kemijska i fizikalna stabilnost pripremljene otopine za intravensku primjenu dokazana je za:

- 3 sata kada se čuva na 25 °C;
- 12 sati kada se čuva u hladnim uvjetima (2-8 °C).

Infuzija

Nakon rekonstitucije:

Rekonstituirana otopina za intravensku infuziju mora se odmah upotrijebiti.

Kada se lijek Meropenem Steriscience otapa u 0,9%-tnom natrijevom kloridu (9 mg/ml), njegova kemijska i fizikalna stabilnost za pripremljenu otopinu za infuziju dokazana je za:

- 3 sata kada se čuva na 25 °C;
- 6 sata kada se čuva u hladnim uvjetima (2-8 °C).

Kada se lijek Meropenem Steriscience otapa u 5%-tnoj otopini glukoze (dekstroza) (50 mg/ml), otopinu treba odmah upotrijebiti.

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah upotrijebiti ako pri rekonstituciji nije primijenjena metoda koja isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije. Ako se pripremljeni lijek ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja u primjeni odgovornost su korisnika.

Ne zamrzavati rekonstituiranu otopinu.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Meropenem Steriscience sadrži

Djelatna tvar je meropenem.

Svaka bočica sadrži meropenem trihidrat što odgovara 500 mg ili 1000 mg meropenema.

Drugi sastojak je natrijev karbonat.

Kako Meropenem Steriscience izgleda i sadržaj pakiranja

Meropenem Steriscience je bijeli do blijedožuti prašak za otopinu za injekciju/infuziju u bočici.

- **Meropenem Steriscience 500 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju**

Prozirna staklena bočica s čepom od bromobutilne gume s aluminijskim zatvaračem i „flip off“ kapicom nebesko plave boje.

- **Meropenem Steriscience 1000 mg prašak za otopinu za injekciju ili infuziju**

Prozirna staklena bočica s čepom od bromobutilne gume s aluminijskim zatvaračem i „flip off“ kapicom crvene boje.

Lijek se isporučuje u pakiranjima od 1 ili 10 bočica. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Steriscience B.V.
Kranenburgweg 135-A
2583 ER The Hague
Nizozemska

Proizvođač:

Pharma Pack Hungary Kft.
H-2040, Budaörs, Vasút út 13
Mađarska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Marti Farm d.o.o.
Laščinska cesta 40
10 000 Zagreb
tel: +38515588297

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija	Meropenem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung Meropenem 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung
Belgija	Meropenem Steriscience 500 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie Meropenem Steriscience 1000 mg poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Bugarska	Меропенем 500 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Меропенем 1000 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор
Cipar	Meropenem Steriscience, 500 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Εγχυση Meropenem Steriscience, 1000 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Εγχυση
Češka	Meropenem Steriscience
Danska	Meropenem Steriscience
Estonija	Meropenem Steriscience
Finska	Meropenem Steriscience 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten Meropenem Steriscience 1000 mg injektio-/infuusiokuiva-aine liuosta varten
Francuska	Meropenem Steriscience 500 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion Meropenem Steriscience 1000 mg poudre pour solution injectable/pour perfusion
Grčka	Meropenem 500 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Εγχυση Meropenem 1000 mg Κόνις για Ενέσιμο Διάλυμα/Εγχυση
Mađarska	Meropenem Steriscience, 500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz Meropenem Steriscience, 500 mg por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz
Irska	Meropenem 500 mg powder for solution for injection/infusion Meropenem 1000 mg powder for solution for injection/infusion

Italija	Meropenem Steriscience
Latvija	Meropenem 500 mg miltelīai injekcijām / infūzijām tirpalui Meropenem 1000 mg miltelīai injekcijām / infūzijām tirpalui
Litva	Meropenem Steriscience, 500 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai Meropenem Steriscience, 1000 mg pulveris injekciju/infūziju šķīduma pagatavošanai
Luksemburg	Meropenem 500 mg Pulver fir Léisung fir Injektioun / Infusioun Meropenem 1000 mg Pulver fir Léisung fir Injektioun / Infusioun
Malta	Meropenem 500 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni Meropenem 1000 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni
Nizozemska	Meropenem Steriscience 500mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Steriscience 1000 mg, poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Poljska	Meropenem Steriscience
Portugal	Meropenem 500 mg pó para solução injetável/perfusão Meropenem 1000 mg pó para solução injetável/perfusão
Rumunjska	Meropenem Steriscience 500 mg pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă Meropenem Steriscience 1000 mg pulbere pentru soluție injectabilă/ perfuzabilă
Slovačka	Meropenem Steriscience 500 mg prášok na injekčný/ infúzny roztok Meropenem Steriscience 1000 mg prášok na injekčný/ infúzny roztok
Slovenija	Meropenem Steriscience 500 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje Meropenem Steriscience 1000 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Španjolska	Meropenem Steriscience 500 mg polvo para solución inyectable y para perfusión Meropenem Steriscience 1000 mg polvo para solución inyectable y para perfusión
Švedska	Meropenem Steriscience, 500 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning Meropenem Steriscience, 1000 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
Island	Meropenem 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn Meropenem 1000 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
Norveška	Meropenem Steriscience

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2025.

Savjet/medicinske upute

Antibiotici se koriste za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama. Nemaju učinak u liječenju infekcija uzrokovanih virusima.

Ponekad infekcije uzrokovane bakterijama ne odgovaraju na primijenjeni antibiotik. Najčešći je razlog tome rezistencija tih bakterija na upotrijebljeni antibiotik. To znači da one mogu preživjeti i čak se umnožavati unatoč primjeni antibiotika.

Bakterija može postati rezistentna (otporna) na antibiotik iz više razloga. Pažljiva upotreba antibiotika može pomoći u smanjenju mogućnosti rezistencije.

Kada Vam liječnik propiše kuru antibiotika, namjera je liječenje samo trenutne bolesti. Sljedeći savjeti će Vam pomoći u sprječavanju nastanka bakterijske rezistencije koja može onemogućiti djelovanje antibiotika. Važno je da antibiotike uzimate u propisanoj dozi, u određeno vrijeme i određeni broj dana. Čitajte upute o lijeku i ako nešto ne razumijete pitajte svog liječnika ili ljekarnika da Vam objasni.

1. Ne smijete uzimati antibiotike ako nisu propisani upravo Vama i trebate ih koristiti samo za liječenje infekcije za koju su Vam propisani.
2. Ne smijete uzimati antibiotike propisane drugima čak i ako su oni imali infekciju sličnu Vašoj.
3. Ne smijete davati drugima antibiotike koji su propisani Vama.
4. Ako Vam je preostalo antibiotika nakon što ste završili kuru propisanu od Vašeg liječnika, odnesite preostali dio u ljekarnu kako bi bio propisno zbrinut.

Sljedeće informacije namijenjene su samo zdravstvenim radnicima:

Potpune informacije o doziranju, upozorenjima i mjerama opreza, uputama za rekonstituciju lijeka prije primjene itd. molimo pogledati Sažetak opisa svojstava lijeka.

Upute za davanje lijeka Meropenem Steriscience sebi ili nekom drugom kod kuće

Neki bolesnici, roditelji i staratelji su obučeni za davanje lijeka Meropenem Steriscience kod kuće.

Upozorenje: Ovaj lijek možete dati sebi ili nekom drugom kod kuće tek nakon što Vam liječnik ili medicinska sestra pokažu kako.

Kako se priprema lijek za primjenu

- Ovaj se lijek mora miješati s drugom tekućinom (otapalom). Vaš liječnik će Vam reći koju količinu otapala trebate upotrijebiti.
- Primijenite lijek odmah nakon pripreme. Nemojte ga zamrzavati.

1. Operite ruke te ih dobro osušite. Očistite radni prostor.
2. Izvadite bočicu lijeka Meropenem Steriscience iz pakiranja. Provjerite bočicu i rok valjanosti lijeka. Provjerite je li bočica netaknuta te da nema oštećenja.
3. Uklonite obojenu kapicu i rupčićem natopljenim alkoholom očistite gumeni čep. Pustite da se gumeni čep osuši.
4. Stavite novu sterilnu iglu na novu sterilnu štrcaljku, bez dodirivanja završetaka.

5. Uvucite preporučenu količinu sterilne "vode za injekcije" u štrcaljku. Količina tekućine koja Vam je potrebna prikazana je niže u tablici:

Doza lijeka Meropenem Steriscience	Količina „vode za injekcije“ potrebna za pripremu otopine
500 mg (miligrama)	10 ml (mililitara)
1000 mg	20 ml
1500 mg	30 ml
2000 mg	40 ml

Imajte na umu: Ako Vam je propisana doza lijeka Meropenem Steriscience veća od 1000 mg, trebat će Vam više od 1 bočice lijeka. Tada možete uvući tekućinu iz bočica u jednu štrcaljku.

6. Probušite iglom štrcaljke kroz središte sivog gumenog zatvarača i injektirajte preporučenu količinu vode za injekcije u bočicu ili bočice lijeka Meropenem Steriscience.
7. Izvucite iglu iz bočice i bočicu dobro protresite oko 5 sekundi, ili dok se sav prašak ne otopi. Još jednom prebrišite sivi gumeni zatvarač novom maramicom natopljenom alkoholom i pustite ga da se osuši. Otopinu je prije primjene potrebno vizualno pregledati da ne sadrži čestice ili da nije došlo do promjene boje. Upotrijebiti se smije samo bistra bezbojna do žuta otopina, u kojoj nema čestica.
8. Klip štrcaljke gurnite do kraja u štrcaljku pa ponovno provucite iglu kroz sivi gumeni zatvarač. Držite i štrcaljku i bočicu, te bočicu okrenite naopako.
9. Držeći kraj igle u otopini, povucite klip natrag i uvucite svu tekućinu iz bočice u štrcaljku.
10. Izvucite iglu i štrcaljku iz bočice i bacite praznu bočicu na za to određeno mjesto.
11. Štrcaljku držite uspravno s iglom okrenutom prema gore. Kucnite po štrcaljki da se svi mjehurići zraka u tekućini dignu prema vrhu štrcaljke.
12. Uklonite sav zrak iz štrcaljke laganim pritiskom klipa dok sav zrak ne izađe.
13. Ako primjenjujete Meropenem Steriscience kod kuće, upotrijebljene igle i pribor za infuziju odložite na odgovarajući način. Ako Vaš liječnik odluči prekinuti liječenje, neiskorišteni lijek Meropenem Steriscience odložite na odgovarajući način.

Davanje injekcije

Ovaj lijek možete dati kroz kratku kanilu ili venflon (intravenska kanila) ili kroz port ili centralni venski kateter.

Davanje lijeka Meropenem Steriscience kroz kratku kanilu ili venflon

1. Uklonite iglu sa štrcaljke i pažljivo ju odložite u posudu za oštri otpad.
2. Obrišite završetak kratke kanile ili venskog katetera maramicom natopljenom alkoholom i pustite da se osuši. Skinite kapicu s Vaše kanile i spojite štrcaljku.
3. Lagano gurajte klip štrcaljke dajući antibiotik ujednačeno kroz 5 minuta.
4. Kada ste završili s davanjem antibiotika i ispraznili štrcaljku, uklonite štrcaljku i isperite po preporuci Vašeg liječnika ili medicinske sestre.
5. Zatvorite kapicom kanilu i pažljivo odložite štrcaljku u posudu za oštri otpad.

Davanje lijeka Meropenem Steriscience kroz port ili centralni venski kateter

1. Uklonite kapicu s porta ili centralnog venskog katetera, očistite završetak maramicom natopljenom alkoholom i pustite da se osuši.
2. Spojite štrcaljku i lagano gurajte klip štrcaljke dajući antibiotik ujednačeno kroz 5 minuta.
3. Kada ste završili s davanjem antibiotika, uklonite štrcaljku i isperite po preporuci Vašeg liječnika ili medicinske sestre.
4. Stavite novu čistu kapicu na Vaš centralni venski kateter i pažljivo odložite štrcaljku u posudu za oštri otpad.

Svaka je bočica samo za jednokratnu upotrebu.

Otopinu je potrebno protresti prije upotrebe. Otopinu je prije primjene potrebno vizualno pregledati da ne sadrži čestice ili da nije došlo do promjene boje. Upotrijebiti se smije samo bistra bezbojna do žuta otopina, bez vidljivih čestica.

Za uvjete čuvanja nakon rekonstitucije/razrjeđivanja lijeka vidjeti dio 5.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.