

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Mikafungin Teva 50 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju Mikafungin Teva 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

mikafungin

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Mikafungin Teva i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Mikafungin Teva
3. Kako primjenjivati Mikafungin Teva
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Mikafungin Teva
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Mikafungin Teva i za što se koristi

Mikafungin Teva sadrži djelatnu tvar mikafungin. Mikafungin Teva se naziva antimikotikom zato što se primjenjuje za liječenje infekcija uzrokovanih stanicama gljivica.

Mikafungin Teva se primjenjuje za liječenje gljivičnih infekcija uzrokovanih stanicama gljivice ili pljesni koja se zove *Candida*. Mikafungin Teva je djelotvoran u liječenju sistemskih infekcija (onih koje su prodrle u tijelo). Ometa proizvodnju dijelova stanične stijenke gljivice. Gljivici je potrebna cijelovita stanična stijenka za daljnji život i rast. Mikafungin Teva uzrokuje oštećenja u staničnoj stijenci gljivice, zbog čega ona ne može živjeti i rasti.

Liječnik će Vam propisati Mikafungin Teva u sljedećim okolnostima, kad liječenje nekim drugim pogodnim antimikoticima nije dostupno (vidjeti dio 2):

- Za liječenje odraslih, adolescenata i djece, uključujući novorođenčad, koji imaju ozbiljnu gljivičnu infekciju zvanu invazivna kandidijaza (infekcija koja je prodrla u tijelo).
- Za liječenje odraslih i adolescenata u dobi od 16 ili više godina koji imaju gljivičnu infekciju jednjaka (ezofagusa) kad je prikladno provesti liječenje u venu (intravenski).
- Za sprečavanje infekcije *Candidom* u bolesnika koji su podvrgnuti presadišvanju koštane srži ili za koje se očekuje da će imati neutropenijsku (niska razina neutrofila, vrsta bijelih krvnih stanica) tijekom 10 dana ili duže.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Mikafungin Teva

##### Nemojte primjenjivati Mikafungin Teva:

- ako ste alergični na mikafungin, druge ehinokandine (Ecalta ili Cancidas) ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

#### Upozorenja i mjere opreza

U štakora je dugotrajno liječenje mikafunginom dovelo do oštećenja jetre i posljedičnih tumora jetre.

Mogući rizik od razvoja tumora jetre u ljudi nije poznat pa će Vaš liječnik procijeniti koristi i rizike liječenja lijekom Mikafungin Teva prije nego što počnete uzimati taj lijek. Obavijestite liječnika ako imate tešku bolest jetre (npr. zatajenje jetre ili hepatitis) ili imate poremećene nalaze pretraga jetrene funkcije. Tijekom liječenja pažljivo će se pratiti funkcija Vaše jetre.

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego primijenite Mikafungin Teva

- ako ste alergični na bilo koji lijek
- ako imate hemolitičku anemiju (anemija zbog raspada crvenih krvnih stanica) ili hemolizu (raspadanje crvenih krvnih stanica)
- ako imate tegobe s bubrežima (npr. zatajenje bubreža i poremećene nalaze funkcije bubreža). Ako se to dogodi, liječnik može odlučiti da pažljivije prati funkciju Vaših bubreža.

Mikafungin može također uzrokovati tešku upalu/izbijanje promjena na koži i sluznicama (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).

### **Drugi lijekovi i Mikafungin Teva**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Osobito je važno da obavijestite svog liječnika ako uzimate amfotericin B dezoksikolat ili itrakonazol (antimikotici), sirolimus (imunosupresiv) ili nifedipin (blokator kalcijevih kanala koji se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka). Liječnik može odlučiti da Vam prilagodi dozu ovih lijekova.

### **Mikafungin Teva s hranom i pićem**

Budući da se Mikafungin Teva daje intravenski (u venu), nisu potrebna ograničenja u uzimanju hrane ili pića.

### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Mikafungin Teva se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim kad je jasno da je to neophodno. Ako uzimate Mikafungin Teva, ne smijete dojiti.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nije vjerojatno da će mikafungin imati utjecaj na upravljanje vozilima ili rad sa strojevima. Ipak neki ljudi mogu osjetiti omaglicu kada uzimaju ovaj lijek. Ukoliko se to dogodi Vama, nemojte upravljati vozilom niti koristiti bilo kakav alat ili stroj. Obavijestite svog liječnika ako osjetite neke učinke zbog kojih biste mogli imati tegobe kod upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

### **Mikafungin Teva sadrži natrij**

Mikafungin Teva sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po bočici, tj. zanemarive količine natrija.

## **3. Kako primjenjivati Mikafungin Teva**

Mikafungin Teva mora pripremiti i primijeniti liječnik ili drugi zdravstveni radnik. Mikafungin Teva treba primijeniti jedanput na dan sporom intravenskom infuzijom (u venu). Liječnik će odrediti koliko ćete lijeka Mikafungin Teva dobivati svaki dan.

### **Primjena u odraslih, adolescenata u dobi od 16 ili više godina i starijih osoba**

- Uobičajena doza za liječenje invazivne infekcije *Candidom* je 100 mg na dan za bolesnike tjelesne težine veće od 40 i 2 mg/kg na dan za bolesnike tjelesne težine 40 ili manje kilograma.
- Doza za liječenje infekcije jednjaka *Candidom* je 150 mg za bolesnike tjelesne težine veće od 40 kg i 3 mg/kg na dan za bolesnike tjelesne težine 40 ili manje kilograma.
- Uobičajena doza za sprječavanje invazivnih infekcija *Candidom* je 50 mg na dan za bolesnike tjelesne težine veće od 40 kg i 1 mg/kg na dan za bolesnike tjelesne težine 40 ili manje kilograma.

### **Primjena u djece u dobi od 4 mjeseca ili više i adolescenata mlađih od 16 godina**

- Uobičajena doza za liječenje invazivne infekcije *Candidom* je 100 mg na dan za bolesnike tjelesne težine veće od 40 kilograma i 2 mg/kg na dan za bolesnike tjelesne težine 40 ili manje kilograma.
- Uobičajena doza za sprječavanje invazivnih infekcija *Candidom* je 50 mg na dan za bolesnike tjelesne težine veće od 40 kg i 1 mg/kg na dan za bolesnike tjelesne težine od 40 ili manje kilograma.

### **Primjena u djece i novorođenčadi mlađe od 4 mjeseca**

- Uobičajena doza za liječenje invazivne infekcije *Candidom* je 4-10 mg/kg/dan.
- Uobičajena doza za sprječavanje invazivnih infekcija *Candidom* je 2 mg/kg/dan.

### **Ako primite više lijeka Mikafungin Teva nego što ste trebali**

Liječnik će pratiti Vaš odgovor na liječenje i stanje kako bi odredio potrebnu dozu lijeka Mikafungin Teva. Međutim, ako ste zabrinuti da ste možda dobili previše lijeka Mikafungin Teva, odmah se obratite svom liječniku ili drugom zdravstvenom radniku.

### **Ako ste propustili dozu Mikafungin Teva**

Liječnik će pratiti Vaš odgovor na liječenje i stanje kako bi odredio kakvo je liječenje lijekom Mikafungin Teva potrebno. Međutim, ako ste zabrinuti da ste možda propustili dozu, odmah se obratite svom liječniku ili drugom zdravstvenom radniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako dobijete alergijsku reakciju ili tešku kožnu reakciju (npr. stvaranje mjeđura i guljenje kože), odmah obavijestite svog liječnika ili medicinsku sestru.

Mikafungin Teva može prouzročiti i sljedeće nuspojave:

#### **Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)**

- poremećeni nalazi krvnih pretraga (smanjen broj bijelih krvnih stanica [leukopenija, neutropenija]), smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemija)
- sniženi kalij u krvi (hipokalemija), sniženi magnezij u krvi (hipomagnezemija), sniženi kalcij u krvi (hipokalcemija)
- glavobolja
- upala stijenke vene (na mjestu ubrizgavanja)
- mučnina, povraćanje, proljev, bol u trbuhi
- poremećeni nalazi jetrenih funkcija (povišena alkalna fosfataza, povišena aspartat aminotransferaza, povišena alanin aminotransferaza)
- povećan žučni pigment u krvi (hiperbilirubinemija)
- osip
- vrućica
- tresavica (drhtavica)

#### **Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)**

- poremećeni nalazi krvnih pretraga (snižen broj krvnih stanica [pancitopenija]), snižen broj krvnih pločica (trombocitopenija), povećanje broja određene vrste bijelih krvnih stanica koje se zovu eozinofili, snižen albumin u krvi (hipoalbuminemija)
- preosjetljivost
- pojačano znojenje

- sniženi natrij u krvi (hiponatremija), povišen kalij u krvi (hiperkalemija), sniženi fosfati u krvi (hipofosfatemija), anoreksija (poremećaj prehrane)
- nesanica (otežano spavanje), tjeskoba, smetenost
- osjećaj letargije (pospanost), drhtanje, omaglica, poremećen osjet okusa
- povećana brzina rada srca, jače lupanje srca, nepravilan rad srca
- visok ili nizak krvni tlak, crvenilo kože uz osjećaj vrućine
- nedostatak zraka
- probavne tegobe; zatvor
- zatajenje jetre, povišeni jetreni enzimi (gama-glutamil transferaza), žutica (žuta boja kože ili bjeloočnica prouzročena tegobama s jetrom ili krvlju), smanjena količina žuci koja dospijeva u crijevo (kolestaza), povećana jetra; upala jetre
- osip sa svrbežom (urtikarija), svrbež, crvenilo kože (eritem)
- poremećeni nalazi bubrežne funkcije (povišen kreatinin u krvi; povišena urea u krvi), pogoršanje zatajenja bubrega
- povišenje enzima koji se zove laktat dehidrogenaza
- stvaranje ugruška u veni na mjestu primjene injekcije, upala na mjestu primjene injekcije, bol na mjestu primjene injekcije, nakupljanje tekućine u tijelu

#### **Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)**

- anemija zbog raspada crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija), raspad crvenih krvnih stanica (hemoliza)

#### **Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)**

- poremećaj sustava zgrušavanja krvi
- (alergijski) šok
- oštećenje stanica jetre uključujući smrt
- tegobe s bubrežima; akutno zatajenje bubrega

#### **Dodatne nuspojave u djece i adolescenata**

Sljedeće reakcije zabilježene su češće u pedijatrijskih bolesnika nego u odraslih bolesnika:

#### **Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)**

- smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija)
- ubrzani otkucaji srca (tahikardija)
- visok ili nizak krvni tlak
- povištene žučne boje u krvi (hiperbilirubinemija), povećana jetra
- akutno zatajenje bubrega, povišena urea u krvi

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Mikafungin Teva**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Neotvorena bočica ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

#### **Rekonstituirani koncentrat u bočici**

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni do 48 sati, na temperaturi od 25°C, nakon rekonstitucije otopinom za infuziju natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) ili otopinom za infuziju glukoze od 50 mg/ml (5%).

#### Razrijeđena otopina za infuziju

Dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u primjeni 96 sati, na temperaturi od 25°C, zaštićeno od svjetlosti, nakon razrjeđivanja otopinom za infuziju natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) ili otopinom za infuziju glukoze od 50 mg/ml (5%).

S mikrobiološkog stajališta, rekonstituiranu i razrijeđenu otopinu treba odmah primijeniti. Ako se ne primjeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja pripremljenog lijeka odgovornost su korisnika i ne bi trebali iznositi više od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C, osim kad su rekonstitucija i razrjeđenje provedeni u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

Samo osposobljeni zdravstveni radnik koji je ispravno pročitao cijelu uputu može pripremiti ovaj lijek za primjenu.

Nemojte primjeniti razrijeđenu otopinu za infuziju ako je zamućena ili sadrži talog.

Radi zaštite od svjetlosti, bocu/vrećicu za infuziju koja sadrži otopinu za infuziju treba umetnuti u neprozirnu vrećicu koja se može zatvoriti.

Bočica je namijenjena samo za jednokratnu primjenu. Stoga odmah zbrinite pripremljeni koncentrat koji nije primjenjen.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Mikafungin Teva sadrži**

- Djelatna tvar je mikafungin (u obliku mikafunginnatrija).  
1 bočica sadrži mikafunginnatrij što odgovara 50 mg ili 100 mg mikafungina.
- Pomoćne tvari su saharoza, citratna kiselina i natrijev hidroksid.

### **Kako Mikafungin Teva izgleda i sadržaj pakiranja**

Mikafungin Teva 50 mg ili 100 mg prašak za koncentrat za otopinu za infuziju je bijeli do bjelkasti prašak.

Mikafungin Teva se isporučuje u kutiji koja sadrži 1 bočicu.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemska

#### **Proizvođač**

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

11, Ion Mihalache Ave., the 1st district

Bucharest, 011171

Rumunjska

H A L M E D  
18 - 07 - 2024  
O D O B R E N O

Merckle GmbH  
Graf-Arco-Str. 3  
89079 Ulm  
Njemačka

**Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**

PLIVA HRVATSKA d.o.o.  
Prilaz baruna Filipovića 25  
10 000 Zagreb  
Tel: 01 37 20 000

**Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:**

Austrija	Micafungin ratiopharm 50 mg, 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Češka	Micafungin TEVA
Grčka	Micafungin/Teva 50 mg, 100 mg Κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος διάλυμα προς έγχυση
Španjolska	Micafungina Teva 50 mg, 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG
Mađarska	Micafungin-Teva 50 mg, 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
Italija	Micafungina Teva
Nizozemska	Micafungine Teva 50 mg, 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Poljska	Micafungin Teva
Portugal	Micafungina Teva
Švedska	Mikafungin Teva
Slovenija	Mikafungin Teva 50 mg, 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
Ujedinjeno Kraljevstvo	Micafungin Teva 50 mg, 100 mg Powder for concentrate for Solution for Infusion

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2024.**

---

Sljedeće informacije namijenjene su samo liječnicima i zdravstvenim radnicima:

Mikafungin Teva se ne smije mijesati niti primjenjivati infuzijom zajedno s drugim lijekovima osim onih navedenih niže. Mikafungin Teva se rekonstituira i razrjeđuje aseptičkim tehnikama na sobnoj temperaturi na sljedeći način:

1. Plastična kapica mora se ukloniti s bočice, a čep dezinficirati alkoholom.
2. 5 ml otopine za infuziju natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) ili otopine za infuziju glukoze od 50 mg/ml (5%) (koji se uzmu iz boce/vrećice od 100 ml) treba aseptički i sporo ubrizgati u svaku bočicu niz unutarnju stranu stijenke. Iako će se koncentrat zapjeniti, potrebno je učiniti sve da količina stvorene pjene bude što manja. Mora se rekonstituirati dovoljan broj bočica lijeka Mikafungin Teva kako bi se dobila potrebna doza u mg (vidjeti tablicu niže).
3. Bočicu treba nježno okretati. NE TRESTI. Prašak će se potpuno otopiti. Koncentrat treba odmah primijeniti. Bočica je namijenjena samo za jednokratnu primjenu. Stoga, rekonstituirani koncentrat koji nije primijenjen, mora se odmah zbrinuti.

H A L M E D  
18 - 07 - 2024  
O D O B R E N O

4. Sav rekonstituirani koncentrat treba izvući iz pojedine bočice i vratiti u bocu/vrećicu za infuziju iz koje se prvobitno uzela otopina. Razrijedenu otopinu za infuziju treba odmah primijeniti. Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost pripremljenog lijeka je 96 sati na temperaturi od 25°C kad je zaštićen od svjetlosti i razrijeđen kako je opisano gore.
5. Boca/vrećica za infuziju treba se nježno okrenuti tako da se razrijedena otopina rasprši, ali se NE SMIJE mučkati da se ne stvori pjena. Otopinu se ne smije primijeniti ako je zamućena ili se stvorio talog.
6. Bocu/vrećicu za infuziju koja sadrži razrijedenu otopinu za infuziju treba umetnuti u neprozirnu vreću koja se može zatvoriti radi zaštite od svjetlosti.

Priprema otopine za infuziju

<b>Doza (mg)</b>	<b>Bočica lijeka Mikafungin Teva koji će se primijeniti (mg/bočica)</b>	<b>Volumen natrijevog klorida (0,9%) ili glukoze (5%) koji će se dodati po bočici</b>	<b>Volumen (koncentracija) rekonstituiranog praška</b>	<b>Standardna infuzija (dodata do 100 ml) Konačna koncentracija</b>
50	1 x 50	5 ml	približno 5 ml (10 mg/ml)	0,5 mg/ml
100	1 x 100	5 ml	približno 5 ml (20 mg/ml)	1,0 mg/ml
150	1 x 100 + 1 x 50	5 ml	približno 10 ml	1,5 mg/ml
200	2 x 100	5 ml	približno 10 ml	2,0 mg/ml

Nakon rekonstitucije i razrjeđivanja, otopinu treba primijeniti intravenskom infuzijom u trajanju od približno 1 sat.