

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### NEURONTIN 300 mg tvrde kapsule NEURONTIN 400 mg tvrde kapsule

gabapentin

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Neurontin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Neurontin
3. Kako uzimati Neurontin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Neurontin
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Neurontin i za što se koristi

Neurontin pripada skupini lijekova koju nazivamo antiepileptici, a koriste se u liječenju epilepsije i periferne neuropatske boli (dugotrajna bol uzrokovana oštećenjem živaca).

Djelatna tvar Neurontin tvrdih kapsula je gabapentin.

Neurontin se koristi u liječenju:

- različitih oblika epilepsije (za napadaje koji su inicijalno ograničeni na određene dijelove mozga, bez obzira da li su se proširili dalje ili ne). Liječnik koji liječi Vas ili Vaše dijete u dobi od 6 godina ili starije preporučit će ovaj lijek u slučaju kad postojećim liječenjem nije postignuta potpuna kontrola bolesti. Ukoliko Vam liječnik nije savjetovao drugačije, Vi ili Vaše dijete u dobi od 6 godina ili starije Neurontin uzimate kao dodatnu terapiju onoj koju već primete. Ovaj lijek također se može primjenjivati kao pojedinačna terapija za liječenje odraslih bolesnika i djece starije od 12 godina.
- periferne neuropatske boli (dugotrajna bol uzrokovana oštećenjem živaca). Različite bolesti mogu uzrokovati perifernu neuropatsku bol (primarno se javlja u nogama i/ili rukama), kao što je dijabetes ili herpes zoster. Bolne senzacije mogu biti opisane kao vrućina, pečenje, pulsiranje, udaranje, probadanje, oštra, grčevita, jaka, štipajuća bol, obamrlost, bockanje itd.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Neurontin?

##### Nemojte uzimati Neurontin

- ako ste alergični (preosjetljivi) na gabapentin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

## Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Neurontin:

- ako imate problema s bubrezima, liječnik Vam može promijeniti dozu lijeka ili režim doziranja;
- ako ste na hemodijalizi, recite svom liječniku ako osjetite bol u mišićima i/ili slabost;
- ako se pojave znakovi poput stalne boli u želucu, mučnina ili povraćanje, jer to mogu biti simptomi akutne upale gušterače (akutnog pankreatitisa);
- ako imate poremećaje živčanog sustava, poremećaje dišnog sustava ili ste stariji od 65 godina jer Vam liječnik može propisati drugačiji režim doziranja
- prije uzimanja ovog lijeka obavijestite svog liječnika ako ste ikada zlouporabili ili bili ovisni o alkoholu, lijekovima koji se izdaju na recept ili ilegalnim drogama; to može značiti da ste izloženi većem riziku od ovisnosti o lijeku Neurontin
- ako imate miasteniju gravis (bolest koja uzrokuje slabost mišića) jer ovaj lijek može pogoršati Vaše simptome.

## Ovisnost

Neke osobe mogu postati ovisne o lijeku Neurontin (osjećati potrebu za daljnjim uzimanjem lijeka). Mogu iskusiti učinke ustezanja nakon što prestanu primjenjivati ili smanje dozu lijeka Neurontin (pogledati dio 3, „Kako uzimati Neurontin” i „Ako prestanete uzimati Neurontin”). Ako se brinete zbog mogućnosti ovisnosti o lijeku Neurontin, važno je savjetovati se s liječnikom.

Ako prilikom uzimanja lijeka Neurontin primijetite bilo koji od sljedećih znakova, to može upućivati na to da ste postali ovisni:

- imate potrebu uzimati lijek tijekom duljeg vremenskog razdoblja od onog koje Vam je preporučio liječnik,
- imate potrebu uzeti više lijeka od propisane doze,
- razlog zbog kojega uzimate lijek različit je od razloga zbog kojeg Vam je propisan
- više ste puta neuspješno pokušali prestati uzimati lijek ili kontrolirati Vašu primjenu lijeka,
- osjećate se loše kad prestanete uzimati lijek, a osjećate se bolje kad ponovno počnete uzimati lijek.

Ako primijetite bilo što od navedenog, obratite se Vašem liječniku i razgovarajte o načinu liječenja koje bi bilo najbolje za Vas, i ujedno o tome kad je prikladno prekinuti s primjenom lijeka i kako to izvesti na siguran način.

Kod manjeg broja bolesnika koji su liječeni antiepilepticima, kao što je gabapentin, javile su se misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vam se bilo kada jave ovakve misli, odmah obavijestite liječnika.

Odmah se obratite svom liječniku, ako primijetite gore navedene simptome.

## **Važne informacije o potencijalno ozbiljnim reakcijama**

Tijekom liječenja gabapentinom zabilježeni su ozbiljni kožni osipi, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i reakciju na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS). Prekinite primjenu gabapentina i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od simptoma povezanih s navedenim ozbiljnim kožnim reakcijama opisanima u dijelu 4.

Pročitajte opis ozbiljnih simptoma u dijelu 4. pod **„Odmah obavijestite svog liječnika, ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma obzirom da mogu biti vrlo ozbiljni“**.

Slabost u mišićima, osjetljivost ili bol, posebice ako se istovremeno osjećate loše ili imate visoku temperaturu, mogu biti uzrokovani abnormalnim raspadom mišića koji može biti opasan po život i dovesti do oštećenja bubrega. Također može doći do promjene boje urina i promjene rezultata krvnih pretraga

(znatno povećana razina kreatin fosfokinaze). Ukoliko primijetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma, odmah obavijestite liječnika.

Liječenje gabapentinom povezano je s omaglicom i izrazitom pospanošću, što može dovesti do slučajnih ozljeda (padova). Također, nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježeni su slučajevi smetenosti, gubitka svijesti i umanjenja mentalnih sposobnosti. Budite posebno oprezni dok ne spoznate kako ovaj lijek utječe na Vas.

### **Drugi lijekovi i Neurontin**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Osobito obavijestite liječnika (ili ljekarnika) ako uzimate ili ste nedavno uzimali lijekove protiv konvulzija, poremećaja spavanja, depresije, tjeskobe ili bilo kojeg drugog neurološkog ili psihijatrijskog problema.

### **Lijekovi koji sadrže opioide kao što je morfij**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate lijekove koji sadrže opioide (kao što je morfij), jer opioidi mogu pojačati učinak Neurontina. Nadalje, kombinacija Neurontina s opioidima može uzrokovati izrazitu pospanost, sedaciju, plitko i usporeno disanje (respiratorna depresija) ili smrt.

### **Antacidi za probavne smetnje**

Ako se Neurontin i antacidi koji sadrže aluminij i magnezij uzimaju istodobno, apsorpcija Neurontina iz želuca može se smanjiti. Stoga se preporuča uzimanje ovog lijeka najranije 2 sata nakon primjene antacida.

### **Neurontin**

Ne očekuje se reakcija sa drugim antiepilepticima ili oralnim kontraceptivima.

Neurontin može imati utjecaja na neke laboratorijske testove. Ako trebate napraviti test mokraće, recite liječniku ili bolničkom osoblju da uzimate ovaj lijek.

### **Neurontin s hranom**

Neurontin se može uzimati s hranom ili bez nje.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

- ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, morate odmah obavijestiti svog liječnika i raspraviti o mogućim rizicima koje bi lijek koji uzimate mogao predstavljati za vaše nerođeno dijete.
- ne biste trebali prekinuti liječenje bez razgovora s liječnikom.
- ako planirate zatrudnjeti, trebate razgovarati o liječenju sa svojim liječnikom ili ljekarnikom što je prije moguće prije nego što zatrudnite.
- ako dojite ili planirate dojiti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

### Trudnoća

Neurontin se može koristiti tijekom prvog tromjesečja trudnoće ako je potrebno. Ako planirate zatrudnjeti, ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, odmah razgovarajte sa svojim liječnikom.

Ako ste zatrudnjeli i imate epilepsiju, važno je da ne prestanete uzimati lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer to može pogoršati Vašu bolest. Pogoršanje vaše epilepsije može dovesti Vas i Vaše nerođeno dijete u opasnost.

U ispitivanju koje je uključivalo podatke o ženama u nordijskim zemljama koje su uzimale gabapentin tijekom prva 3 mjeseca trudnoće, nije bilo povećanog rizika od urođenih mana ili problema s razvojem funkcije mozga (poremećaji u neurorazvoju). Međutim, bebe žena koje su uzimale gabapentin tijekom

trudnoće imale su povećan rizik od niske porođajne težine i prijevremenog poroda.

Ako se primjenjuje tijekom trudnoće, gabapentin može dovesti do simptoma ustezanja u novorođenčadi. Taj se rizik može povećati u slučaju uzimanja gabapentina zajedno s opioidnim analgeticima (lijekovima za liječenje jake boli).

Odmah se obratite liječniku, ako ste zatrudnjeli, mislite da ste trudni ili namjeravate zatrudnjati tijekom liječenja ovim lijekom. Ako ustanovite da ste trudni, nemojte naglo prekinuti uzimati Neurontin jer bi to moglo imati ozbiljne posljedice za Vas i za Vaše dijete.

#### Dojenje

Gabapentin, djelatna tvar Neurontina, izlučuje se u majčino mlijeko. Obzirom da učinak na dojenče nije poznat, ne preporučuje se dojenje djeteta tijekom liječenja ovim lijekom.

#### Plodnost

Nema učinka na plodnost u ispitivanjima na životinjama.

#### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Neurontin može uzrokovati omaglice, pospanost i umor. Nemojte upravljati vozilima, kompleksnim strojevima ili sudjelovati u ostalim potencijalno opasnim aktivnostima, dok ne spoznate utječe li ovaj lijek na Vaše sposobnosti obavljanja tih aktivnosti.

#### **Neurontin sadrži laktozu.**

Neurontin sadrži laktozu (oblik šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

#### **Neurontin sadrži natrij.**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tvrdoj kapsuli od 300 mg i 400 mg, tj. zanemarive količine natrija.

### **3. Kako uzimati Neurontin**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Ne uzimajte više lijeka nego što Vam je propisano. Liječnik će utvrditi koja Vam doza najviše odgovara.

#### **Epilepsija**

##### Odrasli i adolescenti:

Uzmite onoliko tvrdih kapsula koliko Vam je propisano. Liječnik će Vam najčešće postupno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 mg i 900 mg na dan. Potom se doza postupno može povećavati do ukupne dnevne maksimalne doze od 3600 mg koju je potrebno podijeliti u 3 jednake doze, npr. jednom ujutro, jednom poslijepodne te jednom uvečer.

#### **Primjena u djece i adolescenata**

##### Djeca u dobi od 6 i više godina:

Liječnik će odrediti dozu koju će uzimati Vaše dijete, na temelju tjelesne težine djeteta. Liječenje se započinje s nižom početnom dozom, koja se potom postupno povećava, u razdoblju od 3 dana. Uobičajena početna dnevna doza za kontrolu epilepsije je 25 - 35 mg po kilogramu tjelesne težine. Obično se uzima svakodnevno u 3 podijeljene doze, obično jednom ujutro, jednom poslijepodne i jednom uvečer.

**Neurontin se ne preporučuje u djece mlađe od 6 godina.**

## **Periferna neuropatska bol**

### Odrasli

Uzmite onoliko tvrdih kapsula koliko Vam je liječnik propisao. Liječnik će Vam najčešće postupno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 mg i 900 mg na dan. Potom se doza postupno može povećavati do ukupne dnevne maksimalne doze od 3600 mg koju je potrebno podijeliti u 3 jednake doze, npr. jednom ujutro, jednom poslijepodne te jednom uvečer.

### **Ako imate problema s bubrezima ili ste na hemodijalizi**

Ako imate problema s bubrezima ili ste na hemodijalizi Vaš će Vam liječnik propisati drugačiji raspored uzimanja lijeka i/ili dozu.

**Ako ste starija osoba (imate više od 65 godina)**, uzmite uobičajenu dozu Neurontina, osim ako imate problema s bubrezima. Liječnik Vam može propisati drugačiji režim doziranja i/ili dozu ako imate problema s bubrezima.

Ukoliko imate dojam da je učinak Neurontina preslab ili prejak, odmah se savjetujte sa svom liječnikom ili ljekarnikom.

### **Način primjene**

Neurontin se uzima kroz usta. Uvijek progutajte cijelu tvrdnu kapsulu s dosta vode. Nastavite s uzimanjem Neurontina dok Vam liječnik ne kaže suprotno.

### **Ako uzmete više Neurontina nego što ste trebali**

Uzimanje veće doze od preporučene može dovesti do povećanja nuspojava uključujući gubitak svijesti, omaglicu, dvoslike, nerazgovjetan govor, omamljenost i proljev.

Odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite do najbliže jedinice hitne pomoći. Budući da gabapentin može uzrokovati omamljenost, preporučljivo je upitati nekoga da Vas odveze ili pozvati hitnu medicinsku pomoć. Ponesite sa sobom preostale tvrde kapsule, kutiju i uputu o lijeku kako bi liječnik mogao lakše utvrditi koji ste lijek uzeli.

### **Ako ste zaboravili uzeti Neurontin**

Ako zaboravite uzeti jednu dozu lijeka, uzmite lijek čim se sjetite, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

### **Ako prestanete uzimati Neurontin**

Nemojte naglo prestati uzimati ili smanjiti dozu lijeka Neurontin. Ako želite prestati uzimati ili smanjiti svoju dozu lijeka Neurontin, prvo razgovarajte o tome s liječnikom. On će Vam reći kako to učiniti. Ako prekidate liječenje ili Vam se smanjuje doza, to mora biti provedeno postupno, tijekom najmanje tjedan dana. Važno je znati da nakon prekida kratkotrajnog ili dugotrajnog liječenja ili smanjenja doze lijeka Neurontin možete doživjeti neke nuspojave, takozvane učinke ustezanja. Ti učinci mogu obuhvaćati epileptičke napadaje, tjeskobu, nesanicu, mučninu, bol, znojenje, drhtanje, glavobolju, depresiju, neuobičajen osjećaj, omaglicu i opće loše osjećanje. Ti se učinci obično pojavljuju unutar 48 sati nakon prestanka uzimanja ili smanjenja doze lijeka Neurontin. Ako primijetite učinke ustezanja, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

**Prestanite uzimati Neurontin i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:**

- crvenkaste mrlje na trupu u razini kože, okrugle ili u obliku mete, često s mjehurićem u sredini, ljuštenje kože, ranice u usnoj šupljini, grlu, nosu, na genitalijama ili u očima. Ovim ozbiljnim kožnim osipima može prethoditi vrućica i simptomi nalik gripi (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).
- prošireni osip, visoka tjelesna temperatura i povećani limfni čvorovi (sindrom DRESS ili sindrom preosjetljivosti na lijek).

**Odmah obavijestite svog liječnika, ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma obzirom da mogu biti vrlo ozbiljni:**

- neprekidna bol u trbuhu, mučnina ili povraćanje (to bi mogli biti simptomi akutnog pankreatitisa)
- problemi s disanjem, koji ako su ozbiljni, zahtijevaju hitnu i intenzivnu njegu da biste nastavili normalno disati

Neurontin može uzrokovati ozbiljne, po život opasne alergijske reakcije s učinkom na kožu ili druge dijelove tijela, kao što je jetra ili krvne stanice. Ovaj tip reakcije može i ne mora biti popraćen osipom i može zahtijevati hospitalizaciju ili prekid liječenja Neurontinom. **Odmah se javite liječniku ako imate neki od sljedećih simptoma:**

- osip kože i crvenilo i/ili gubitak kose
- koprivnjaču
- vrućicu
- nateknute žlijezde (otok koji ne prolazi)
- nateknute usne, lice ili jezik
- žuto obojenje kože ili bjeloočnica
- neuobičajene modrice ili krvarenje
- jaku slabost ili umor
- neočekivanu bol u mišićima
- učestale infekcije

Ovi simptomi mogu biti prvi znaci ozbiljne reakcije. Liječnik će Vas pregledati kako bi odlučio možete li nastaviti uzimati Neurontin.

Ako ste na hemodijalizi, recite svom liječniku ako osjetite bol u mišićima i/ili slabost.

Druge nuspojave uključuju:

***Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):***

- virusne infekcije
- osjećaj izrazite pospanosti, omaglica, nedostatak koordinacije
- osjećaj umora, vrućica

***Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):***

- upala pluća, infekcija dišnih putova, infekcija mokraćnog trakta, upala uha ili druge infekcije
- smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukopenija)
- gubitak apetita (anoreksija), povećan apetit
- ljutnja naspram drugih, smetenost (konfuzija), promjene raspoloženja, depresija, tjeskoba, nervoza, problemi u razmišljanju
- konvulzije, trzanja, poteškoće u govoru, gubitak pamćenja, nevoljno drhtanje, teškoće sa spavanjem uključujući nesanicu, glavobolja, osjetljiva koža, smanjen osjet, problemi s koordinacijom, neuobičajeni pokreti oka, pojačani, smanjeni refleksi ili izostanak refleksa
- zamućen vid, dvostruka slika

- vrtoglavica
- visoki krvni tlak, navale vrućine ili proširenje krvnih žila
- problemi s disanjem, bronhitis, grlobolja, kašalj, hunjavica (rinitis)
- povraćanje, mučnina, problemi sa zubima, upala zubnih desni, proljev, bol u želucu, loša probava, zatvor, suhoća usta ili grla, nadutost (vjetrovi)
- oticanje lica, masnice, osip, svrbež, akne
- bol u zglobovima, bol u mišićima, bol u leđima, nekontrolirano trzanje
- poteškoće s erekcijom (impotencija)
- oticanje nogu i ruku, poteškoće s hodanjem, opća slabost, bol, osjećaj nelagode, simptomi nalik gripi
- smanjen broj bijelih krvnih zrnaca, povećanje tjelesne težine
- slučajne ozljede, prijelomi, ogrebotine

Dodatno, u kliničkim ispitivanjima u djece, primijećene su česte pojave agresivnog ponašanja i trzajnih pokreta.

***Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):***

- agitacija (stanje kroničnog nemira i nehotični pokreti bez svrhe)
- alergijska reakcija (poput osipa i urtikarije)
- smanjena pokretljivost
- ubrzani otkucaji srca
- oticanje koje može zahvatiti lice, trup i udove
- promjene nalaza krvi koji ukazuju na bolest jetre
- mentalna oštećenja
- pad
- povišenje razina šećera (glukoze) u krvi (najčešće opaženo u bolesnika sa šećernom bolešću)
- problemi u seksualnoj funkciji (uključujući nemogućnost postizanja orgazma, poremećaje ejakulacije i promjene libida)
- otežano gutanje

***Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):***

- gubitak svijesti
- sniženje razina šećera (glukoze) u krvi (najčešće opaženo u bolesnika sa šećernom bolešću)
- poteškoće s disanjem, plitko disanje (respiratorna depresija)

Nakon stavljanja Neurontina na tržište prijavljene su sljedeće nuspojave, nepoznate učestalosti (učestalost nije moguće procijeniti na temelju dostupnih podataka):

- smanjen broj trombocita (stanice koje sudjeluju u zgrušavanju krvi)
- halucinacije
- problemi s neuobičajenim pokretima kao što su migoljenje, trzaji i ukočenost
- zvonjava u ušima
- žutica (žuto obojena koža i oči), upala jetre
- akutno zatajenje bubrega, inkontinencija
- povećanje žljezdanog tkiva dojke, povećanje dojke
- nuspojave koje se javljaju naglim prekidom uzimanja gabapentina (tjeskoba, problemi sa spavanjem, mučnina, bol, znojenje), bol u prsima
- raspadanje mišićnih vlakana (rabdomioliza)
- promjene u rezultatima krvnih pretraga (povišena razina kreatin fosfokinaze)
- snižena razina natrija u krvi
- anafilaksija (ozbiljna, potencijalno po život opasna alergijska reakcija uključujući otežano disanje, oticanje usana, grla i jezika te hipotenziju koji zahtijevaju hitno liječenje)

- suicidalne misli
- razvijanje ovisnosti o lijeku Neurontin („ovisnost o lijeku“)
- pogoršanje simptoma miastenije gravis (bolesti koja uzrokuje slabost mišića)

Važno je znati da nakon prekida kratkotrajnog ili dugotrajnog liječenja ili nakon smanjenja doze lijeka Neurontin možete doživjeti neke nuspojave, takozvane učinke ustezanja (pogledati „Ako prestanete uzimati Neurontin“).

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Neurontin**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Neurontin sadrži**

Djelatna tvar je gabapentin. Svaka Neurontin tvrda kapsula sadrži 300 mg ili 400 mg gabapentina.

Pomoćne tvari: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, talk, želatina, voda i natrijev laurilsulfat.

Neurontin 300 mg tvrde kapsule sadrže titanijev dioksid (E171) i željezov oksid, žuti (E172).

Neurontin 400 mg tvrde kapsule sadrže titanijev dioksid (E171), željezov oksid, žuti (E172) i željezov oksid, crveni (E172).

Tinta na svim tvrdim kapsulama sadrži: šelak, titanijev dioksid (E171), boju indigo karmin aluminij (E132).

### **Kako Neurontin izgleda i sadržaj pakiranja**

Neurontin 300 mg tvrde kapsule su žute tvrde kapsule s oznakama "Neurontin 300 mg" i "VLE".

Neurontin 400 mg tvrde kapsule su narančaste tvrde kapsule s oznakama "Neurontin 400 mg" i "VLE".

Neurontin tvrde kapsule dolaze u sljedećim pakiranjima:

*Neurontin 300 mg tvrde kapsule:* 50 (5x10) tvrdih kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru

*Neurontin 400 mg tvrde kapsule:* 50 (5x10) tvrdih kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja:**

Viatrix Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10000 Zagreb

**Proizvođači:**

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH  
Mooswaldallee 1  
79108 Freiburg Im Breisgau  
Njemačka

Medis International a.s., výrobní závod Bolatice  
Průmyslová 961/16  
747 23 Bolatice  
Češka

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2026.**