

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

NEURONTIN 300 mg tvrde kapsule NEURONTIN 400 mg tvrde kapsule

gabapentin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Neurontin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Neurontin
3. Kako uzimati Neurontin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Neurontin
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Neurontin i za što se koristi

Neurontin pripada skupini lijekova koju nazivamo antiepileptici, a koriste se u liječenju epilepsije i periferne neuropatske boli (dugotrajna bol uzrokovana oštećenjem živaca).

Djelatna tvar Neurontin tvrdih kapsula je gabapentin.

Neurontin se koristi u liječenju:

- različitih oblika epilepsije (za napadaje koji su inicijalno ograničeni na određene dijelove mozga, bez obzira da li su se proširili dalje ili ne). Liječnik koji liječi Vas ili Vaše dijete u dobi od 6 godina ili starije preporučit će ovaj lijek u slučaju kad postojećim liječenjem nije postignuta potpuna kontrola bolesti. Ukoliko Vam liječnik nije savjetovao drugačije, Vi ili Vaše dijete u dobi od 6 godina ili starije Neurontin uzimate kao dodatnu terapiju onoj koju već primate. Ovaj lijek također se može primjenjivati kao pojedinačna terapija za liječenje odraslih bolesnika i djece starije od 12 godina.
- periferne neuropatske boli (dugotrajna bol uzrokovana oštećenjem živaca). Različite bolesti mogu uzrokovati perifernu neuropatsku bol (primarno se javlja u nogama i/ili rukama), kao što je dijabetes ili herpes zoster. Bolne senzacije mogu biti opisane kao vrućina, pečenje, pulsiranje, udaranje, probadanje, oštra, grčevita, jaka, štipajuća bol, obamrllost, bockanje itd.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Neurontin?

Nemojte uzimati Neurontin

- ako ste alergični (preosjetljivi) na gabapentin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Neurontin:

- ako imate problema s bubrežima, liječnik Vam može promijeniti dozu lijeka ili režim doziranja;
- ako ste na hemodializu, recite svom liječniku ako osjetite bol u mišićima i/ili slabost;
- ako se pojave znakovi poput stalne boli u želucu, mučnina ili povraćanje, jer to mogu biti simptomi akutne upale gušterače (akutnog pankreatitisa);
- ako imate poremećaje živčanog sustava, poremećaje dišnog sustava ili ste stariji od 65 godina jer Vam liječnik može propisati drugačiji režim doziranja
- prije uzimanja ovog lijeka obavijestite svog liječnika ako ste ikada zloupotabili ili bili ovisni o alkoholu, lijekovima koji se izdaju na recept ili ilegalnim drogama; to može značiti da ste izloženi većem riziku od ovisnosti o lijeku Neurontin.

Ovisnost

Neke osobe mogu postati ovisne o lijeku Neurontin (osjećati potrebu za dalnjim uzimanjem lijeka). Mogu iskusiti učinke ustezanja nakon što prestanu primjenjivati Neurontin (pogledati dio 3, „Kako uzimati Neurontin“ i „Ako prestanete uzimati Neurontin“). Ako se brinete zbog mogućnosti ovisnosti o lijeku Neurontin, važno je savjetovati se s liječnikom.

Ako prilikom uzimanja lijeka Neurontin primijetite bilo koji od sljedećih znakova, to može upućivati na to da ste postali ovisni:

- imate potrebu uzimati lijek tijekom duljeg vremenskog razdoblja od onog koje Vam je preporučio liječnik,
- imate potrebu uzeti više lijeka od propisane doze,
- razlog zbog kojega uzimate lijek različit je od razloga zbog kojeg Vam je propisan
- više ste puta neuspješno pokušali prestati uzimati lijek ili kontrolirati Vašu primjenu lijeka,
- osjećate se loše kad prestanete uzimati lijek, a osjećate se bolje kad ponovno počnete uzimati lijek.

Ako primijetite bilo što od navedenog, obratite se Vašem liječniku i razgovarajte o načinu liječenja koje bi bilo najbolje za Vas, i ujedno o tome kad je prikladno prekinuti s primjenom lijeka i kako to izvesti na siguran način.

Kod manjeg broja bolesnika koji su liječeni antiepilepticima, kao što je gabapentin, javile su se misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako Vam se bilo kada jave ovakve misli, odmah obavijestite liječnika.

Odmah se obratite svom liječniku, ako primijetite gore navedene simptome.

Važne informacije o potencijalno ozbiljnim reakcijama

Tijekom liječenja gabapentinom zabilježeni su ozbiljni kožni osipi, uključujući Stevens-Johnsonov sindrom, toksičnu epidermalnu nekrolizu i reakciju na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS). Prekinite primjenu gabapentina i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od simptoma povezanih s navedenim ozbiljnim kožnim reakcijama opisanim u dijelu 4.

Pročitajte opis ozbiljnih simptoma u dijelu 4. pod „***Odmah obavijestite svog liječnika, ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma obzirom da mogu biti vrlo ozbiljni***“.

Slabost u mišićima, osjetljivost ili bol, posebice ako se istovremeno osjećate loše ili imate visoku temperaturu, mogu biti uzrokovani abnormalnim raspadom mišića koji može biti opasan po život i dovesti do oštećenja bubrega. Također može doći do promjene boje urina i promjene rezultata krvnih pretraga (znatno povećana razina kreatin fosfokinaze). Ukoliko primijetite bilo koji od navedenih znakova ili simptoma, odmah obavijestite liječnika.

Liječenje gabapentinom povezano je s omaglicom i izrazitom pospanošću, što može dovesti do slučajnih ozljeda (padova). Također, nakon stavljanja lijeka u promet, zabilježeni su slučajevi smetenosti, gubitka svijesti i umanjenja mentalnih sposobnosti. Budite posebno oprezni dok ne spoznate kako ovaj lijek utječe na Vas.

Drugi lijekovi i Neurontin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Osobito obavijestite liječnika (ili ljekarnika) ako uzimate ili ste nedavno uzimali lijekove protiv konvulzija, poremećaja spavanja, depresije, tjeskobe ili bilo kojeg drugog neurološkog ili psihiatrijskog problema.

Lijekovi koji sadrže opioide kao što je morfij

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate lijekove koji sadrže opioide (kao što je morfij), jer opioidi mogu pojačati učinak Neurontina. Nadalje, kombinacija Neurontina s opioidima može uzrokovati izrazitu pospanost, sedaciju, plitko i usporeno disanje (respiratorna depresija) ili smrt.

Antacidi za probavne smetnje

Ako se Neurontin i antacidi koji sadrže aluminij i magnezij uzimaju istodobno, apsorpcija Neurontina iz želuca može se smanjiti. Stoga se preporuča uzimanje ovog lijeka najranije 2 sata nakon primjene antacida.

Neurontin

Ne očekuje se reakcija sa drugim antiepilepticima ili oralnim kontraceptivima.

Neurontin može imati utjecaja na neke laboratorijske testove. Ako trebate napraviti test mokraće, recite liječniku ili bolničkom osoblju da uzimate ovaj lijek.

Neurontin s hranom

Neurontin se može uzimati s hranom ili bez nje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

- ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, morate odmah obavijestiti svog liječnika i raspraviti o mogućim rizicima koje bi lijek koji uzimate mogao predstavljati za vaše nerođeno dijete.
- ne biste trebali prekinuti liječenje bez razgovora s liječnikom.
- ako planirate zatrudnjeti, trebate razgovarati o liječenju sa svojim liječnikom ili ljekarnikom što je prije moguće prije nego što zatrudnite.
- ako dojite ili planirate dojiti, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Trudnoća

Neurontin se može koristiti tijekom prvog tromjesečja trudnoće ako je potrebno. Ako planirate zatrudnjeti, ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, odmah razgovarajte sa svojim liječnikom.

Ako ste zatrudnjeli i imate epilepsiju, važno je da ne prestanete uzimati lijek bez prethodnog savjetovanja s liječnikom jer to može pogoršati Vašu bolest. Pogoršanje vaše epilepsije može dovesti Vas i Vaše nerođeno dijete u opasnost.

U ispitivanju koje je uključivalo podatke o ženama u nordijskim zemljama koje su uzimale gabapentin tijekom prva 3 mjeseca trudnoće, nije bilo povećanog rizika od urođenih mana ili problema s razvojem funkcije mozga (poremećaji u neurorazvoju). Međutim, bebe žena koje su uzimale gabapentin tijekom trudnoće imale su povećan rizik od niske porođajne težine i prijevremenog poroda.

Ako se primjenjuje tijekom trudnoće, gabapentin može dovesti do simptoma ustezanja u novorođenčadi. Taj se rizik može povećati u slučaju uzimanja gabapentina zajedno s opioidnim analgeticima (lijekovima za liječenje jake boli).

Odmah se obratite liječniku, ako ste zatrudnjeli, mislite da ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti tijekom liječenja ovim lijekom. Ako ustanovite da ste trudni, nemojte naglo prekinuti uzimati Neurontin jer bi to moglo imati ozbiljne posljedice za Vas i za Vaše dijete.

Dojenje

Gabapentin, djelatna tvar Neurontina, izlučuje se u majčino mlijeko. Obzirom da učinak na dojenče nije poznat, ne preporučuje se dojenje djeteta tijekom liječenja ovim lijekom.

Plodnost

Nema učinka na plodnost u ispitivanjima na životinjama.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neurontin može uzrokovati omaglice, pospanost i umor. Nemojte upravljati vozilima, kompleksnim strojevima ili sudjelovati u ostalim potencijalno opasnim aktivnostima, dok ne spoznate utječe li ovaj lijek na Vaše sposobnosti obavljanja tih aktivnosti.

Neurontin sadrži laktuzu.

Neurontin sadrži laktuzu (oblik šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Neurontin sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tvrdoj kapsuli od 300 mg i 400 mg, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Neurontin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnicom ako niste sigurni. Ne uzimajte više lijeka nego što Vam je propisano.
Liječnik će utvrditi koja Vam doza najviše odgovara.

Epilepsija

Odrasli i adolescenti:

Uzmite onoliko tvrdih kapsula koliko Vam je propisano. Liječnik će Vam najčešće postupno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 mg i 900 mg na dan. Potom se doza postupno može povećavati do ukupne dnevne maksimalne doze od 3600 mg koju je potrebno podijeliti u 3 jednake doze, npr. jednom ujutro, jednom poslijepodne te jednom uvečer.

Primjena u djece i adolescenata

Djece u dobi od 6 i više godina:

Liječnik će odrediti dozu koju će uzimati Vaše dijete, na temelju tjelesne težine djeteta. Liječenje se započinje s nižom početnom dozom, koja se potom postupno povećava, u razdoblju od 3 dana. Uobičajena početna dnevna doza za kontrolu epilepsije je 25 - 35 mg po kilogramu tjelesne težine. Obično se uzima svakodnevno u 3 podijeljene doze, obično jednom ujutro, jednom poslijepodne i jednom uvečer.

Neurontin se ne preporučuje u djece mlađe od 6 godina.

Periferna neuropatska bol

Odrasli

Uzmite onoliko tvrdih kapsula koliko Vam je liječnik propisao. Liječnik će Vam najčešće postupno povećavati dozu. Uobičajena početna doza je između 300 mg i 900 mg na dan. Potom se doza postupno može povećavati do ukupne dnevne maksimalne doze od 3600 mg koju je potrebno podjeliti u 3 jednake doze, npr. jednom ujutro, jednom poslijepodne te jednom uvečer.

Ako imate problema s bubrežima ili ste na hemodializiji

Ako imate problema s bubrežima ili ste na hemodializiji Vaš će Vam liječnik propisati drugačiji raspored uzimanja lijeka i/ili dozu.

Ako ste starija osoba (imate više od 65 godina), uzmite uobičajenu dozu Nerontina, osim ako imate problema s bubrežima. Liječnik Vam može propisati drugačiji režim doziranja i/ili dozu ako imate problema s bubrežima.

Ukoliko imate dojam da je učinak Neurontina preslab ili prejak, odmah se savjetujte sa svom liječnikom ili ljekarnikom.

Način primjene

Neurontin se uzima kroz usta. Uvijek progutajte cijelu tvrdnu kapsulu s dosta vode. Nastavite s uzimanjem Neurontina dok Vam liječnik ne kaže suprotno.

Ako uzmete više Neurontina nego što ste trebali

Uzimanje veće doze od preporučene može dovesti do povećanja nuspojava uključujući gubitak svijesti, omaglicu, dvoslike, nerazgovjetan govor, omamljenost i proljev.

Odmah obavijestite svog liječnika ili se uputite do najbliže jedinice hitne pomoći. Budući da gabapentin može uzrokovati omamljenost, preporučljivo je upitati nekoga da Vas odveze ili pozvati hitnu medicinsku pomoć. Ponesite sa sobom preostale tvrde kapsule, kutiju i uputu o lijeku kako bi liječnik mogao lakše utvrditi koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Neurontin

Ako zaboravite uzeti jednu dozu lijeka, uzmite lijek čim se sjetite, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Neurontin

Nemojte naglo prestati uzimati lijek Neurontin. Ako želite prestati uzimati Neurontin, prvo razgovarajte o tome s liječnikom. On će Vam reći kako to učiniti. Ako prekidate liječenje, to mora biti provedeno postupno, tijekom najmanje tjedan dana. Važno je znati da nakon prekida kratkotrajnog ili dugotrajnog liječenja lijekom Neurontin možete doživjeti neke nuspojave, takozvane učinke ustezanja. Ti učinci mogu obuhvaćati epileptičke napadaje, tjeskobu, nesanicu, mučninu, bol, znojenje, drhtanje, glavobolju, depresiju, neuobičajen osjećaj, omaglicu i opće loše osjećanje. Ti se učinci obično pojavljuju unutar 48 sati nakon prestanka uzimanja lijeka Neurontin. Ako primijetite učinke ustezanja, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Neurontin i odmah potražite liječničku pomoć ako primijetite bilo koji od

sljedećih simptoma:

- crvenkaste mrlje na trupu u razini kože, okrugle ili u obliku mete, često s mjehurićem u sredini, ljuštenje kože, ranice u usnoj šupljini, grlu, nosu, na genitalijama ili u očima. Ovim ozbilnjim kožnim osipima može prethoditi vrućica i simptomi nalik gripi (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza).
- prošireni osip, visoka tjelesna temperatura i povećani limfni čvorovi (sindrom DRESS ili sindrom preosjetljivosti na lijek).

Odmah obavijestite svog liječnika, ako primjetite bilo koji od sljedećih simptoma obzirom da mogu biti vrlo ozbiljni:

- neprekidna bol u trbuhi, mučnina ili povraćanje (to bi mogli biti simptomi akutnog pankreatitisa)
- problemi s disanjem, koji ako su ozbiljni, zahtijevaju hitnu i intenzivnu njegu da biste nastavili normalno disati

Neurontin može uzrokovati ozbiljne, po život opasne alergijske reakcije s učinkom na kožu ili druge dijelove tijela, kao što je jetra ili krvne stanice. Ovaj tip reakcije može i ne mora biti popraćen osipom i može zahtijevati hospitalizaciju ili prekid liječenja Nerontinom. **Odmah se javite liječniku ako imate neki od sljedećih simptoma:**

- osip kože i crvenilo i/ili gubitak kose
- koprivnjaču
- vrućicu
- nateknute žljezde (otok koji ne prolazi)
- nateknute usne, lice ili jezik
- žuto obojenje kože ili bjeloočnica
- neuobičajene modrice ili krvarenje
- jaku slabost ili umor
- neočekivanu bol u mišićima
- učestale infekcije

Ovi simptomi mogu biti prvi znaci ozbiljne reakcije. Liječnik će Vas pregledati kako bi odlučio možete li nastaviti uzimati Neurontin.

Ako ste na hemodijalizi, recite svom liječniku ako osjetite bol u mišićima i/ili slabost.

Druge nuspojave uključuju:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- virusne infekcije
- osjećaj izrazite pospanosti, omaglica, nedostatak koordinacije
- osjećaj umora, vrućica

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- upala pluća, infekcija dišnih putova, infekcija mokraćnog trakta, upala uha ili druge infekcije
- smanjen broj bijelih krvnih stanica (leukopenija)
- gubitak apetita (anoreksija), povećan apetit
- ljutnja naspram drugih, smetenost (konfuzija), promjene raspoloženja, depresija, tjeskoba, nervozna, problemi u razmišljanju
- konvulzije, trzanja, poteškoće u govoru, gubitak pamćenja, nevoljno drhtanje, teškoće sa spavanjem uključujući nesanicu, glavobolja, osjetljiva koža, smanjen osjet, problemi s koordinacijom, neuobičajeni pokreti oka, pojačani, smanjeni refleksi ili izostanak refleksa
- zamućen vid, dvostruka slika
- vrtoglavica

- visoki krvni tlak, navale vrućine ili proširenje krvnih žila
- problemi s disanjem, bronhitis, grlobolja, kašalj, hunjavica (rinitis)
- povraćanje, mučnina, problemi sa zubima, upala zubnih desni, proljev, bol u želucu, loša probava, zatvor, suhoća usta ili grla, nadutost (vjetrovi)
- oticanje lica, masnice, osip, svrbež, akne
- bol u zglobovima, bol u mišićima, bol u ledjima, nekontrolirano trzanje
- poteškoće s erekcijom (impotencija)
- oticanje nogu i ruku, poteškoće s hodanjem, opća slabost, bol, osjećaj nelagode, simptomi nalik gripi
- smanjen broj bijelih krvnih zrnaca, povećanje tjelesne težine
- slučajne ozljede, prijelomi, ogrebotine

Dodatno, u kliničkim ispitivanjima u djece, primijećene su česte pojave agresivnog ponašanja i trzajnih pokreta.

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba):

- agitacija (stanje kroničnog nemira i nehotični pokreti bez svrhe)
- alergijska reakcija (poput osipa i urtikarije)
- smanjena pokretljivost
- ubrzani otkucaji srca
- oticanje koje može zahvatiti lice, trup i udove
- promjene nalaza krvi koji ukazuju na bolest jetre
- mentalna oštećenja
- pad
- povišenje razina šećera (glukoze) u krvi (najčešće opaženo u bolesnika sa šećernom bolešću)
- problemi u seksualnoj funkciji (uključujući nemogućnost postizanja orgazma, poremećaje ejakulacije i promjene libida)
- otežano gutanje

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba):

- gubitak svijesti
- sniženje razina šećera (glukoze) u krvi (najčešće opaženo u bolesnika sa šećernom bolešću)
- poteškoće s disanjem, plitko disanje (respiratorna depresija)

Nakon stavljanja Neurontina na tržište prijavljene su sljedeće nuspojave, nepoznate učestalosti (učestalost nije moguće procijeniti na temelju dostupnih podataka):

- smanjen broj trombocita (stanice koje sudjeluju u zgrušavanju krvi)
- halucinacije
- problemi s neuobičajenim pokretima kao što su migoljenje, trzaji i ukočenost
- zvonjava u ušima
- žutica (žuto obojena koža i oči), upala jetre
- akutno zatajenje bubrega, inkontinencija
- povećanje žlezdanog tkiva dojke, povećanje dojke
- nuspojave koje se javljaju naglim prekidom uzimanja gabapentina (tjeskoba, problemi sa spavanjem, mučnina, bol, znojenje), bol u prsimu
- raspadanje mišićnih vlakana (rabdomioliza)
- promjene u rezultatima krvnih pretraga (povišena razina kreatin fosfokinaze)
- snižena razina natrija u krvi
- anafilaksija (ozbiljna, potencijalno po život opasna alergijska reakcija uključujući otežano disanje, oticanje usana, grla i jezika te hipotenziju koji zahtijevaju hitno liječenje)
- suicidalne misli

- razvijanje ovisnosti o lijeku Neurontin („ovisnost o lijeku“)

Važno je znati da nakon prekida kratkotrajnog ili dugotrajnog liječenja lijekom Neurontin možete doživjeti neke nuspojave, takozvane učinke ustezanja (pogledati „Ako prestanete uzimati Neurontin“).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Neurontin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 30 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Neurontin sadrži

Djelatna tvar je gabapentin. Svaka Neurontin tvrda kapsula sadrži 300 mg ili 400 mg gabapentina.

Pomoćne tvari: laktosa hidrat, kukuruzni škrob, talk, želatina, voda i natrijev laurilsulfat.

Neurontin 300 mg tvrde kapsule sadrže titanijev dioksid (E171) i željezov oksid, žuti (E172).

Neurontin 400 mg tvrde kapsule sadrže titanijev dioksid (E171), željezov oksid, žuti (E172) i željezov oksid, crveni (E172).

Tinta na svim tvrdim kapsulama sadrži: šelak, titanijev dioksid (E171), boju indigo karmin aluminij (E132).

Kako Neurontin izgleda i sadržaj pakiranja

Neurontin 300 mg tvrde kapsule su žute tvrde kapsule s oznakama "Neurontin 300 mg" i "VLE".

Neurontin 400 mg tvrde kapsule su narančaste tvrde kapsule s oznakama "Neurontin 400 mg" i "VLE".

Neurontin tvrde kapsule dolaze u sljedećim pakiranjima:

Neurontin 300 mg tvrde kapsule: 50 (5x10) tvrdih kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru

Neurontin 400 mg tvrde kapsule: 50 (5x10) tvrdih kapsula u (PVC/PVDC/Al) blisteru

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvodač

Nositelj odobrenja:

Upjohn EESV

Rivium Westlaan 142

2909LD Capelle aan den IJssel

Nizozemska

Proizvođač:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Mooswaldallee 1
79108 Freiburg Im Breisgau
Njemačka

Medis International a.s., výrobní závod Bolatice
Průmyslová 961/16
747 23 Bolatice
Česka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Viatris Hrvatska d.o.o.
Koranska 2
10000 Zagreb
Tel: +385 1 23 50 599

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2025.