

## Uputa o lijeku

*Molimo Vas pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete koristiti lijek.*

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.
  - Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
  - Ovaj lijek propisan je vama osobno i nemojte ga davati drugim osobama. Može im naškoditi čak i ako su njihovi simptomi isti kao vaši.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.*

### **Moksacin 5 mg/ml kapi za oko, otopina** *moksifloksacinklorid*

Uputa sadrži:

1. Što su Moksacin kapi za oko i za što se koriste
2. Prije nego počnete koristiti Moksacin kapi za oko
3. Kako uzimati Moksacin kapi za oko
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Moksacin kapi za oko
6. Dodatne informacije

#### **1. Što su Moksacin kapi za oko i za što se koriste**

Moksacin kapi za oko sadrže aktivnu tvar moksifloksacin koji pripada skupini antibiotika koji se nazivaju fluorokinolon.

Koristi se u liječenju gnojne, bakterijske upale oka koja je uzrokovana bakterijama osjetljivim na moksifloksacin.

#### **2. Prije nego počnete koristiti Moksacin kapi za oko**

**Nemojte uzimati Moksacin kapi za oko**

- ako ste alergični na moksifloksacin ili na bilo koji sastojak lijeka,
- ako ste alergični na bilo koji kinolonski antibiotik.

**Budite oprezni s primjenom Moksacin kapi za oko i posebno povedite računa o sljedećem stanjima:**

- ako ih koristite dulje od preporučene primjene;
- ako ste imali alergijsku reakciju na antibiotik koji ste uzimali;
- ako koristite druge lijekove koji se primjenjuju u oko, treba paziti da razmak između korištenja dva lijeka bude najmanje 15 min;
- ne preporučuje se nositi leće za vrijeme dok traje liječenje moksifloksacin kapima.

*Potražite savjet liječnika ako se bilo koje gore navedeno upozorenje odnosi na Vas.*

#### **Uzimanje drugih lijekova**

*Kažite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove. Ovo se odnosi i na one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne lijekovite pripravke. Prije nego prestanete uzimati bilo koji od lijekova koje inače uzimate, razgovarajte sa svojim liječnikom.*

S obzirom na primjenu moksifloksacina u oku, ne očekuju se interakcije s drugim lijekovima.

### ***Trudnoća i dojenje***

Lijek se može koristiti za vrijeme trudnoće i dojenja.

### **Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima**

Kao i kod ostalih kapi za oči, prolazno zamagljen vid i drugi poremećaji vida mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Ako se zamagljen vid javi za vrijeme ukapavanja, s vožnjom i radom na strojevima treba pričekati dok vidno polje ne postane u potpunosti jasno.

### **3. Kako uzimati Moksacin kapi za oko**

*Sljedite navedene upute, osim ako vam liječnik nije dao druge upute.*

*Liječnik će vas uputiti kako i koliko dugo trebate uzimati Moksacin.*

Preporučena je doza ukapati 1 kap u oboljelo oko, 3 puta na dan.

Poboljšanje se očekuje unutar 5 dana od početka liječenja, a liječenje se nastavlja sljedeća 2-3 dana. Ako se unutar 5 dana stanje ne poboljša ili ako se početno stanje pogorša obavezno se javite svom liječniku.

Sljedeći postupci pomoći će Vam pri ukapavanju kapi u oko, kako bi ukapana količina lijeka bila učinkovita te se smanjila sistemna apsorpcija lijeka.

- operite ruke
- ako nosite - izvadite kontaktne leće (preporučuje se da ih ne nosite dok traje liječenje),
- nakon otvaranja bočice, kapnite 1 kap u oboljelo oko,
- izbjegavajte dodir kapaljke s kopcima, okolnom kožom ili bilo kojom površinom, kako se ne bi infekcija prenijela kapima na bočicu te ondje stvarala novi izvor zaraze,
- legnite ili zabacite glavu unatrag,
- donju vjeđu odmaknite od oka pomoću smotuljka vate i ukapajte 1 kap,
- zatvorite oko na 2 minute,
- lagano stisnite jamicu između očnog kuta i nosa na 1-2 minute.

Ako Vam je liječnik propisao da kapate i u drugo oko ponovite isti postupak.

### ***Djeca i adolescenti***

Moksacin kapi za oko ne mora se posebno prilagođavati ovim dobnim skupinama.

### **Ako uzmete više Moksacina nego biste trebali**

Po potrebi isperite oko mlakom vodom. Prekinite primjenu i potražite savjet liječnika.

### **Ako zaboravite koristiti Moksacin kapi za oko**

Ukapajte jednu dozu čim se sjetite, ako je vrijeme za novu dozu blizu, preskočite propuštenu i nastavite s uobičajenim režimom primjene.

Ne koristite dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu.

### **Ako prestanete uzimati Moksacin kapi za oko prerano**

Preranim prekidom liječenja možete ugroziti tijek liječenja infekcije tj. infekcija može ostati neizliječena, a bakterija može postati otporna na antibiotik koji koristite.

*U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom kada prestati koristiti Moksacin kapi za oko.*

#### **4. Moguće nuspojave**

*Kao i svi ostali lijekovi i **Moksacin** može dovesti do nuspojave, iako ih ne dobiju svi. Ukoliko se neka od sljedećih nuspojave dogodi, prestanite uzimati **Moksacin** i kontaktirajte svog liječnika ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu jer možda trebate hitnu liječničku pomoć.*

##### ***Odmah javite svom liječniku pojavu***

- suhoće grla, temperature, zimice ili pojave nekog drugog simptoma infekcije
- boli ili osjećaj punoće u uhu
- osipa
- koprivnjače
- otežanog disanja ili gutanja
- oteklinu lica, grla, jezika, usana, kapaka oka, ruku, prstiju, zglobova ili donjeg dijela potkoljenica.

##### ***Ostale nuspojave kada se treba javiti liječniku su pojava***

- crvenila, iritacije, bockanja ili suženja oka
- zamagljen vid
- bol u oku
- suhoće oka
- krvarenje u oku
- sekrecije iz nosa, nelagoda u nosu
- kašalj, glavobolja, povraćanje, mučnina
- poremećaj osjeta okusa
- osjećaj stranog tijela u grlu.

*Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.*

#### **5. Kako čuvati Moksacin kapi za oko**

Moksacin kapi za oko morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek je potrebno čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti otopine je 28 dana, uz čuvanje na temperature ispod 25 °C.

Moksacin kapi za oko se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti, navedenog na pakovanju.

#### **6. Dodatne informacije**

Što Moksacin kapi za oko sadrže

1 ml otopine sadrži 5 mg moksifloksacina u obliku moksifloksacinklorida.

Pomoćne tvari: natrijev klorid; boratna kiselina; natrijev hidroksid; voda, pročišćena.

Kako Moksacin kapi za oko izgledaju i sadržaj pakovanja

Bistra, žuto-zelena otopina.

5 ml otopine u LDPE bočici, s LDPE umetkom za kapanje i HDPE zatvaračem, u kutiji.

#### **Ime i adresa proizvođača lijeka**

JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Hrvatska

#### **Ime i adresa nositelja odobrenja**

BONIFARM d.o.o., Hondlova 2/10, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**  
Na recept, u ljekarni.

**Datum zadnje revizije upute**  
Listopad, 2014.