

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopina za injekcije

litijev klorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Litijev klorid i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Litijev klorid?
3. Kako primjenjivati Litijev klorid ?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Litijev klorid?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Litijev klorid i za što se koristi?

Ovaj se lijek koristi samo u dijagnostičke svrhe.

Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopina za injekcije bezbojna je otopina litijevog klorida u sterilnoj vodi za injekcije. Litijev klorid je u vrlo malim količinama prisutan u vodi koju pijemo i u ljudskom tijelu.

Za što se koristi?

- Injekcije se koriste uz „LiDCO System“ aparat za praćenje rada srca, u dijagnostičke svrhe, a primjenjuju ih liječnici ili medicinske sestre u bolnici.
- Sistem mjeri količinu krvi koju srce pumpa u minuti (srčani učinak). Saznanje o tome daje liječnicima više podataka potrebnih za popravljivanje krvnog optoka i rada srca.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Litijev klorid?

Nemojte primjenjivati Litijev klorid

- ako ste alergični na litijev klorid, lijekove koji sadrže litij ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- Ukoliko za liječenje određenih psihičkih bolesti koristite lijekove koji sadrže litij.
- Ukoliko je vaša tjelesna težina manja od 40 kg.
- Ukoliko ste u prva tri mjeseca trudnoće.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Litijev klorid:

- Ukoliko koristite lijekove za relaksaciju mišića. Oni mogu interferirati s rezultatima dobivenim LiDCO sustavom.

Djeca

Lijek se ne smije koristiti kod osoba ispod 40 kg tjelesne težine.

Drugi lijekovi i Litijev klorid

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koji se mogu dobiti bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ovaj lijek se ne smije koristiti tijekom prva tri mjeseca trudnoće jer može uzrokovati srčane anomalije u Vašeg djeteta.

Smijete dobiti nakon primjene ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o mogućim negativnim učincima na upravljanje vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati Litijev klorid?

Ovaj lijek se može primjenjivati samo uz LiDCO sustav. Lijek će vam primijeniti liječnik ili medicinska sestra injekcijom u venu kroz centralni venski kateter. Lijek smije primjenjivati jedino zdravstveno osoblje koje je educirano za primjenu lijekova u krvne žile.

Doziranje

Uobičajena doza: 0,5 – 2,0 ml otopine.

Maksimalna pojedinačna doza: 2,0 ml otopine

Maksimalna ukupna doza: 20 ml otopine.

Ponekad je za postizanje sigurnog rezultata potrebno više od jedne doze Litij klorid 0,15 mmol/ml otopine za injekciju. U takvim je slučajevima između pojedinih doza potreban razmak od najmanje 5 minuta.

Ako primijenite više Litijevog klorida nego što ste trebali

S obzirom da ove injekcije može primjenjivati samo educirano zdravstveno osoblje malo je vjerojatna mogućnost predoziranja.

Međutim, ukoliko se pojavi bilo koji znak prekomjerne količine litijevog klorida, treba se prekinuti primjena injekcija.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopinu za injekcije?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, odnosno bočici.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite vidljivo oštećenje otopine.

Svaka neiskorištena količina mora biti uklonjena.

Otopina koja je u štrcaljki pripremljena za primjenu može se koristiti unutar tri sata, nakon toga mora se odbaciti.

Radi zaštite okoliša nikada nemojte lijekove bacati u otpadne vode.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Litijev klorid 0,15 mmol/ml otopina za injekcije?

Djelatna tvar je : litijev klorid

1 ml otopine sadrži 6,36 mg litijevog klorida, što odgovara 0,15 mmola.

Drugi sastojak : pomoćna tvar je voda za injekcije.

Kako Litijev klorid 0,15 mmol/ml izgleda i sadržaj pakiranja?

Bistra otopina za injekcije u staklenim ampulama. Svaka ampula sadrži 10 ml otopine.

Kartonska kutija sadrži 5 ampula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Markomed d.o.o.

Trg Braće Radića 3

21 000 SPLIT

Proizvođač:

Torbay and South Devon NHS Foundation Trust

Torbay Pharmaceuticals, Wilkins Drive, Paignton, TQ4 7FG

Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2018.