

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Panatus 4 mg/5 ml sirup butamiratcitrat

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Panatus i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus
3. Kako uzimati Panatus
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panatus
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Panatus i za što se koristi

Panatus sirup je lijek za simptomatsko liječenje, odnosno ublažavanje nadražajnog suhog kašlja (antitusik s centralnim djelovanjem) koji nastaje uslijed bilo kojeg uzroka.

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu u djece starije od 6 mjeseci, adolescenata, odraslih i starijih osoba.

Sprječava suh i nadražajni kašalj, smanjuje napetost bronhijalnih mišića te olakšava disanje i bolove u prsima. Sve to povoljno utječe na poboljšanje kapaciteta disanja i koncentracije plinova u krvi. Kemijski i po farmakološkim učincima Panatus se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus

##### Nemojte uzimati Panatus

- ako ste alergični na butamiratcitrat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Panatus.

Budite posebno oprezni s Panatusom:

- ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre.

##### Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost lijeka Panatus sirup u djece mlađe od 6 mjeseci još nisu dovoljno istraženi, stoga djeci te dobi lijek ne dajemo.

##### Drugi lijekovi i Panatus

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Panatus sirup nije pokazao nikakve interakcije niti utjecaj na druge lijekove.

Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu s ekspektoransima (lijekovi za olakšavanje iskašljavanja kod produktivnog kašlja), jer mogu uzrokovati zadržavanje sluzi u dišnom sustavu i time povećati rizik od otežavanja prohodnosti i infekcija dišnih puteva.

### **Panatus s hranom, pićem i alkoholom**

Tijekom liječenja Panatusom nemojte piti alkoholna pića.

Panatus sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Panatus sirupa, odmah zatražite savjet liječnika.

Iako ne postoje podaci o negativnim učincima, ne preporuča se uzimanje Panatus sirupa tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom kasnijih mjeseci trudnoće lijek se smije uzimati samo u onim slučajevima kada nema druge mogućnosti liječenja o čemu će odlučiti Vaš liječnik.

Ne postoje odgovarajući podaci o prolazu lijeka u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje uzimanje lijeka tijekom dojenja.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nije poznato da lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

### **Panatus sadrži sorbitol (E420), natrijev benzoat (E211), natrij i etanol**

Ovaj lijek sadrži 1225 mg sorbitola u 5 ml sirupa (1 žličica). Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek. Sorbitol može uzrokovati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak.

Ovaj lijek sadrži 5 mg natrijevog benzoata u 5 ml sirupa (1 žličica).

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

Ovaj lijek sadrži 3,03 mg alkohola (etanola) u 5 ml sirupa (1 žličica). Količina alkohola u 5 ml sirupa (1 žličica) ovog lijeka odgovara količini koja se nalazi u manje od 0,076 ml piva ili 0,03 ml vina. Mala količina alkohola prisutna u ovom lijeku neće imati nikakav zamjetan učinak.

## **3. Kako uzimati Panatus**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Panatus sirup je namijenjen za liječenje simptoma suhog kašlja u odraslih i djece starije od 6 mjeseci.

Preporučene doze Panatusa prikazane su u tablici:

<b>Dob</b>	<b>Doziranje</b>	<b>Učestalost uzimanja</b>
odrasli (i starije osobe)	6 žličica	tri do četiri puta na dan s razmakom od 6 do 8 sati
djeca i adolescenti stariji od 9 godina	3 žličice	četiri puta na dan s razmakom od 6 sati
djeca u dobi od 6 do 9 godina	3 žličice	triput na dan s razmakom od 8 sati
djeca u dobi od 3 do 6 godina	2 žličice	triput na dan s razmakom od 8 sati
djeca u dobi od 1 do 3 godine	1 žličica	triput na dan s razmakom od 8 sati
djeca u dobi od 6 mjeseci do 1 godine	½ žličice*	četiri puta na dan s razmakom od 6 sati

1 žličica = 5 ml sirupa = 4 mg butamiracitrata

\*Na odmjernoj žličici je označeno crtom i naljepnicom „1/2=2,5 ml“.

#### *Oštećenje funkcije bubrega i/ili oštećenje funkcije jetre*

Ako imate problema s bubrezima ili jetrom, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom jer postoji veća vjerojatnost nastanka nuspojava.

#### *Stariji bolesnici*

Ne postoje preporuke za prilagodbu doze u starijih bolesnika. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate oštećenje funkcije bubrega povezane s dobi.

#### Način primjene

Kroz usta.

Lijek uzimajte (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme.

Panatus sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela. Sirup dozirajte priloženom žličicom, progutajte i isplahnite tekućinom. Mjerna žličica opremljena je crtama koje označavaju volumene od 2,5 ml i 5 ml kako bi se omogućilo ispravno doziranje.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

#### **Ako uzmete više Panatusa nego što ste trebali**

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Prevelike doze Panatus sirupa mogu prouzrokovati pospanost, povraćanje, neusklađenost pokreta (ataksiju), bolove u trbuhu, proljev, uzbuđenost i sniženi krvni tlak. Specifični antidot ne postoji, a liječenje se provodi simptomatski.

Nemate li mogućnost posjetiti liječnika, pokušajte izazvati povraćanje kako biste spriječili prelaženje lijeka u krv.

#### **Ako ste zaboravili uzeti Panatus**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus sirup pa se sjetite u roku od nekoliko sati, uzmite lijek odmah, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. No, ako se već bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i jednostavno uzmite sljedeću pojedinačnu dozu u predviđeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih blagih nuspojava:

- urtikarija,
- probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev),
- vrtoglavica, pospanost.

Nisu utvrđene nuspojave na vitalne funkcije i rad drugih organa niti pri dugotrajnom uzimanju Panatus sirupa. Posebna je prednost lijeka što nisu zapažene nuspojave koje su karakteristične za opioidne antitusike.

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljuvanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Panatus**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 3 mjeseca uz čuvanje na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Panatus sadrži**

- Djelatna tvar je butamiracitrat.  
5 ml sirupa (1 žličica) sadrži 4 mg butamiracitrata.
- Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: limunska kiselina hidrat, tekući sorbitol, glicerol, saharinnatrij (E954), natrijev benzoat (E211), aroma limuna (etanol), natrijev hidroksid i pročišćena voda. Vidjeti dio 2. „Panatus sadrži sorbitol (E420), natrijev benzoat (E211), natrij i etanol“.

### **Kako Panatus izgleda i sadržaj pakiranja**

Bistri, bezbojni do blago žuti sirup s okusom limuna.

Panatus je dostupan u boci po 200 ml sirupa, u kutiji. Priložena je i odmjerna žličica.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

### **Proizvođač**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je posljednji put revidirana 18. svibnja 2020.**