

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Panatus akut 4 mg/5 ml sirup

butamiratcitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Panatus akut i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus akut
3. Kako uzimati Panatus akut
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panatus akut
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Panatus akut i za što se koristi

Panatus akut sadrži djelatnu tvar butamiratcitrat, koja pripada skupini lijekova za liječenje kašlja koji se zovu antitusici. Sprječava suh i nadražajni kašalj djelujući na centar za kašalj u mozgu te smanjuje napetost bronhijalnih mišića.

Panatus akut sirup se koristi za kratkotrajno ublažavanje simptoma nadražajnog suhog kašlja. Ovaj lijek je namijenjen za primjenu u djece starije od 1 godine, adolescenata i odraslih.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus akut

Nemojte uzimati Panatus akut

- ako ste alergični na butamiratcitrat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Panatus akut.

Budite posebno oprezni s lijekom Panatus akut:

- ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre
- ako ste trudni (vidjeti dio Trudnoća i dojenje).

Djeca i adolescenti

Panatus akut sirup nije namijenjen za primjenu u djece mlađe od 1 godine.

Drugi lijekovi i Panatus akut

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu s ekspektoransima (lijekovi za olakšavanje iskašljavanja kod produktivnog kašlja), jer mogu uzrokovati zadržavanje sluzi u dišnom sustavu i time povećati

HALMED
19 - 05 - 2025
ODOBRENO

rizik od stezanja i infekcija dišnih puteva.

Panatus akut s hranom, pićem i alkoholom

Tijekom liječenja lijekom Panatus akut nemojte piti alkoholna pića.

Panatus akut sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Panatus akut sirupa, odmah zatražite savjet liječnika.

Iako ne postoje podaci o negativnim učincima, ne preporuča se uzimanje Panatus akut sirupa tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom kasnijih mjeseci trudnoće lijek se smije uzimati samo u onim slučajevima kada nema druge mogućnosti liječenja, o čemu će odlučiti Vaš liječnik.

Ne postoje odgovarajući podaci o prolazu lijeka u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje uzimanje lijeka tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Panatus akut sirup u rijetkim slučajevima u nekih ljudi može izazvati izrazitu pospanost i vrtoglavicu.

U tom slučaju morate biti oprezni prilikom upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Panatus akut sadrži sorbitol (E420), natrijev benzoat (E211), natrij i etanol

Ovaj lijek sadrži 1225 mg sorbitola u 5 ml sirupa (1 žličica). Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek. Sorbitol može uzrokovati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak.

Ovaj lijek sadrži 5 mg natrijevog benzoata u 5 ml sirupa (1 žličica).

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

Ovaj lijek sadrži 3,03 mg alkohola (etanola) u 5 ml sirupa (1 žličica). Količina alkohola u 5 ml sirupa (1 žličica) ovog lijeka odgovara količini koja se nalazi u manje od 0,076 ml piva ili 0,03 ml vina. Mala količina alkohola prisutna u ovom lijeku neće imati nikakav zamjetan učinak.

3. Kako uzimati Panatus akut

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučene doze lijeka Panatus akut prikazane su u tablici:

Dob	Preporučena doza i učestalost uzimanja
odrasli	6 žličica (30 ml) 3 puta na dan
djeca i adolescenti stariji od 9 godina	3 žličice (15 ml) 4 puta na dan
djeca u dobi od 6 do 9 godina	3 žličice (15 ml) 3 puta na dan
djeca u dobi od 3 do 6 godina	2 žličice (10 ml) 3 puta na dan
djeca u dobi od 1 do 3 godine	1 žličica (5 ml) 3 puta na dan

1 žličica (5 ml sirupa) sadrži 4 mg butamiracitrata.

Razmak između doza je 8 sati ako se lijek uzima 3 puta na dan, odnosno 6 sati ako se lijek uzima 4 puta na dan.

Upotrijebite najmanju dozu koja Vam je dovoljna za liječenje simptoma, a lijek koristite kroz najkraće potrebno vrijeme.

Trajanje liječenja

Panatus akut se ne smije uzimati dulje od 3 dana u djece mlađe od 12 godina, odnosno dulje od 5 dana u odraslih i djece starije od 12 godina bez savjetovanja s liječnikom.

Oštećenje funkcije bubrega i/ili oštećenje funkcije jetre

Ako imate problema s bubrezima ili jetrom, ovaj lijek se smije uzimati uz prethodno savjetovanje s liječnikom jer postoji veća vjerojatnost nastanka nuspojava.

Stariji bolesnici

Ne postoje preporuke za prilagodbu doze u starijih bolesnika. Obratite se liječniku prije uzimanja lijeka ako imate oštećenje funkcije bubrega povezane s dobi.

Način primjene

Kroz usta.

Panatus akut sirup uzimajte (ili ga dajte djeci) prije jela ili poslije jela. Sirup dozirajte priloženom žličicom.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Ako uzmete više lijeka Panatus akut nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što ste smjeli, odmah obavijestite liječnika.

Prevelike doze Panatus akut sirupa mogu prouzrokovati omamljenost, povraćanje, nedostatak koordinacije pokreta, bolove u trbuhu, kožni osip, proljev, uznemirenost i sniženi krvni tlak.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus akut

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus akut sirup pa se sjetite u roku od nekoliko sati, uzmite lijek odmah, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. No, ako se već bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i jednostavno uzmite sljedeću pojedinačnu dozu u predviđeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih nuspojava:

- urtikarija (koprivnjača),
- probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev),
- vrtoglavica, izrazita pospanost.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V.**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Panatus akut

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.
Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja: 3 mjeseca uz čuvanje na temperaturi ispod 25°C, u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Panatus akut sadrži

- Djelatna tvar je butamiracitrat.
5 ml sirupa (1 žličica) sadrži 4 mg butamiracitrata.
- Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: limunska kiselina hidrat, tekući sorbitol, glicerol, saharinnatrij (E954), natrijev benzoat (E211), aroma limuna (etanol), natrijev hidroksid i pročišćena voda. Vidjeti dio 2. „Panatus akut sadrži sorbitol (E420), natrijev benzoat (E211), natrij i etanol“.

Kako Panatus akut izgleda i sadržaj pakiranja

Bistri, bezbojni do blago žuti sirup s okusom limuna.

Panatus akut je dostupan u boci po 200 ml sirupa, u kutiji. Priložena je i odmjerna žličica.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u svibnju 2025.