

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Penon 800 mg filmom obložene tablete Penon 1000 mg filmom obložene tablete

fenoksimetilpenicilin

#### **Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Penon i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Penon
3. Kako uzimati Penon
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Penon
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Penon i za što se koristi**

Djelatna tvar lijeka Penon je fenoksimetilpenicilin. To je penicilin (antibakterijski lijek, antibiotik) koji sprječava formiranje stanične stijenke bakterija. Bez stanične stijenke bakterija brzo umire.

Penon se koristi u liječenju tonzilitisa (upala krajnika), infekcije zubi, pneumonije (upala pluća), sinusitisa (upala sluznice sinusa), infekcija uha te bakterijskih infekcija kože i potkožnog tkiva (poput upale vezivnog tkiva, infekcije bakterijom roda *Borrelia*).

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Penon**

##### **Nemojte uzimati Penon**

- ako ste alergični na peniciline ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

##### **Upozorenje i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Penon.

- Ako ste alergični na cefalosporine (druga skupina antibakterijskih lijekova), obratite se svom liječniku prije nego uzmete lijek Penon.
- Ako ubrzano razvijete osip, vrućicu i/ili oticanje lica, liječenje treba prekinuti i obratiti se liječniku.

##### **Drugi lijekovi i Penon**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Penon može stupiti u interakciju s drugim lijekovima i to:

- određenim lijekovima za liječenje karcinoma i poremećaja imunološkog sustava (metotreksat)
- lijekovima za giht (probenecid).

##### **Penon s hranom i pićem**

Penon ima najbolji učinak kada se uzima na prazan želudac ili barem 1 sat prije ili 2 sata nakon obroka.

##### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema poznatih rizika od uporabe fenoksimetilpenicilina tijekom trudnoće. Fenoksimetilpenicilin se izlučuje u majčino mlijeko, ali nije vjerojatno da će imati utjecaja na dojenče.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nije poznato da Penon ima utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

### **Penon filmom obložene tablete sadrže kalij**

Ovaj lijek sadrži 2,18 mmol (80,51 mg) kalija u jednoj tableti od 800 mg odnosno 2,58 mmol (100,62 mg) kalija u jednoj tableti od 1000 mg. O tome treba voditi računa u bolesnika sa smanjenom funkcijom bubrega ili bolesnika na prehrani s ograničenjem unosa kalija.

## **3. Kako uzimati Penon**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Dozu određuje liječnik koji će je individualno prilagoditi za vas. Doza ovisi o vrsti infekcije i tjelesnoj težini.

Urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tableta radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

Pedijatrijska populacija

Penon je indiciran za liječenje djece starije od 12 godina. Postoje druge doze i oblici fenoksimetilpenicilina za djecu mlađu od 12 godina/tjelesne težine ispod 40 kg.

### **Ako ste uzeli više Penon tableta nego što ste trebali**

Ako uzmete previše lijeka ili primjerice ako je dijete slučajno progutalo lijek, obratite se liječniku, nazovite bolnicu ili Centar za kontrolu otrovanja, za procjenu rizika i savjet.

### **Ako ste zaboravili uzeti Penon**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

### **Ako prestanete uzimati Penon**

*Važno je da dovršite svoje liječenje čak i ako se nakon nekoliko dana budete osjećali bolje. Ako prekinete uzimati lijek postoji opasnost od preživljavanja jednog dijela bakterija, njihovog rasta te ponovne pojave infekcije.*

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

*Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 bolesnika):*

Nelagoda u trbuhu praćena mučninom i mekanom stolicom te osip.

*Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika):*

Reakcija preosjetljivosti s vrućicom i/ili bolovima u zglobovima. Koprivnjača, povećanje broja jedne vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija).

*Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 bolesnika):*

Teške alergijske reakcije (anafilaktička reakcija).

*Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 000 bolesnika):*

Svrbež.

Ako imate produljeni ili teški proljev, obratite se liječniku. Svrbež u genitalnom području može biti

uzrokovan prekomjernim rastom gljivica.

#### Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V\\*](#) Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

### **5. Kako čuvati Penon**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

### **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

#### **Što Penon sadrži**

- Djelatna tvar je fenoksimetilpenicilinkalij. Jedna tableta sadrži 800 mg ili 1000 mg fenoksimetilpenicilina u obliku fenoksimetilpenicilinkalija.
- Pomoćne tvari su:  
*Jezgra tablete:* povidon, magnezijev stearat.  
*Ovojnica tablete:* hipromeloza, titanijev dioksid E171, Makrogol 400.

#### **Kako Penon izgleda i sadržaj pakiranja**

Penon 800 mg su bijele do gotovo bijele, filmom obložene tablete u obliku kapsule s urezom i utisnutom oznakom P/0.8 na istoj strani.

- 30 filmom obloženih tableta u Alu-OPA/Alu/PVC blisteru, u kutiji

Penon 1000 mg su bijele do gotovo bijele, filmom obložene tablete u obliku kapsule s r urezom i utisnutom oznakom P/1.0 na istoj strani.

- 30 filmom obloženih tableta u Alu-OPA/Alu/PVC blisteru, u kutiji

#### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

##### Nositelj odobrenja:

Alpha-Medical d.o.o.  
Dragutina Golika 36  
10 000 Zagreb

##### Proizvođač:

Remedica Ltd  
Aharnon Str., Limassol Industrial Estate,  
3056 Limassol, Cipar.

#### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2023.**