Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Pinorcor 4 mg/1,25 mg filmom obložene tablete

perindopril-*tert*-butilamin/indapamid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Pinorcor 4 mg/1,25 mg i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg
3. Kako uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pinorcor 4 mg/1,25 mg
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pinorcor 4 mg/1,25 mg i za što se koristi

Pinorcor 4 mg/1,25 mg je kombinacija dviju djelatnih tvari, perindoprila i indapamida. On je antihipertenziv i koristi se za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije) u odraslih.

Perindopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima konvertaze angiotenzina (ACE-inhibitori). Oni proširuju krvne žile, što olakšava Vašem srcu da pumpa krv kroz njih. Indapamid je diuretik. Diuretici povećavaju količinu mokraće koju proizvode bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika jer uzrokuje samo malo povećanje količine proizvedene mokraće. Svaka od djelatnih tvari snižava krvni tlak, a zajedno kontroliraju Vaš krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg

Nemojte uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg
- ako ste alergični na perindopril ili bilo koji drugi ACE inhibitor, na indapamid ili bilo koji drugi sulfonamid, ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
- ako ste imali simptome poput piskanja pri disanju, oticanja lica ili jezika, intenzivan svrbež ili jak kožni osip s prethodnim liječenjem ACE inhibitorima ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se naziva angioedem),
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren,
- ako imate tešku bolest jetre ili bolujete od stanja nazvanog hepatična encefalopatija (degenerativna bolest mozga),
- ako imate ozbiljnu bolest bubrega kada je smanjena njihova opskrba krvlju (stenoza bubrežne arterije),
- ako primate dijalizu ili bilo kakvu drugu vrstu filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi, Pinorcor možda nije prikladan za Vas.

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

- ako imate nisku razinu kalija u krvi,
- ako postoji sumnja da imate neliječeno dekompenzirano zatajenje srca (jako zadržavanje vode, otežano disanje),
- ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati Pinorcor 4 mg/1,25 mg u ranoj trudnoći - vidjeti dio „Trudnoća"),
- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, lijek koji se koristi u liječenju zatajenja srca jer je povećan rizik za nastanak angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat) (vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza" i „Drugi lijekovi i Pinorcor 4 mg/1,25 mg").

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Pinorcor 4 mg/1,25 mg:
- ako imate stenozu aorte (suženje velike krvne žile koja izlazi iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja opskrbljuje bubreg s krvlju),
- ako imate zatajenje srca ili bilo kakvih drugih poteškoća sa srcem,
- ako imate probleme s bubrezima ili ako idete na dijalizu,
- ako primijetite slabljenje vida ili osjetite bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja tlaka u oku, a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedana nakon uzimanja lijeka Pinorcor 4 mg/1,25 mg. To može dovesti do trajnog gubitka vida, ako se ne liječi. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, možete biti pod većim rizikom da se to razvije,
- ako imate poremećaje mišića, uključujući bolove u mišićima, osjetljivost, slabost ili grčeve,
- ako imate povišenu razinu hormona aldosterona u krvi (primarni aldosteronizam),
- ako imate probleme s jetrom,
- ako imate bolest kolagena (kožnu bolest) kao što je sistemski lupus eritematozus ili sklerodermiju,
- ako imate aterosklerozu (otvrdnjavanje arterija),
- ako bolujete od hiperparatireoidizma (previše aktivne paratireoidne žlijezde),
- ako bolujete od gihta,
- ako imate šećernu bolest (dijabetes),
- ako ste na dijeti koja ograničava unos soli ili koristite nadomjestke soli koji sadrže kalij,
- ako uzimate litij ili lijekove koji štede kalij (npr. spironolakton ili triamteren) ili dodatke kalija budući da se njihova primjena s lijekom Pinorcor 4 mg/1,25 mg treba izbjegavati (vidjeti „Drugi lijekovi i Pinorcor 4 mg/1,25 mg"),
- ako ste stariji,
- ako imate reakcije fotoosjetljivosti,
- ako imate teške alergijske reakcije s oticanjem lica, usana, usta, jezika ili grla što može imati za posljedicu otežano gutanje ili disanje (angioedem). Ovo se može javiti bilo kada tijekom liječenja. Ako Vam se razviju takvi simptomi, treba odmah prekinuti s uzimanjem lijeka i odmah se javiti svom liječniku,
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
  - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću,
  - aliskiren.
    Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.
    Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg".
- ako ste pripadnik crne rase, možete imati veći rizik za nastanak angioedema i ovaj lijek može biti manje učinkovit u smanjenju Vašeg krvnog tlaka nego u pripadnika drugih rasa,
- ako idete na hemodijalizu koja koristi visokopropusne membrane,

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

- ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova, povećan je rizik za nastanak angioedema:
  - racekadotril (primjenjuje se za liječenje proljeva),
  - sirolimus, everolimus, temsirolimus i ostale lijekove koji pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori mTOR-a (primjenjuju se za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka),
  - sakubitril (dostupan u fiksnoj kombinaciji s valsartanom), koji se koristi za liječenje dugotrajnog zatajenja srca,
  - linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin i druge lijekove koji pripadaju skupini koja se naziva gliptini (za liječenje dijabetesa).

Morate obavijestiti svojeg liječnika ako mislite da jeste ili da biste mogli biti trudni. Pinorcor 4 mg/1,25 mg se ne preporučuje koristiti u ranoj trudnoći, a ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno naštetiti Vašem djetetu ako se koristi u ovom stadiju (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje").

Ako uzimate Pinorcor 4 mg/1,25 mg, trebate također obavijestiti o tome svojeg liječnika ili medicinsko osoblje:
- ako ćete biti podvrgnuti anesteziji i/ili operativnom zahvatu,
- ako ste nedavno imali proljev ili povraćali, ili ste dehidrirali,
- ako ćete biti podvrgnuti dijalizi ili LDL aferezi (uklanjanje kolesterola iz Vaše krvi pomoću uređaja),
- ako ćete biti desenzibilizirani kako bi smanjili učinke alergije na ubode pčela i osa,
- ako idete na medicinsko testiranje koje zahtijeva primjenu injekcije jodiranog kontrastnog sredstva (tvar koja omogućava da organi poput bubrega ili želuca budu vidljivi na rendgenu),
- ako Vam se tijekom primjene lijeka Pinorcor jave promjene u vidu ili bol u jednom ili oba oka. Ovo može biti znak da Vam se razvija glaukom, povećanje očnog tlaka. Potrebno je prekinuti liječenje lijekom Pinorcor i zatražiti liječničku pomoć.

Sportaši trebaju znati da Pinorcor 4 mg/1,25 mg sadrži djelatnu tvar (indapamid) koja može dati pozitivnu reakciju prilikom testiranja na doping.

Djeca i adolescenti
Pinorcor 4 mg/1,25 mg se ne smije davati djeci i adolescentima.

Drugi lijekovi i Pinorcor 4 mg/1,25 mg
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trebate izbjegavati uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg s:
- litijem (koristi se u liječenju manije ili depresije),
- aliskirenom (koristi se u liječenju visokog krvnog tlaka) čak i ako ne bolujete od dijabetesa ili nemate poteškoće s bubrezima,
- diureticima koji štede kalij (npr. triamteren, amilorid), solima koje sadržavaju kalij, kao i drugim lijekovima koji mogu povisiti razinu kalija u Vašem tijelu (poput heparina, lijeka koji se upotrebljava za razrjeđivanje krvi; trimetoprima i kotrimoksazola, poznat još kao i trimetoprim/sulfametoksazol za liječenje infekcije uzrokovane bakterijama),
- estramustinom (koji se koristi u liječenju raka),
- drugim lijekovima koji se koriste u liječenju visokog krvnog tlaka (inhibitori konvertaze angiotenzina i blokatori angiotenzinskih receptora).

Na liječenje lijekom Pinorcor 4 mg/1,25 mg mogu utjecati drugi lijekovi. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza. Obavezno obavijestite svojeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, budući da može zahtijevati posebnu pažnju:

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

- druge lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka uključujući blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg" i „Budite posebno oprezni s Pinorcor 4 mg/1,25 mg") ili diuretike (lijekovi koji povećavaju količinu mokraće koju proizvode bubrezi),
- lijekove koji štede kalij, a koji se koriste u liječenju zatajenja srca: eplerenon i spironolakton pri dozama između 12,5 mg i 50 mg na dan,
- lijekove koji se često primjenjuju u liječenju proljeva (racekadotril) ili za sprječavanje odbacivanja presađenih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lijekovi koji pripadaju skupini koja se naziva inhibitori mTOR-a). Vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza",
- sakubitril/valsartan (primjenjuje se u liječenju dugotrajnog zatajenja srca). Vidjeti dijelove „Nemojte uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg" i „Upozorenja i mjere opreza",
- anestetike,
- jodirana kontrastna sredstva,
- antibiotike koji se koriste u liječenju bakterijskih infekcija (npr. moksifloksacin, sparfloksacin, eritromicin u obliku injekcija),
- metadon (koji se koristi u liječenju ovisnosti),
- prokainamid (za liječenje nepravilnih otkucaja srca),
- alopurinol (za liječenje gihta),
- antihistaminike koji se koriste u liječenju alergijskih reakcija poput peludne groznice (npr. mizolastin, terfenadin, astemizol),
- kortikosteroide koji se koriste u liječenju različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni artritis,
- imunosupresive koji se koriste u liječenju autoimunih bolesti ili nakon transplantacije kako bi se spriječilo odbacivanje organa (npr. ciklosporin, takrolimus),
- lijekove koji se koriste za liječenje raka,
- halofantrin (koji se koristi u liječenju određenih oblika malarije),
- pentamidin (koristi se u liječenju upale pluća),
- injektibilno zlato (koristi se za liječenje reumatoidnog poliartritisa),
- vinkamin (koristi se u liječenju kognitivnih poremećaja u starijih ljudi uključujući gubitak pamćenja),
- bepridil (koristi se za liječenje angine pektoris),
- lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis, bretilij),
- cisaprid, difemanil (koristi se za liječenje želučanih i probavnih smetnji),
- digoksin ili druge srčane glikozide (za liječenje srčanih tegoba),
- baklofen (za liječenje krutosti mišića koja se pojavljuje kod bolesti poput multiple skleroze),
- lijekove za liječenje dijabetesa poput inzulina, metformina ili gliptina,
- kalcij, uključujući dodatke kalcija,
- stimulirajuće laksative (npr. senna),
- nesteroidne protuupalne lijekove (npr. ibuprofen) ili salicilate u visokoj dozi (npr. acetilsalicilatna kiselina (tvar prisutna u mnogim lijekovima koji se koriste za ublažavanje bolova i snižavanje vrućice, kao i za sprečavanje zgrušavanja krvi)),
- amfotericin B putem injekcije (za liječenje teških gljivičnih infekcija),
- lijekove za liječenje mentalnih poremećaja poput depresije, tjeskobe, shizofrenije, itd. (npr. triciklički antidepresivi, neuroleptici (poput amisulprida, sultoprida, tiaprida, haloperidola, droperidola)),
- tetrakosaktid (za liječenje Chronove bolesti),
- trimetoprim (za liječenje infekcija),
- vazodilatatori uključujući nitrate (lijekovi koji šire krvne žile),

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

- lijekove koji se koriste u liječenju niskog krvnog tlaka, šoka ili astme (npr. efedrin, noradrenalin ili adrenalin).

Pinorcor 4 mg/1,25 mg s hranom i pićem
Preporuča se uzeti Pinorcor 4 mg/1,25 mg prije jela.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća
Vaš liječnik će Vas savjetovati da prestanete uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg prije nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni i savjetovat će Vam da uzimate drugi lijek umjesto lijeka Pinorcor 4 mg/1,25 mg. Pinorcor 4 mg/1,25 mg se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati nakon trećeg mjeseca trudnoće jer može uzrokovati ozbiljna oštećenja djeteta ako se upotrebljava nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje
Uzimanje lijeka Pinorcor 4 mg/1,25 mg se ne preporučuje ako dojite.
Odmah obavijestite svojeg liječnika ako dojite ili planirate početi dojiti.
Odmah se posavjetujte s liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima
Pinorcor 4 mg/1,25 mg obično ne utječe na pozornost, no kod nekih se bolesnika mogu pojaviti različite reakcije poput omaglice ili slabosti, povezane sa sniženjem krvnog tlaka. Ako do toga dođe, Vaša sposobnost upravljanja vozilima i strojevima može biti oslabljena.

Pinorcor sadrži laktozu
Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Pinorcor sadrži natrij
Pinorcor sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno. Vaš liječnik Vam može modificirati način uzimanja lijeka ukoliko imate oštećenje bubrega. Uzmite svoju tabletu ujutro i prije obroka. Progutajte tabletu s čašom vode.

Ako uzmete više lijeka Pinorcor 4 mg/1,25 mg nego što ste trebali
Ako uzmete previše tableta, što je prije moguće zatražite savjet svojeg liječnika ili najbliže bolnice. Najčešći učinak u slučaju predoziranja je niski krvni tlak. Ako se pojavi znatno niži krvni tlak (povezano s mučninom, povraćanjem, grčevima, omaglicom, pospanošću, smetenošću, promjenama u količini mokraće koju proizvedu bubrezi), može pomoći ležanje s podignutim nogama.

Ako ste zaboravili uzeti Pinorcor 4 mg/1,25 mg
Važno je uzeti lijek svaki dan jer je redovita terapija učinkovitija. Međutim, ako zaboravite uzeti jednu dozu lijeka Pinorcor 4 mg/1,25 mg, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

Ako prestanete uzimati Pinorcor 4 mg/1,25 mg
Budući da liječenje visokog krvnog tlaka obično traje cijeli život, trebali bi se posavjetovati sa svojim liječnikom prije prestanka uzimanja ovog lijeka.
U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i obratite se odmah svojem liječniku ako se kod Vas pojave sljedeće nuspojave koje mogu biti ozbiljne:
- teška omaglica ili nesvjestica kao posljedica niskog krvnog tlaka (Često - može se javiti u manje od 1 na 10 osoba),
- bronhospazam (stezanje u prsima, piskanje pri disanju i nedostatak zraka) (Manje često - može se javiti u manje od 1 na 100 osoba),
- oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla, otežano disanje (Manje često - može se javiti u manje od 1 na 100 osoba),
- teške kožne reakcije, uključujući multiformni eritem (kožni osip koji obično počinje s crvenim mrljama na licu, rukama ili nogama koje jako svrbe) ili intenzivni kožni osip, koprivnjača, crvenilo kože po cijelom tijelu, jak svrbež, pojava mjehura, ljuštenje i oteklina kože, upala sluznice (Stevens-Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije (Vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba),
- kardiovaskularni poremećaji (nepravilni otkucaji srca, angina pektoris (bolovi u prsima, vilici i leđima koji se javljaju prilikom fizičkog napora), srčani udar) (Vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba),
- slabost u rukama i nogama ili poteškoće s govorom koji mogu biti znak moždanog udara (Vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba),
- upala gušterače što može uzrokovati jaku bol u trbuhu i leđima povezanu sa općim lošim osjećajem (Vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba),
- žutilo kože ili očiju (žutica) koje može biti znak upale jetre (hepatitisa) (Vrlo rijetko - mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba),
- nepravilan rad srca koji je životno ugrožavajući (Nepoznato – učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka),
- bolest mozga uzrokovana bolešću jetre (hepatična encefalopatija) (Nepoznato – učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka),
- slabost u mišićima, grčevi, osjetljivosti ili bol, osobito ukoliko pritom osjećate slabost ili imate povišenu temperaturu, moguće je da je uzrokovano neuobičajenim oštećenjem mišića (Nepoznato - učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Prema padajućem redoslijedu učestalosti, nuspojave koje se mogu javiti su:
- Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): niska razina kalija u krvi, kožne reakcije u osoba predisponiranih za alergijske i astmatične reakcije, glavobolja, omaglica, vrtoglavica, trnci i bockanje, poremećaji vida, šum u ušima (tinitus), kašalj, nedostatak zraka (dispneja), poremećaji probavnog sustava (mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhu, poremećaj okusa, dispepsija ili loša probava, proljev, zatvor), alergijske reakcije (poput kožnog osipa i svrbeža), grčevi u mišićima, opća slabost.
- Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): promjene raspoloženja, depresija, poremećaji spavanja, koprivnjača, crvene točkice na koži (purpura), nakupina mjehura na koži, problemi s bubrezima, impotencija (nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije), prekomjerno znojenje, prekomjeran broj eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica), promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina kalija u krvi koja se vraća na normalu nakon prekida liječenja, niska

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

razina natrija u krvi koja može dovesti do dehidracije i niskog krvnog tlaka, izrazita pospanost, nesvjestica, osjećaj lupanja srca (palpitacije), ubrzani rad srca (tahikardija), vrlo niska razina šećera u krvi (hipoglikemija) kod bolesnika koji boluju od šećerne bolesti, upala krvnih žila (vaskulitis), suhoća usta, fotosenzitivne reakcije (pojačana osjetljivost kože na sunce), artralgija (bolovi u zglobovima), mijalgija (bolovi u mišićima), bol u prsnom košu, opće loše osjećanje, oteknuće ruku i/ili nogu, vrućica, povišena razina ureje u krvi, povišena razina kreatinina u krvi, padovi.

- Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba): pogoršanje psorijaze, promjene u laboratorijskim nalazima: niska razina klorida u krvi, niska razina magnezija u krvi, povišena razina jetrenih enzima, povišena razina bilirubina u serumu, umor, navale crvenila, smanjena količina mokraće ili prestanak mokrenja, akutno zatajenje bubrega.
  Tamna mokraća, mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji. To mogu biti simptomi stanja koje se naziva neodgovarajuće izlučivanje antidiuretskog hormona (SIADH).
- Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): smetenost, eozinofilna upala pluća (rijetki tip upale pluća), začepljenje ili curenje nosa (rinitis), teške bolesti bubrega, promjene u krvnim pretragama kao što je mali broj bijelih i crvenih krvnih stanica, niska vrijednost hemoglobina u krvi, mali broj trombocita (krvnih pločica) u krvi, anemija uzrokovana niskim brojem crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija), anemija uzrokovana niskim brojem crvenih i bijelih krvnih stanica i pločica (aplastična anemija), povišena razina kalcija u krvi, poremećena funkcija jetre.
- Nepoznate (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka): promjene u EKG-u, promjene u laboratorijskim nalazima: visoka razina mokraćne kiseline i visoka razina šećera u krvi, kratkovidnost (miopija), zamagljen vid, smetnje vida, oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta), promjena boje, utrnulost i bol u prstima ruku ili nogu (Raynaudov fenomen). Ukoliko bolujete od sistemskog eritematoznog lupusa (vrsta bolesti kolagena), Vaše stanje se može pogoršati.

Mogu se pojaviti poremećaji krvi, bubrega, jetre ili gušterače te promjene u laboratorijskim parametrima (testiranje krvi). Vaš liječnik možda će Vas uputiti na ispitivanje krvi kako bi kontrolirao Vaše stanje.

Ukoliko Vam se jave ovi simptomi, odmah se javite svom liječniku.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Pinorcor 4 mg/1,25 mg

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pinorcor 4 mg/1,25 mg sadrži

Djelatne tvari su perindopril-*tert*-butilamin i indapamid.

Jedna tableta Pinorcor 4 mg/1,25 mg sadrži 4 mg perindopril-*tert*-butilamina (što odgovara 3,34 mg perindoprila) i 1,25 mg indapamida.

Drugi sastojci su:
Jezgra tablete: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat vrste A, magnezijev stearat.
Film ovojnica: kalcijev karbonat, izomalt, hipromeloza 6 mPas, hipromeloza 15 mPas, trigliceridi srednje duljine lanca.

Kako Pinorcor 4 mg/1,25 mg izgleda i sadržaj pakiranja

Pinorcor 4 mg/1,25 mg tablete su bijele do prljavo bijele, duguljaste, bikonveksne, filmom obložene tablete ravne s obje strane. Dimenzija tableta je oko 8 x 4 mm.

30 ili 90 tableta pakiranih u oPA/Al/PVC/Al blisteru, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica
Hrvatska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:
Hrvatska: Pinorcor 4 mg/1,25 mg filmom obložene tablete
Slovenija: Pinorcor 4 mg/1,25 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2026.

HALMED
26 - 10 - 2026
ODOBRENO