

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prospan sirup

suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Prospan sirup i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan sirup
3. Kako uzimati Prospan sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Prospan sirup
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Prospan sirup i za što se koristi

Prospan sirup je biljni lijek s učinkom na dišni sustav.

Prospan sirup se koristi

za olakšano iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih produktivnim kašljem u odraslih, adolescenata i djece starije od 2 godine.

Kako djeluje Prospan sirup

Prospan razrjeđuje gustu bronhalnu sluz i pospješuje iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih obilnim stvaranjem sekreta.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan sirup

Nemojte uzimati Prospan sirup

- ako ste alergični na djelatnu tvar, neku drugu biljku iz porodice Araliaceae (bršljanovke) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Prospan sirup u sljedećim slučajevima:

- U slučaju smetnji disanja (kratak dah), povišene temperature kao i gnojnog ili krvavog iskašljaja, morate odmah potražiti savjet liječnika.
- U slučaju da bolujete od gastritisa ili čira na želucu (vrijeda), potražite savjet liječnika.
- Kod dugotrajnog kašlja kod djece, potrebno je savjetovanje s liječnikom prije liječenja ovim lijekom.

Djeca

Djeca ispod 2 godine starosti ne smiju uzimati Prospan sirup zbog mogućeg pogoršanja simptoma bolesti dišnih putova (pojačano stvaranje sluzi).

U djece posebnu pozornost treba posvetiti pojavi proljeva i povraćanja.

Drugi lijekovi i Prospan sirup

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

- Ne preporučuje se istodobna primjena ovog lijeka s opijatnim antitusivima – opijatni lijekovi koji sprječavaju kašalj (npr. *kodein, dekstrometorfan*).

Prospan sirup s hranom, pićem i alkoholom

Nema posebnih zahtjeva.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tijekom trudnoće i dojenja, Prospan sirup ne preporučuju se tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važna upozorenja o ostalim sastojcima Prospan sirupa

Ovaj lijek sadrži sorbitol. Kad se koristi prema uputi, svaka doza od 5 ml sadrži 1,9 g sorbitola, odnosno svaka doza od 2,5 ml sadrži 0,96 g sorbitola. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek

3. Kako uzimati Prospan sirup

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Dob	Doziranje	Ukupna dnevna doza
Djeca između 2 i 6 godina	2,5 ml sirupa (odgovara 17,5 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista) 2 puta na dan	5 ml (2 x 2,5 ml) odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista
Djeca između 6 i 12 godina	5 ml sirupa (odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista) 2 puta na dan	10 ml (2 x 5 ml) odgovara 70 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista
Djeca od 12 godina i odrasli	5 ml sirupa (odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista) 3 puta na dan	15 ml (3 x 5 ml) odgovara 105 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista

Način primjene

Kroz usta. Prospan sirup uzmite pomoću priložene dozirne čašice.

Dobro protresite prije svake uporabe.

Prospan sirup se uzima ujutro, u podne i/ili navečer.

Koliko dugo smijete uzimati Prospan sirup

U slučaju da Vaši simptomi traju dulje od tjedan dana tijekom primjene ovog lijeka, obratite se liječniku.

U slučaju nastanka otežanog disanja, vrućice, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražite savjet liječnika.

Ako uzmete više Prospan sirupa nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena većih količina može izazvati mučninu, povraćanje, proljev i uznemirenost. U tom slučaju morate se savjetovati s liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti Prospan sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Jednostavno nastavite uzimati lijek kako Vam je propisao liječnik ili prema uputi o lijeku.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i odmah obavijestite liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem (Quinckeov edem), koje dovode do oticanja lica, jezika i grla te otežanog disanja.

Ostale moguće nuspojave su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- probavne smetnje kao što su mučnina, povraćanje i proljev

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- alergijske reakcije kao što su koprivnjača (vrsta osipa), kožni osip, proširenje kapilara na licu, otežano disanje

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V.](#)**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Prospan sirup

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nakon prvog otvaranja boce rok valjanosti sirupa je 6 mjeseci.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prospan sirup sadrži

- Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista.
- 1 ml oralne otopine sadrži 7 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Hedera helix* L., folium (bršljanov list) (5-7,5 : 1).
- Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % (m/m).
- Pomoćne tvari su: kalijev sorbat, tekući kristalizirajući sorbitol, bezvodna citratna kiselina, ksantanska guma, aroma trešnje, pročišćena voda.

2,5 ml sirupa sadrži 0,963 g zamjenskog sladila sorbitola = 0,08 BU.

Prospan sirup ne sadrži alkohol.

Kako Prospan sirup izgleda i sadržaj pakiranja

Svjetlo smeđa otopina slatkog, voćnog okusa s mirisom trešnje.

Smeđa staklena boca sa 100 ml ili 200 ml oralne otopine i dozirna čašica od 10 ml, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Tel: 01 562 2000

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2026.