

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg tablete Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg tablete

ramipril/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Ramicomp Genericon i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ramicomp Genericon
3. Kako uzimati Ramicomp Genericon
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Ramicomp Genericon
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ramicomp Genericon i za što se koristi

Ramicomp Genericon je kombinacija dvije djelatne tvari koje se zovu ramipril i hidroklorotiazid.

Ramipril pripada skupini lijekova zvanih „ACE inhibitori“ (Angiotensin Converting Enzyme - angiotenzin konvertirajući enzim). Djeluje tako da:

- smanjuje stvaranje tvari koje povisuju krvni tlak u Vašem tijelu,
- čini Vaše krvne žile opuštenijima i širim,
- olakšava Vašem srcu pumpati krv po tijelu.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova zvanih „tiazidski diuretici“ ili „tablete za vodu“. Djeluje tako da povećava količinu vode (urina) koju izlučujete. To pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

Ramicomp Genericon se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka. Dvije djelatne tvari zajedno snizuju krvni tlak. Koriste se zajedno kad liječenje samo jednom od tih tvari nije bilo uspješno.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ramicomp Genericon

Nemojte uzimati Ramicomp Genericon

- ako ste alergični na ramipril, hidroklorotiazid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- ako ste alergični na lijekove slične ovom lijeku (drugi ACE inhibitori ili lijekovi derivati sulfonamida).

Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

- ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju zvanu angioedem. Znaci te reakcije uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikariju), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.

- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).
- ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se pri tome koristi, ovaj lijek možda nije prikladan za Vas.
- ako imate teških problema s jetrom.
- ako imate abnormalne količine soli u krvi (kalcij, kalij, natrij).
- ako imate problema s bubrežima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne arterije).
- tijekom **zadnjih šest mjeseci trudnoće** (vidjeti dio "Trudnoća, dojenje i plodnost").
- ako dojite (vidjeti dio "Trudnoća, dojenje i plodnost").
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati Ramicomp Genericon. Ako niste sigurni, razgovarajte s liječnikom prije uzimanja Ramicomp Genericona.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ramicomp Genericon:

- ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrežima.
- ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog bolesti - povraćanja, proljeva, neuobičajeno pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diureтика ili zbog dijalize).
- ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija).
- ako trebate primiti anestetik; primjerice kod operacije ili zahvata na zubima, možda ćete trebati prekinuti liječenje Ramicomp Genericonom jedan dan prije; upitajte svog liječnika za savjet.
- ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga).
- ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, pogotovo ako ste stariji.
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 - racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva
 - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus)
 - vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti
- ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što je skleroderma ili sistemski lupus erythematoses.
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti, morate o tome obavijestiti svog liječnika. Ne preporučuje se uzimanje Ramicomp Genericona u prva tri mjeseca trudnoće, a može ozbiljno našteti Vašem djetetu nakon trećeg mjeseca trudnoće (vidjeti dio "Trudnoća, dojenje i plodnost").
- ako Vam se vid pogorša ili imate bol u oku. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja tlaka u oku (glaukom), a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedana nakon uzimanja Ramicomp Genericona. Ako se ne liječi, može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, možete biti u većem riziku od razvoja ove komplikacije. Prestanite uzimati Ramicomp Genericon i zatražite hitnu liječničku pomoć.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima, primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 - aliskiren

- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja Ramicomp Genericona.
- ako ste u prošlosti imali probleme s disanjem ili plućima (uključujući upalu ili tekućinu u plućima) nakon unosa hidroklorotiazida. Ako osjetite bilo kakav težak nedostatak zraka ili otežano disanje nakon uzimanja lijeka Ramicomp Genericon, odmah potražite liječničku pomoć.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Ramicomp Genericon“.

Djeca i adolescenti

Ramicomp Genericon se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina, jer lijek nikada nije primjenjivan u toj doboj skupini.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja Ramicomp Genericona.

Drugi lijekovi i Ramicomp Genericon

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ramicomp Genericon može utjecati na učinak drugih lijekova, a drugi lijekovi mogu također utjecati na učinak Ramicomp Genericona.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak Ramicomp Genericona:

- lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAIL, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina).
- lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. Liječnik će Vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s Ramicomp Genericonom:

- lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina).
- lijekovi koji mogu smanjiti količinu kalija u krvi, uključujući lijekove protiv zatvora, diuretike (tablete za vodu), amfotericin B (koristi se za gljivične infekcije) i ACTH (koristi se za provjeru aktivnosti adrenalnih žlijezda).
- lijekovi za liječenje raka (kemoterapija).
- lijekovi za srčane probleme, uključujući probleme s brojem otkucanja srca.
- diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje tekućine iz organizma), kao što je furosemid.
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij (npr. spironolakton, triamteren ili amilorid) i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presadenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka).
- steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon.
- nadomjesci kalcija.
- allopurinol (koristi se za sniženje koncentracije urične kiseline).
- prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom).
- kolestiramin (za smanjenje masnoća u krvi).

- karbamazepin (za epilepsiju).
- heparin (koristi se za razrjeđivanje krvi).
- temsirolimus (za liječenje raka).
- lijekove koji se najčešće primjenjuju kako bi se izbjeglo odbacivanje presađenih organa (sirolimus, everolimus i ostali lijekovi koji pripadaju skupini mTOR inhibitora). Pogledajte dio „Upozorenja i mjere opreza“.
- vildagliptin (koristi se za liječenje dijabetesa tipa 2).
- racecadotril (za liječenje proljeva).
- Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Ramicomp Genericon“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Ramicomp Genericon može utjecati na njihov učinak:

- lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji se uzimaju kroz usta i inzulin; Ramicomp Genericon može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi dok uzimate Ramicomp Genericon.
- litij (za liječenje mentalnih problema); Ramicomp Genericon može povisiti koncentraciju litija u krvi, stoga je potrebno da Vaš liječnik pažljivo prati koncentraciju litija.
- lijekovi za opuštanje mišića.
- kinin (za malariju).
- lijekovi koji sadrže jod, a koriste se prilikom rendgenskog ili CT pregleda u bolnici.
- penicilin (za infekcije).
- lijekovi za razrjeđivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (oralni antikoagulansi), kao što je varfarin.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja Ramicomp Genericona.

Pretrage

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka:

- ako trebate obaviti ispitivanje funkcije paratireoidne žljezde; Ramicomp Genericon može utjecati na rezultate pretrage.
- ako ste sportaš i trebate obaviti anti-doping kontrolu; Ramicomp Genericon može dati pozitivan rezultat na testu.

Ramicomp Genericon s hranom, pićem i alkoholom

- Uzimanje alkohola s Ramicomp Genericonom može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko smijete popiti dok uzimate Ramicomp Genericon, razgovarajte sa svojim liječnikom, s obzirom da lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju).
- Ramicomp Genericon se može uzimati s obrokom ili između obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Ne preporuča se uzimati Ramicomp Genericon tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a ne smije se uzimati od 13-tog tjedna trudnoće, s obzirom da uzimanje Ramicomp Genericona za vrijeme trudnoće može biti štetno za dijete.

Ako zatrudnите za vrijeme uzimanja Ramicomp Genericona, odmah obavijestite svog liječnika.

Ako planirate trudnoću, potrebno je unaprijed prijeći na primjerenu alternativnu terapiju.

Dojenje

Ne biste smjeli uzimati Ramicomp Genericon ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme korištenja Ramicomp Genericona možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na početku liječenja ili kada uzmete veću dozu Ramicomp Genericona. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili koristiti alate i strojeve.

Ramicomp Genericon sadrži laktozu i natrij.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Ramicomp Genericon

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje visokog krvnog tlaka

Liječnik će prilagoditi dozu koju uzimate tako da Vaš krvni tlak bude pod kontrolom.

Stariji bolesnici

Liječnik će smanjiti početnu dozu i postupno prilagođavati Vašu terapiju.

Uzimanje lijeka

- Lijek uzmite kroz usta, svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro.
- Tablete progutajte s tekućinom.
- Nemojte drobiti ili žvakati tablete.

Ako uzmete više Ramicomp Genericona nego što ste trebali

Obavijestite liječnika ili se javite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka Vas odveze netko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakiranje lijeka, da liječnik može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Ramicomp Genericon

Ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Ramicomp Genericon i odmah se obratite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava - možda će Vam biti potrebna hitna medicinska skrb:

- oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip - to mogu biti znaci teške alergijske reakcije na Ramicomp Genericon.

- teške kožne reakcije, uključujući osip, čireve (ulceracije) u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti, crvenilo, mjeđurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme).

Odmah obavijestite liječnika, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

- ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije probleme, kao što su srčani i moždani udar;
- zadihanost, vrućica uz kašalj koja traje 2 do 3 dana te smanjeni apetit; to mogu biti znaci problema s plućima, uključujući upalu;
- ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, krvarete dulje nego što je normalno, bilo kakvi znakovi krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži, mrlje na koži ili infekcije češće nego je uobičajeno, ako imate bolno grlo i groznicu, osjećate umor, nesvjesticu, omaglicu ili imate bliju kožu - to mogu biti znaci problema s krvima ili koštanom srži;
- jaki bolovi u želucu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa - upala gušterače);
- grozница, zimica, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) - to mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre;
- oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta).

Ostale nuspojave

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- glavobolja, osjećaj slabosti ili umora
- omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze Ramicomp Genericona)
- suhi, nadražujući kašalj ili bronhitis
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu šećera u krvi, ako imate šećernu bolest, može se pogoršati
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu urične kiseline ili masnoća u krvi
- bolni, crveni ili natečeni zglobovi (pogoršanje stanja kod oboljelih od gihta)

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- osip na koži, sa ili bez ispupčenja dijelova kože
- crvenilo praćeno osjećajem vrućine, nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog sjedanja ili ustajanja
- problemi s ravnotežom (vrтoglavica)
- svrbež i neobični osjeti na koži, kao što su ukočenost, žarenje, peckanje, vrućina ili trnci (parestezija)
- gubitak ili poremećaj okusa (disgeuzija)
- problemi sa snom
- osjećaj depresije, napetosti, povećanje nervoze ili nemira
- začepljeno nos, upala sinusa (sinusitis), zadihanost
- upala desni, nateknuta usta (gingivitis)
- crvene, natečene oči, koje svrbe ili suze (konjuktivitis)
- zvonjava u ušima (tinnitus)
- zamućen vid
- gubitak kose
- bol u prsnom košu
- bol u mišićima (mijalgija)
- zatvor, bol u želucu ili crijevima
- probavne tegobe ili mučnina

- povećano izlučivanje tekućine (urin) tijekom dana, što može biti posljedica oštećenja bubrega
- znojenje jače od uobičajenog ili osjećaj žedi
- smanjenje ili gubitak apetita (anoreksija), smanjen osjećaj gladi
- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
- natečene ruke i noge (to mogu biti znaci da zadržavate više vode nego je uobičajeno)
- groznica
- seksualna impotencija u muškaraca
- krvne pretrage pokazuju smanjenje broja crvenih ili bijelih krvnih stanica, trombocita ili koncentracije hemoglobina
- krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega
- krvne pretrage pokazuju smanjenu razinu kalija u krvi

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- mučnina, proljev ili žgaravica
- crven i nateknut jezik (glositis) ili sluznica usta (aftozni stomatitis); suha usta
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu kalija u krvi
- akutni respiratorni distres (znakovi uključuju težak nedostatak zraka, vrućicu, slabost i smetenost)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- teškoće u koncentraciji, nemir ili zbuњenost
- prsti na rukama i nogama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se ugrijete (Raynaudov fenomen)
- povećanje grudi u muškaraca (ginekomastija)
- krvni ugrušci uslijed teškog gubitka tekućine
- poremećaj sluha
- smanjeno suzenje očiju
- objekti izgledaju žučkasto (ksantopsija)
- dehidracija
- oticanje, bol ili crvenilo u obrazima (upala žlijezde slinovnice)
- oticanje crijeva zvano „angioedem tankog crijeva“, uz simptome kao što su bol u trbuhi, povraćanje i proljev
- pojačana osjetljivost kože na sunce (fotoosjetljivost)
- teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama ili druge kožne reakcije, kao što je osip praćen crvenilom na licu i čelu
- kožni osip
- mrlje na koži ili hladnoća u ekstremitetima
- problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)
- mišićno-koštana ukočenost ili nemogućnost pomicanja čeljusti (tetanija)
- slabost ili grčevi u mišićima
- smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena
- krv u mokraći, što može biti znak problema s bubrezima (intersticijski nefritis)
- povećana razina šećera u mokraći
- povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) vidljiv prilikom krvnih pretraga
- krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica (pancitopenija)
- krvne pretrage pokazuju promjene razina soli (elektrolita), kao što su natrij, kalcij, magnezij i klorid u krvi
- koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće.
- usporena ili narušena sposobnost reakcije
- poremećaj njuha (parosmija)
- teškoće pri disanju ili pogoršanje astme

- smanjeno suzenje oka
- rak kože i usana (nemelanomski rak kože)

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ramicomp Genericon

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ramicomp Genericon sadrži

- Djetalne tvari u lijeku su ramipril i hidroklorotiazid.
Jedna Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg tableta sadrži 2,5 mg ramiprla i 12,5 mg hidroklorotiazida. Jedna Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg tableta sadrži 5 mg ramiprla i 25 mg hidroklorotiazida.
- Drugi sastojci su: natrijev hidrogenkarbonat; lakoza hidrat; karmelozanatrij, umrežena; škrob, prethodno geliran; natrijev stearilfumarat.

Kako Ramicomp Genericon izgleda i sadržaj pakiranja

Ramicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mg tablete su bijele do prljavobijele tablete, ovalnog oblika, s utisnutom oznakom "12,5" i urezom na jednoj strani, dimenzija 4,0 mm x 8,0 mm.

Ramicomp Genericon 5 mg/25 mg tablete su bijele do prljavobijele tablete, ovalnog oblika, s utisnutom oznakom "25" i urezom na jednoj strani i bočnim stranama, dimenzija 5,0 mm x 10,0 mm.

Tablete se mogu razdijeliti na jednakе doze.

Pakiranje sadrže 30 tableta, 30 x 1 tableta, 90 tableta i 90 x 1 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, 8054 Graz
Austrija

Proizvođač

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.
Hafnerstrasse 211, 8054 Graz
Austrija

Coripharma ehf.
Reykjavíkurvegur 78
IS-220 Hafnarfjordur

Island

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Genericon Pharma d.o.o.

Nova Ves 17

10 000 Zagreb

Tel: 01 4669322

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u svibnju 2022.