

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rowatinex meke želučanootporne kapsule

α -pinen, β -pinen, kamfen, borneol, anetol, fenhon, cineol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana ili tijekom primjene lijeka).

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Rowatinex i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowatinex
3. Kako uzimati Rowatinex
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rowatinex
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rowatinex i za što se koristi

Rowatinex pomaže u otapanju/razgradnji i uklanjanju (raspadanje i eliminacija) kamenaca iz urinarnog trakta.

Rowatinex kapsule namijenjene su za primjenu kod odraslih.

Prije upotrebe Rowatinexa neophodan je pregled kod liječnika specijalista koji će postaviti dijagnozu i savjetovati Vas oko uzimanja lijeka.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowatinex

Nemojte uzimati Rowatinex ako ste alergični (preosjetljivi) na neku djelatnu tvar: α -pinen, β -pinen, kamfen, borneol, anetol, fenhon, cineol ili neki drugi sastojak Rowatinexa (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Rowatinex kapsule.

Obratite se svom liječniku ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi ili lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči.

Primjena lijeka se ne preporučuje u bolesnika s kolikama, anurijom, teškom infekcijom mokraćnog trakta te kod komplikacija bubrežnih kamenaca.

Odmah se obratite liječniku ako nastupe ustrajna vrućica, bol u donjem dijelu trbuha, grčevi, krv u mokraći ili poremećaj mokrenja.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena Rowatinex kapsula kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Rowatinex

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se dobiju bez recepta. To uključuje sljedeće:

- lijekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi npr. varfarin)
- lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči (posavjetujte se sa Vašim liječnikom u vezi toga)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena lijeka tijekom trudnoće ili dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju Rowatinex kapsula na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Mala je vjerojatnost utjecaja Rowatinexa na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Rowatinex sadrži natrijev etilparahidroksibenzoat i natrijev propilparahidroksibenzoat.

Može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

Rowatinex sadrži boju Sunset Yellow FCF (E110).

Može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Rowatinex

Uvijek uzimajte Rowatinex točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni provjerite s liječnikom ili ljekarnikom.

Rowatinex kapsula se mora progutati cijela sa čašom vode prije jela. Ne grizite i ne žvačite kapsulu.

Uobičajeno doza za odrasle

Jedna kapsule 3 do 4 puta na dan.

Trajanje liječenja: Obavezno se obratite liječniku ako se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 3 dana. Lijek se ne smije uzimati dulje od 2 tjedna bez savjetovanja s liječnikom.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena Rowatinex kapsula kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako ste uzeli više Rowatinexa nego što ste trebali

Ako ste uzeli više kapsula nego što ste trebali, razgovarajte s liječnikom koji će poduzeti potrebne mjere.

Kod predoziranja može doći do iritacije želuca što može prouzročiti mučninu, povraćanje i dijareju.

Ako ste zaboravili uzeti Rowatinex

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako imate ikakvih daljnjih pitanja u vezi s uporabom ovoga lijeka, pitajte svojeg liječnika ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi Rowatinex može prouzročiti nuspojave, ali se one ne moraju javiti kod svakoga bolesnika.

Učestalost zabilježenih nuspojava nije utvrđena.

- Zabilježene su blage i prolazne želučane smetnje i povraćanje.
- Zabilježeni su slučajevi nepodnošljivosti/preosjetljivosti na lijek koji su se očitovali reakcijama na koži.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava **navedenog u Dodatku V**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rowatinex

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rowatinex sadrži

Djelatna tvar u svakoj želučanootpornoj mekoj kapsulisadrži: α -pinen 24,8 mg, β -pinen 6,2 mg, kamfen 15 mg, borneol 10 mg, anetol 4 mg, fenhon 4 mg, cineol 3 mg. Preostali sastojak je djevičansko maslinovo ulje.

Ovojnica kapsule sadrži: želatinu; glicerol 85%; natrijev etilparahidroksibenzoat (E215); natrijev propilparahidroksibenzoat (E217); Sunset Yellow FCF 85% (E110); Quinoline Yellow WS 70% (E104)

Kako Rowatinex izgleda i sadržaj pakiranja

Rowatinex kapsule su žute, ovalne, meke želatinske, želučanootporne kapsule koje sadrže blijedo žutu do zelenkasto žutu otopinu s jakim aromatičnim mirisom.

Svako pakiranje sadrži 50 kapsula u blister pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Rowa Pharmaceuticals, Ltd.
Newtown, Bantry, Co. Cork
Irska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Medical Intertrade d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 3
10 431 Sveta Nedelja
Tel: 01/3336036

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 28. siječnja 2021.