

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Seretide Inhaler 25 mikrograma + 50 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija
Seretide Inhaler 25 mikrograma + 250 mikrograma u jednoj dozi stlačeni inhalat, suspenzija

salmeterol, flutikazonpropionat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Seretide Inhaler i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Seretide Inhaler?
3. Kako primjenjivati Seretide Inhaler?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Seretide Inhaler?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Seretide Inhaler i za što se koristi?

Seretide Inhaler sadržava dva djelatna sastojka: salmeterol i flutikazonpropionat.

- Salmeterol je bronhodilatator dugog djelovanja. Djeluje tako da opušta mišiće u stijenkama malih dišnih puteva tj. u plućima, čime dovodi do otvaranja dišnih puteva i olakšanog disanja. Ovaj učinak obično traje najmanje 12 sati.
- Flutikazonpropionat je kortikosteroid koji smanjuje oticanje i iritaciju u plućima.

Liječnik Vam je propisao ovaj lijek radi sprječavanja stanja otežanog disanja, kao što je astma.

Seretide Inhaler morate uzimati svakodnevno, onako kao što Vam je Vaš liječnik preporučio. To će osigurati pravilnu primjenu terapije u ostvarivanju kontrole Vaše astme.

Seretide pomaže zaustaviti pojavu teškog disanja i piskanja. Međutim, Seretide Inhaler se ne smije primjenjivati za olakšanje iznenadnog napadaja teškog disanja ili piskanja. Ako se to dogodi, trebate uzeti brzodjelujući lijek kao što je salbutamol. Uvijek trebate imati uza se Vaš brzodjelujući lijek.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Seretide Inhaler?

Nemojte primjenjivati Seretide Inhaler:

- Ako ste alergični na salmeterol, flutikazonpropionat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego primijenite Seretide Inhaler ako imate:

- srčanu bolest uključujući nepravilni ili brzi ritam otkucaja srca,
- stanje preaktivne štitnjače,
- visoki krvni tlak,
- šećernu bolest jer Seretide može povećati razine šećera u krvi,
- nisku razinu kalija u krvi,
- tuberkulozu pluća (TBC), bilo imate li ju sada ili ste je imali prije, ili ostale plućne infekcije.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Djeca

Ovaj lijek se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 4 godine.

Drugi lijekovi i Seretide Inhaler

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove uključujući lijekove za liječenje astme i one koje ste nabavili bez recepta. U nekim slučajevima, Seretide možda nije prikladno koristiti s drugim lijekovima.

Prije uzimanja lijeka Seretide Inhaler, napomenite liječniku, ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- beta blokatore (npr. atenolol, propranolol i sotalol). Beta blokatori se najčešće koriste kod povišenog krvnog tlaka ili drugih srčanih bolesti.
- lijekove za liječenje infekcija (poput ketokonazola, itraconazola i eritromicina) uključujući neke lijekove za liječenje HIV-a (poput ritonavira, lijekove koji sadrže kobicistat). Neki od tih lijekova mogu povećati količinu flutikazonpropionata ili salmeterola u Vašem tijelu. To može povećati rizik za pojavu nuspojava uključujući nepravilne srčane otkucaje ili može pogoršati nuspojave. Vaš liječnik će Vas možda htjeti pažljivo pratiti.
- kortikosteroide (kroz usta ili putem injekcije). Ako ste nedavno liječeni tim lijekovima, to može povećati rizik utjecaja ovog lijeka na Vašu nadbubrežnu žlijezdu.
- diuretike (poznate kao „tablete za vodu“) koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.
- ostale lijekove koji šire dišne puteve (bronhodilatatore), poput salbutamola.
- lijekove koji sadrže ksantin. Često se koriste za liječenje astme.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Seretide Inhaler utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati Seretide Inhaler?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

- Uzimajte Vaš Seretide Inhaler svaki dan, dok Vam Vaš liječnik ne savjetuje da prestanete.
- Nemojte uzeti više od preporučene doze. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

- Nemojte prestati uzimati Seretide Inhaler ili smanjivati dozu prije nego se savjetujete sa svojim liječnikom.
- Seretide Inhaler mora se inhalirati kroz usta u pluća.

Odrasli i adolescenti od 12 godina na dalje:

Seretide 50 Inhaler: Dva udaha dva puta na dan.

Seretide 250 Inhaler: Dva udaha dva puta na dan.

Djeca u dobi od 4 do 12 godina:

Seretide 50 Inhaler: Dva udaha dva puta na dan.

Seretide Inhaler se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 4 godine.

Kad se postigne kontrola astme dozom lijeka Seretide Inhaler dva puta na dan, liječnik može odlučiti smanjiti dozu na jedanput na dan. To može biti ili

- jednom navečer, ako imate **noćne simptome** astme, ili
- jednom ujutro, ako imate **dnevne simptome**.

Iznimno je važno da se pridržavate uputa liječnika o tome koliko udaha lijeka trebate uzeti i koliko često trebate koristiti Seretide Inhaler.

Ako uzimate Seretide Inhaler za astmu, Vaš liječnik će redovito kontrolirati Vaše simptome.

Ako Vam se astma ili disanje pogoršaju odmah obavijestite svog liječnika. Možete npr. češće osjećati jače piskanje, češće težinu u prsima, ili trebate češće uzimati bronhodilatator kratkog djelovanja. Ako Vam se nešto od toga dogodi, morate nastaviti uzimati Seretide Inhaler, ali ne povećavati broj udaha. Stanje Vaših pluća se može pogoršati i mogli biste se ozbiljno razboljeti. Posjetite liječnika jer Vam je možda potrebna dodatna terapija.

Upute za upotrebu

- Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik pokazat će Vam kako koristiti inhalator. Oni trebaju s vremena na vrijeme provjeriti kako ga koristite. Neispravno korištenje lijeka Seretide Inhaler ili ne pridržavanje propisane doze neće pomoći u kontroli astme kako bi trebalo.
- Lijek se nalazi u spremniku pod tlakom s plastičnim nastavkom za usta.
- Na stražnjoj strani spremnika nalazi se brojač koji pokazuje koliko je doza još preostalo. Nakon svakog pritiska, otpušta se doza lijeka iz spremnika te se broj na brojaču smanjuje za jedan.
- Pazite da Vam inhalator slučajno ne ispadne iz ruku, jer bi to moglo uzrokovati odbrojanje brojača.

Provjera inhalatora

1. Prije prve uporabe potrebno je provjeriti inhalator. Skinite poklopac s nastavka za usta nježnim pritiskom na stranice poklopca sa palcem i kažiprstom i povucite naprijed.



2. Kako bi se uvjerali da inhalator radi, dobro ga protresite, usmjerite nastavak za usta dalje od Vas i pritisnite na spremnik kako bi izašla doza “maglice” s lijekom u zrak. Ponovite ove korake, protresajući inhalator prije svakog otpuštanja doze “maglice” s lijekom, dok se na brojaču ne pojavi brojka 120. Ako niste koristili inhalator tjedan dana ili duže, ispustite dvije doze “maglice” s lijekom u zrak.

Upotreba inhalatora

Važno je da započnete disati što je sporije moguće neposredno prije primjene inhalatora.

1. Koristite inhalator dok stojite ili sjedite uspravno.
2. Skinite poklopac s nastavka za usta (kao što je prikazano na prvoj slici). Provjerite iznutra i izvana je li nastavak za usta čist i da nema stranih predmeta.
3. Protresite inhalator 4 do 5 puta kako bi osigurali da su se otpuštene čestice odstranile te da je sadržaj inhalatora ravnomjerno izmiješan.



4. Držite inhalator uspravno kako je pokazano, s palcem na dnu ispod nastavka za usta. Izdahnite sve do granice neugode.



5. Postavite nastavak za usta u usta, između zuba, i zatvorite usnice oko nastavka, ali ga nikako nemojte zagristi.



6. Udahnite kroz usta polako i duboko. Trenutak nakon što počnete udisati kroz usta, čvrsto pritisnite gornji dio inhalatora kako biste ispustili dozu. Istodobno udišite jednolično i duboko.



7. Zadržavajući dah, izvadite inhalator iz usta i maknite prst s vrha inhalatora. Zadržite dah nekoliko sekundi sve do granice neugode.



8. Pričekajte otprilike pola minute prije uzimanja druge doze te ponovite korake od 3 do 7.
9. Nakon toga, isperite usta vodom i vodu ispljunite i/ili operite Vaše zube. To će pomoći u sprječavanju nastanka gljivične infekcije u ustima i promuklosti.
10. Nakon primjene uvijek vratite poklopac na nastavak za usta kako biste ga zaštitili od prašine. Poklopac će napraviti "klik" prilikom pravilnog povratka na poziciju. Ako ne napravi "klik" tada je potrebno okrenuti poklopac na drugu stranu i pokušati ponovno. Nikako nemojte upotrijebiti suviše snage za navedeni pokret.

Ne žurite s koracima 4, 5, 6 i 7. Važno je da dišete najsporije koliko možete neposredno prije uporabe Vašeg inhalatora. Prvih nekoliko puta trebate koristiti Vaš inhalator ispred ogledala. Ako uočite "maglicu" kako izlazi iz vrha Vašeg inhalatora ili strana Vaših usta, trebate pokušati ponovno od koraka 3.

Kao i kod svih inhalatora roditelj treba osigurati da dijete uzima propisani Seretide Inhaler ispravnom tehnikom inhalacije kako je opisano gore.

U slučaju da Vi ili Vaše dijete imate poteškoće s uporabom inhalatora, Vaš liječnik ili medicinska sestra ili drugi zdravstveni djelatnik mogu Vam preporučiti uporabu Volumatic pomagala za udisanje lijeka s Vašim inhalatorom. Vaš liječnik, medicinska sestra, ljekarnik ili drugi zdravstveni djelatnik trebaju Vam pokazati kako da koristite napravu s Vašim inhalatorom; kako je održavati te da Vam odgovore na bilo koje pitanje koje ćete možda imati. Ako koristite napravu sa zračnom komorom s Vašim inhalatorom, važno je da je ne prestanete koristiti prije nego razgovarate sa svojim liječnikom. Ako prestanete koristiti napravu sa zračnom komorom ili promijenite tip naprave koju koristite, Vaš liječnik će možda trebati promijeniti dozu lijeka potrebnu za kontrolu Vaše astme.

Uvijek razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego bilo što promijenite u liječenju astme.

Starija djeca ili osobe slabije snage mogu lakše držati inhalator s obje ruke. Stavite oba kažiprsta na vrh inhalatora i oba palca na dno ispod nastavka za usta.

Kada brojač prikaže broj 020 trebali biste nabaviti novu dozu lijeka. Prestanite koristiti inhalator kada brojač pokaže **000** jer Vam potisnuta "maglica" s lijekom, koja izlazi iz inhalatora, ne može pružiti optimalnu tj. potpunu dozu. Nikad ne pokušavajte promijeniti brojeve na brojaču ili odvojiti brojač od metalnog spremnika.

Čišćenje Vašeg inhalatora

Kako biste spriječili blokadu inhalatora, važno ga je čistiti barem jednom tjedno.

Kako bi očistili svoj inhalator:

- Skinite poklopac s nastavka za usta.
- Nemojte odvajati metalnu bočicu od plastičnog kućišta.
- Obrišite unutarnji i vanjski dio nastavka za usta i plastičnog kućišta suhom krpicom ili maramicom.

- Vratite poklopac za nastavak za usta na mjesto. Poklopac će napraviti "klik" prilikom pravilnog povratka na poziciju. Ako ne napravi "klik" tada je potrebno okrenuti poklopac na drugu stranu i pokušati ponovno. Nemojte upotrijebiti suviše snage za navedeni pokret.

Metalnu bočicu ne stavljajte u vodu.

Ako uzmete više lijeka Seretide Inhaler nego što ste trebali

Važno je da koristite inhalator kako Vam je liječnik propisao. Ako slučajno ipak uzmete veću dozu od propisane, recite svom liječniku ili ljekarniku. Možete primijetiti da Vam srce lupa brže nego obično i da osjećate drhtavicu. Također možete imati omaglicu, glavobolju, slabost u mišićima i bolne zglobove.

Ako ste uzimali više doze tijekom dugog razdoblja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku što prije za savjet. Veće doze lijeka Seretide mogu smanjiti izlučivanje steroidnih hormona iz nadbubrežne žlijezde.

Ako ste zaboravili uzeti Seretide

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Uzmite sljedeću dozu, kako Vam je propisano.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako prestanete uzimati Seretide

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Vrlo je važno da uzimate Seretide svaki dan kako Vam je propisano. **Nastavite tako sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte naglo prestati s uzimanjem ili naglo smanjiti Vašu dozu.** To bi moglo pogoršati Vaš problem s disanjem.

Dodatno, ako naglo prekinete uzimati Seretide Inhaler ili smanjite dozu lijeka Seretide Inhaler to može (veoma rijetko) uzrokovati probleme s nadbubrežnom žlijezdom (adrenalna insuficijencija) koji katkad mogu uzrokovati pojavu nuspojava.

Te nuspojave mogu uključivati bilo što od navedenog:

- bol u želucu,
- umor i gubitak apetita, osjećaj bolesti,
- mučninu i proljev,
- gubitak na težini,
- glavobolju ili omamljenost,
- smanjenje razina šećera u Vašoj krvi,
- smanjenje krvnog tlaka i napadaje.

Kada je Vaše tijelo u stanju stresa zbog npr. povišene temperature, traume (npr. nakon prometne nesreće), infekcije ili operacije, funkcija nadbubrežne žlijezde može se pogoršati i možete imati bilo koju od gore navedenih nuspojava.

Ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Za sprječavanje pojave tih simptoma Vaš liječnik Vam može dodatno propisati kortikosteroide u tabletama (kao npr. prednizolon).

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi uporabe ovog lijeka, pitajte svog liječnika, medicinsku sestru ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Kako bi smanjio vjerojatnost nuspojava, liječnik će Vam propisati najnižu dozu lijeka Seretide koja kontrolira Vašu astmu.

Alergijske reakcije: možda ćete primijetiti da Vam se odmah nakon primjene lijeka Seretide naglo pogoršalo disanje. Možete osjetiti jako piskanje i počnete kašljati ili imati otežano disanje. Također, možda ćete primijetiti svrbež, osip (koprivnjaču) ili oticanje (najčešće lica, usana, jezika ili grla) ili možete naglo osjetiti jako ubrzan rad srca ili osjećate nesvjesticu i ošamućenost (koji mogu dovesti do kolapsa ili gubitka svijesti). **Ako primijetite bilo koju od tih pojava ili one nastupe iznenada nakon uzimanja lijeka Seretide prekinite uzimanje lijeka Seretide i odmah se javite liječniku.** Alergijske reakcije na Seretide su manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 bolesnika).

Ostale nuspojave su navedene niže:

Vrlo česte (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika)

- glavobolja - obično prestaje tijekom nastavka liječenja.
- veća učestalost prehlada u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB).

Česte (javljaju se u do 1 na 10 bolesnika)

- gljivice (bolna, žućkasta, uzdignuta područja) u ustima i grlu. Također, bolan jezik te promukli glas i iritacija grla. U tom slučaju može pomoći ispiranje usta vodom koju treba odmah ispljunuti i/ili pranje zuba nakon svake doze lijeka. Liječnik može propisati lijek za liječenje gljivičnih infekcija.
- bolni, otečeni zglobovi i bolovi u mišićima
- grčevi u mišićima.

U bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) zabilježene su i sljedeće nuspojave:

- upala pluća i bronhitis (infekcija pluća). Javite se liječniku ako primijetite neke od sljedećih simptoma: pojačana produkcija slina (sputuma), promjena boje slina, vrućica, zimica, pojačani kašalj, pojačane teškoće s disanjem.
- modrice i prijelomi kostiju
- upala sinusa (osjećaj napetosti ili začepljenja nosa, obraza i područja iza očiju, ponekad uz probadajuću bol)
- smanjena količina kalija u krvi (koja može izazvati nejednake otkucaje srca te slabost i grčeve u mišićima).

Manje česte (javljaju se u do 1 na 100 bolesnika)

- povišena razina šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija). Ako imate šećernu bolest, možda će biti potrebno češće kontrolirati razinu šećera u krvi te po potrebi prilagoditi Vašu uobičajenu terapiju za šećernu bolest.
- siva mrena u oku (katarakta)
- vrlo brzi srčani ritam (tahikardija)
- drhtavica (tremor) i brz ili neujednačen srčani ritam (palpitacije) – ove nuspojave su uglavnom bezopasne i smanjuju se kako se liječenje nastavlja.
- bol u prsima
- osjećaj zabrinutosti (ovaj učinak uglavnom se javlja u djece)

- poremećaji spavanja
- alergijski osip na koži.

Rijetke (javljaju se u do 1 na 1000 bolesnika)

- **teškoće s disanjem ili piskanje pri disanju koje se pogoršava odmah nakon primjene lijeka Seretide.** Ako se to dogodi, **prestanite uzimati Seretide Inhaler.** Uzmite inhalacijski lijek brzog djelovanja za ublažavanje simptoma, da bi mogli lakše disati i **odmah se javite svom liječniku.**
- Seretide može utjecati na normalno stvaranje steroidnih hormona u tijelu, osobito prilikom dugotrajnog uzimanja visokih doza lijeka Seretide. Posljedični učinci obuhvaćaju:
 - zaostajanje u rastu djece i adolescenata,
 - stanjivanje kostiju,
 - povišen očni tlak (glaukom),
 - porast tjelesne težine,
 - zaokruženo (ili mjesečasto) lice (Cushingov sindrom).

Vaš liječnik će redovito provjeravati mogući nastup tih nuspojava i održavati kontrolu astme najnižom potrebnom dozom lijeka Seretide.

- promjene u ponašanju, uključujući hiperaktivnost i razdražljivost (ti se učinci uglavnom javljaju u djece).
- nejednaki srčani ritam ili srce ima dodatni otkucaj (aritmija). Javite se liječniku, ali nemojte prestati uzimati ovaj lijek, osim ako Vam liječnik kaže da prestanete.
- gljivična infekcija u ezofagusu (jednjaku), koja može uzrokovati teškoće pri gutanju.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka):

- depresija ili agresija. Ti su učinci vjerojatniji u djece.
- zamućen vid

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Seretide Inhaler?

- **Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.**
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici inhalatora iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
- Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.
- Kao i kod većine inhalacijskih lijekova u spremnicima pod tlakom, terapijski učinak lijeka može oslabiti kada je spremnik hladan.
- Metalna bočica sadrži tekućinu pod tlakom. Ne izlažite je temperaturi višoj od 50°C i zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti. Nemojte je probijati, bušiti ili spaljivati čak ni kada je naizgled prazna.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Seretide Inhaler sadrži?

- Djelatne tvari su 25 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolksinafoata) i 50 ili 250 mikrograma flutikazonpropionata.
- Drugi sastojak je potisni plin: norfluran (HFA 134a).

Ovaj lijek sadrži fluorirane stakleničke plinove.

Jedan inhalator sadrži 12 g HFC-134a (poznat i pod nazivom norfluran ili HFA 134a), što odgovara 0,0172 tona ekvivalenta CO₂ (potencijal globalnog zagrijavanja [engl. *global warming potential*, GWP] = 1430).

Kako Seretide Inhaler izgleda i sadržaj pakiranja?

- Seretide Inhaler je odmjerno-dozni inhalator koji oslobađa Vaš lijek u obliku stlačene suspenzije za inhalaciju kroz usta u pluća.
- Metalna bočica pod tlakom sadrži bijelu do bjelkastu suspenziju inhalata.
- Spremnici su smješteni u plastične raspršivače s anatomski oblikovanim nastavkom za usta koji je opremljen poklopcem.
- Lijek je pakiran u kutiji s 1 inhalatorom.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

GlaxoSmithKline Trading Services Limited,
12 Riverwalk,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Irska

Proizvođači:

Glaxo Wellcome Production
Zone Industrielle No. 2, 23 Rue Lavoisier, la madeleine, 27000 Evreux
Francuska
ili
Glaxo Wellcome S.A.
Avenida de Extremadura, 3 - 09400, Aranda de Duero, Burgos
Španjolska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Pharmakos Consulting d.o.o.
Ul. Andrije Žaje 43
10000 Zagreb
Tel: +385 1 207 92 37

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2025.

Ostali izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode na <http://www.halmed.hr>

