

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Serzyl 25 mikrograma/125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
Serzyl 25 mikrograma/250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija

salmeterol (u obliku salmeterolksinafoata)/flutikazonpropionat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Serzyl i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Serzyl
3. Kako primjenjivati Serzyl
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Serzyl
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Serzyl i za što se koristi

Serzyl sadrži dvije djelatne tvari, salmeterol i flutikazonpropionat.

- Salmeterol je bronhodilatator dugog djelovanja. Bronhodilatatori omogućuju da mali dišni putevi u plućima ostanu otvoreni, što olakšava ulazak i izlazak zraka. Ovaj učinak obično traje najmanje 12 sati.
- Flutikazonpropionat je glukokortikoid koji smanjuje oticanje i iritaciju u plućima.

Serzyl je indiciran za uporabu isključivo kod odraslih starih 18 godina ili više.

Serzyl NIJE indiciran za uporabu u djece u dobi od 12 godina ili mlađe, ili kod adolescenata u dobi od 13 do 17 godina starosti.

Liječnik Vam je propisao ovaj lijek radi sprječavanja problema s disanjem, kao što je astma.

Serzyl morate primjenjivati svakodnevno, onako kao što Vam je Vaš liječnik preporučio. To će osigurati pravilnu primjenu terapije u ostvarivanju kontrole Vaše astme.

Serzyl pomaže zaustaviti pojavu teškog disanja i piskanja. Međutim, Serzyl se ne smije primjenjivati za olakšanje iznenadnog napadaja teškog disanja ili piskanja. Ako se to dogodi, trebate uzeti brzodjelujući lijek kao što je salbutamol. Uvijek trebate imati uza se Vaš brzodjelujući lijek.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Serzyl

Nemojte uzimati Serzyl:

- ako ste alergični na salmeterol, flutikazon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Serzyl ako imate:

- srčanu bolest uključujući nepravilni ili brzi ritam otkucaja srca,
- stanje preaktivne štitnjače,
- visoki krvni tlak,
- šećernu bolest (Serzyl može povećati razine šećera u krvi),
- nisku razinu kalija u krvi,
- tuberkulozu pluća (TBC), bilo imate li ju sada ili ste je imali prije, ili ostale plućne infekcije.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Serzyl

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje lijekove za liječenje astme i one koje ste nabavili bez recepta, jer Serzyl možda nije prikladno koristiti s drugim lijekovima.

Prije nego što počnete primjenjivati lijek Serzyl, napomenite liječniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- beta blokatore (npr. atenolol, propranolol i sotalol). Beta blokatori se najčešće koriste kod povišenog krvnog tlaka ili drugih srčanih bolesti.
- lijekove za liječenje infekcija (poput ketokonazola, itakonazola, telitromicina i eritromicina) uključujući neke lijekove za liječenje HIV-a (poput ritonavira, lijekova koji sadrže kobicistat). Neki od tih lijekova mogu povećati količinu flutikazonpropionata ili salmeterola u Vašem tijelu. To može povećati rizik za pojavu nuspojava povezanih s primjenom Serzyla, uključujući nepravilne srčane otkucaje ili može pogoršati nuspojave. Liječnik će Vas možda htjeti pažljivo nadzirati ako uzimate te lijekove.
- kortikosteroide (kroz usta ili putem injekcije). Ako ste nedavno liječeni tim lijekovima, to može povećati rizik utjecaja ovog lijeka na Vašu nadbubrežnu žlijezdu.
- diuretike, poznate kao „tablete za vodu“, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.
- ostale bronhodilatatore (poput salbutamola).
- lijekove koji povećavaju broj otkucaja srca (mogu se zvati beta agonisti).
- lijekove koji sadrže ksantin. Često se koriste za liječenje astme.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Serzyl utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Serzyl sadrži alkohol

Ovaj lijek sadrži 0,73 mg alkohola po inhalaciji, što odgovara 12 mg / ml.

Količina alkohola u dozi ovog lijeka odgovara količini koja se nalazi u manje od 1 ml piva ili 1 ml vina. Mala količina alkohola prisutna u ovom lijeku neće imati nikakav zamjetan učinak.

3. Kako primjenjivati Serzyl

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

- Uzimajte Serzyl svaki dan, dok Vam liječnik ne savjetuje da prestanete. Nemojte uzeti više od preporučene doze. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

- Nemojte prestati uzimati Serzyl ili smanjivati dozu prije nego se savjetujete s Vašim liječnikom.
- Serzyl se mora inhalirati kroz usta u pluća.

Odrasli od 18 godina i stariji:

Serzyl 25/125 - Dva udaha dva puta na dan.

Serzyl 25/250 - Dva udaha dva puta na dan.

Iznimno je važno da se pridržavate uputa liječnika o tome koliko udaha lijeka trebate uzeti i koliko često trebate koristiti ovaj lijek.

Ako uzimate Serzyl, Vaš liječnik će redovito kontrolirati Vaše simptome.

Uporabom Serzyla dva puta dnevno Vaši simptomi mogu biti dobro kontrolirani. U tom slučaju Vaš liječnik može i odlučiti smanjiti dozu.

No, ako Vam se astma ili disanje pogoršaju, odmah obavijestite Vašeg liječnika. Možete npr. češće osjećati jače piskanje, češće stezanje u prsima, ili trebate češće uzimati bronhodilatator kratkog djelovanja. Ako Vam se nešto od toga dogodi, trebate nastaviti uzimati Serzyl, ali ne povećavati broj udaha. Stanje Vaših pluća se može pogoršati i mogli biste se ozbiljno razboljeti. Posjetite liječnika jer Vam je možda potrebna dodatna terapija.

Upute za uporabu

- Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik pokazat će Vam kako koristiti inhalator. Oni trebaju s vremena na vrijeme provjeriti kako ga koristite. Neispravno korištenje lijeka Serzyl ili ne pridržavanje propisane uporabe neće pomoći u kontroli astme kako bi trebalo.
- Lijek se nalazi u spremniku pod tlakom u plastičnom kućištu s nastavkom za usta.
- Na stražnjoj strani spremnika nalazi se brojač koji pokazuje koliko je doza još preostalo. Nakon svakog pritiska, otpušta se “maglica” lijeka iz spremnika te se broj na brojaču smanjuje za jedan.
- Pazite da Vam inhalator slučajno ne ispadne iz ruku, jer bi to moglo uzrokovati odbrojanje brojača.

Provjera inhalatora

1. Prije prve uporabe potrebno je provjeriti inhalator. Skinite poklopac s nastavka za usta laganim pritiskom na strane poklopca pomoću palca i kažiprsta i rastavite ga (slika 1).
2. Kako bi se uvjerali da inhalator radi, dobro ga protresite, usmjerite nastavak za usta dalje od Vas i pritisnite čvrsto spremnik kako bi izašla “maglica” u zrak. Ponovite ovaj korak najmanje 3 puta, protresajući inhalator prije svakog otpuštanja “maglice”, dok se na brojaču ne pojavi broj 120. Ako niste koristili inhalator tjedan dana ili dulje, ili ukoliko se inhalator jako ohladi (ispod 0°C), isпустite dvije doze “maglice” s lijekom u zrak.

Uporaba inhalatora

Važno je da započnete disati što je sporije moguće neposredno prije primjene inhalatora.



1. Koristite inhalator dok stojite ili sjedite uspravno.
2. Skinite poklopac s nastavka za usta (slika 1). Provjerite iznutra i izvana je li nastavak za usta čist i da nema prašine ili drugih ostalih čestica.
3. Protresite inhalator 4 do 5 puta kako bi osigurali da su se sve ostatne čestice odstranile te da je sadržaj inhalatora ravnomjerno izmiješan (slika 2).


4. Držite inhalator uspravno s palcem na dnu ispod nastavka za usta. Izdahnite sve do granice neugode (slika 3).
5. Postavite nastavak za usta u usta, između zuba, i zatvorite usnice oko nastavka, ali ga nikako nemojte zagristi.
6. Udahnite kroz usta polako i duboko. Trenutak nakon što počnete udisati kroz usta, čvrsto pritisnite gornji dio spremnika kako biste ispustili “maglicu” s lijekom. Istodobno udišite jednolično i duboko (slika 4).
7. Zadržavajući dah, izvadite inhalator iz usta i maknite prst s vrha inhalatora. Zadržite dah nekoliko sekundi ili sve do granice neugode (slika 5).
8. Pričekajte otprilike pola minute prije uzimanja iduće doze lijeka te ponovite korake od 3 do 7.
9. Nakon toga, isperite usta vodom i vodu ispljunite i/ili operite zube. To će pomoći u sprječavanju nastanka gljivične infekcije u ustima i promuklosti.
10. Nakon primjene uvijek vratite poklopac na nastavak za usta kako biste ga zaštitili od prašine. Poklopac će napraviti “klik” prilikom pravilnog povratka na poziciju. Nikako nemojte upotrijebiti suviše snage.

Ne žurite s koracima 4, 5, 6 i 7. Važno je da udišete najsporije koliko možete neposredno prije uporabe Vašeg inhalatora. Prvih nekoliko puta trebate koristiti Vaš inhalator dok stojite ispred ogledala. Ako uočite “maglicu” kako izlazi iz vrha Vašeg inhalatora ili sa strane Vaših usta, trebate pokušati ponovno od koraka 3.

U slučaju da imate poteškoće s uporabom inhalatora, Vaš liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik mogu Vam preporučiti uporabu naprave sa zračnom komorom poput AeroChamber Plus s Vašim inhalatorom. Vaš liječnik, medicinska sestra, ljekarnik ili drugi zdravstveni radnik trebaju Vam pokazati kako da koristite napravu s Vašim inhalatorom, kako je održavati te da Vam odgovore na bilo koje pitanje koje ćete možda imati. Ako koristite napravu sa zračnom komorom s Vašim inhalatorom, važno je da je ne prestanete koristiti prije nego razgovarate s Vašim liječnikom ili medicinskom sestrom. **Isključivo AeroChamber Plus naprava sa zračnom komorom se smije koristiti sa Serzylom. Ostale naprave sa zračnom komorom se ne smiju koristiti sa Serzylom te se ne smijete prebacivati s jedne naprave sa zračnom komorom na drugu.** Ako prestanete koristiti napravu sa zračnom komorom, Vaš liječnik će možda trebati promijeniti dozu lijeka potrebnu za kontrolu Vaše astme. Uvijek razgovarajte s Vašim liječnikom prije nego napravite bilo kakve promjene u liječenju svoje astme.

Osobe slabije snage u rukama mogu lakše držati inhalator s obje ruke. Stavite oba kažiprsta na vrh inhalatora i oba palca na dno ispod nastavka za usta.

Kada brojač prikaže broj 20 (slika 6) trebali biste nabaviti novu dozu lijeka. Prestanite koristiti inhalator kada brojač pokaže 0 jer Vam preostala potisnuta “maglica” ne može dati potpunu dozu. Nikada ne pokušavajte promijeniti brojeve na brojaču ili odvojiti brojač od plastičnog spremnika.



Čišćenje Vašeg inhalatora

Kako biste spriječili blokadu inhalatora, važno ga je čistiti barem jednom tjedno.

Kako bi očistili svoj inhalator:

- Skinite poklopac s nastavka za usta.
- Nemojte nikada odvajati spremnik od plastičnog kućišta.

- Obrišite unutarnji i vanjski dio nastavka za usta i plastičnog kućišta suhom krpicom ili maramicom.
- Vratite poklopac za nastavak za usta na mjesto. Poklopac će napraviti "klik" prilikom pravilnog povratka na poziciju. Nemojte upotrijebiti suviše snage.

Niti jedan dio inhalatora se ne smije prati niti stavljati u vodu.

Ako primijenite više lijeka Serzyl nego što ste trebali

Važno je da koristite inhalator kako Vam je liječnik propisao. Ako slučajno ipak uzmete veću dozu od propisane, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Možete primijetiti da Vam srce lupa brže nego obično i da osjećate drhtavicu. Također možete imati omaglicu, glavobolju, slabost u mišićima i bolne zglobove.

Ako ste uzimali više doze tijekom dugog razdoblja, obratite se liječniku ili ljekarniku za savjet, jer veće doze lijeka Serzyl mogu smanjiti izlučivanje steroidnih hormona iz nadbubrežne žlijezde.

Ako ste zaboravili primijeniti Serzyl

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako prestanete primjenjivati Serzyl

Vrlo je važno da primjenjujete lijek Serzyl svaki dan kako Vam je propisano. **Nastavite tako sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte naglo prestati s uzimanjem ili naglo smanjiti Vašu dozu Serzyla.** To bi moglo pogoršati Vaš problem s disanjem.

Dodatno, ako naglo prekinete uzimati Serzyl ili smanjite dozu lijeka Serzyl to može (rijetko) uzrokovati probleme s Vašom nadbubrežnom žlijezdom (adrenalna insuficijencija) koji katkad mogu uzrokovati pojavu nuspojava.

Te nuspojave mogu uključivati bilo što od navedenog:

- bol u želucu,
- umor i gubitak apetita, osjećaj bolesti,
- mučninu i proljev,
- gubitak na težini,
- glavobolju ili omamljenost,
- nisku razinu šećera u krvi,
- nizak krvni tlak i napadaje.

Kada je Vaše tijelo u stanju stresa zbog npr. povišene temperature, traume (npr. nakon prometne nesreće), infekcije ili operacije, insuficijencija nadbubrežne žlijezde može se pogoršati i možete imati bilo koju od gore navedenih nuspojava.

Ako Vam se pojavi bilo koja nuspojava razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom. Za sprječavanje pojave tih simptoma Vaš liječnik Vam može dodatno propisati glukokortikoide u tabletama.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Kako bi smanjila vjerojatnost nuspojava, liječnik će Vam propisati najnižu dozu lijeka Serzyl koja kontrolira Vašu astmu.

Odmah se obratite Vašem liječniku ukoliko primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

- **Znakove alergijskih reakcija: možda ćete primijetiti da Vam se odmah nakon primjene lijeka Serzyl naglo pogoršalo disanje.** Možete osjetiti jako piskanje i počnete kašljati ili imati otežano disanje. Također, možda ćete primijetiti svrbež, osip (koprivnjaču) ili oticanje (najčešće lica, usana, jezika ili grla) ili možete naglo osjetiti jako ubrzan rad srca ili osjećate nesvjesticu i ošamućenost (koji mogu dovesti do kolapsa ili gubitka svijesti).
- **Poteškoće s disanjem ili piskanje koje se pogoršava odmah nakon primjene Serzyla.**
 - Ako se to dogodi, prestanite uzimati ovaj lijek. Uzmite Vaš brzodjelujući inhalator kako bi Vam pomogao s disanjem.
- Nejednake, brze i neujednačene otkucaje srca (atrijska fibrilacija).

Ostale nuspojave su navedene niže:

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 bolesnika)

- glavobolja - obično prestaje tijekom nastavka liječenja.
- veća učestalost prehlada u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB). KOPB je kronična plućna bolest koja uzrokuje kratkoću daha, kašalj i učestale infekcije u području prsa. Pojam KOPB uključuje stanja poznata kao kronični bronhitis i emfizem.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika)

- gljivice (bolna, kremasto žućkasta, uzdignuta područja) u ustima i grlu. Također, bolan jezik, promukli glas i iritacija grla.
 - U tom slučaju može pomoći ispiranje usta vodom koju treba odmah ispljunuti i/ili pranje zuba nakon svake doze lijeka. Vaš liječnik može također propisati lijek za liječenje gljivičnih infekcija.
- bolni, otečeni zglobovi i bolovi u mišićima
- grčevi u mišićima.

U bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) zabilježene su i sljedeće nuspojave:

- upala pluća i bronhitis (infekcija pluća). Javite se Vašem liječniku ako primijetite neke od sljedećih simptoma: pojačana produkcija slina (sputuma), promjena boje slina, vrućica, zimica, pojačani kašalj, pojačane teškoće s disanjem.
- modrice i prijelomi kostiju
- upala sinusa (osjećaj napetosti ili začepljenja nosa, obraza i područja iza očiju, ponekad uz pulsirajuću bol)
- smanjena količina kalija u krvi (koja može izazvati nejednake otkucaje srca te slabost i grčeve u mišićima).

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 bolesnika)

- povišena razina šećera (glukoze) u krvi (hiperglikemija). Ako imate šećernu bolest, možda će biti potrebno češće kontrolirati razinu šećera u krvi te po potrebi prilagoditi Vašu uobičajenu terapiju za šećernu bolest.
- vrlo brzi srčani ritam (tahikardija)
- drhtavica (tremor) i brz ili osjećaj lupanja u prsima (palpitacije) – ove nuspojave su uglavnom bezopasne i smanjuju se kako se liječenje nastavlja.
- bol u prsima
- osjećaj zabrinutosti ili anksioznosti
- poremećaji spavanja
- alergijski osip na koži.

Rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 bolesnika)

- Ovaj lijek može rijetko utjecati na normalno stvaranje steroidnih hormona (iz nadbubrežne žlijezde) u tijelu, osobito prilikom dugotrajnog uzimanja visokih doza lijeka Serzyl. Ti učinci obuhvaćaju:
 - stanjivanje kostiju,

- glaukom (povišen tlak u oku što može uzrokovati probleme s vidom) ili katarakta (zamućena leća u oku),
- porast tjelesne težine,
- zaokruženo (ili mjesečasto) lice (Cushingov sindrom),
- zaostajanje u rastu, ukoliko se koristi kod djece i adolescenata.
- promjene u ponašanju, kao što je neuobičajena hiperaktivnost i razdražljivost (ti se učinci uglavnom javljaju u djece).
- nejednaki srčani ritam ili srce ima dodatni otkucaj (aritmija). Javite se Vašem liječniku, ali nemojte prestati uzimati Serzyl, osim ako Vam liječnik kaže da prestanete.
- gljivična infekcija u ezofagusu (jednjaku), koja može uzrokovati teškoće pri gutanju.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

- depresija ili agresija. Ti su učinci vjerojatniji u djece.
- zamućen vid.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Serzyl

- **Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.**
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza oznake „Rok valjanosti“/„EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
- Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.
- Spremnik sadrži tekućinu pod tlakom. Ne izlagati temperaturama iznad 50 °C, čuvati od izravnog sunčevog svjetla. Ne bušiti ili spaljivati spremnik, čak ni kada je prazan.
- Kao i kod većine inhalacijskih lijekova u spremnicima pod tlakom, terapijski učinak lijeka može oslabiti kada je spremnik hladan.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Serzyl sadrži

- Jedna odmjerna doza (potiskom preko ventila) sadrži 25 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterolsinafoata) i 125 ili 250 mikrograma flutikazonpropionata. Drugi sastojci su potisni plin norfluran (HFC-134a) i bezvodni etanol.

Ovaj lijek sadrži fluorirane stakleničke plinove.

Serzyl 25 mikrograma/125 mikrograma – jedan inhalator sadrži 12,249 g HFC-134a, što odgovara 0,018 tona ekvivalenta CO₂ (potencijal globalnog zagrijavanja [engl. *global warming potential*, GWP] = 1430).

Serzyl 25 mikrograma/250 mikrograma – jedan inhalator sadrži 12,228 g HFC-134a, što odgovara 0,017 tona ekvivalenta CO₂ (potencijal globalnog zagrijavanja [engl. *global warming potential*, GWP] = 1430).

Kako Serzyl izgleda i sadržaj pakiranja

- Serzyl je suspenzija inhalata napunjena u aluminijski spremnik s odmjernim ventilom. Uz pomoć plastičnog inhalatora, Vaš lijek se udisanjem kroz usta isporučuje izravno u pluća.
- Spremnik pod tlakom sadrži bijelu do gotovo bijelu suspenziju inhalata.
- Spremnici su uloženi u bijeli plastični inhalator (s nastavkom za usta) i zatvoreni svijetlo ljubičastim ili tamno crvenim poklopcem.
- U kutiji se nalazi 1 inhalator. Svaki inhalator sadrži 120 doza lijeka.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Viatrix Hrvatska d.o.o.
Koranska 2
10 000 Zagreb

Proizvođači:

McDermott Laboratories Limited, trading as Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
Irska

McDermott Laboratories Limited, trading as Mylan Dublin Respiratory
Unit 25 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Baldoyle
Dublin 13
Irska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek je odobren u zemljama članicama EEA pod sljedećim nazivima:

Austrija	Serkep 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension
Cipar	Serkep 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension Serkep 25 microgram /125 microgram, 25 microgram /250 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension
Estonija	Serkep
Finska	Serkep 25 mikrog/125 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspension Serkep 25 mikrog/250 mikrog/annos inhalaatiosumute, suspension
Grčka	Serkep 25 microgram /125 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension Serkep 25 microgram /250 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension
Hrvatska	Serzyl 25 mikrograma/125 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija Serzyl 25 mikrograma/250 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
Irska	Sirdupla 25 microgram /125 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension Sirdupla 25 microgram /250 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension
Italija	Salmeterolo e Fluticasone Mylan
Latvija	Serkep 25/125 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija Serkep 25/250 mikrogrami/devā aerosols inhalācijām, zem spiediena, suspensija
Litva	Serkep 25/125 mikrogramai/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija Serkep 25/250 mikrogramai/dozėje suslėgtoji įkvepiamoji suspensija
Mađarska	Serhalyx 25/125 mikrogramm/adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió Serhalyx 25/250 mikrogramm/adag túlnyomásos inhalációs szuszpenzió

Malta	Sirdupla 25 microgram /125 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension Sirdupla 25 microgram /250 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension
Norveška	Serkep
Njemačka	Serkep 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension Serkep 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Suspension
Portugal	Serkep
Slovačka	Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov Serkep 25 mikrogramov/250 mikrogramov
Slovenija	Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom Serkep 25 mikrogramov/250 mikrogramov/vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2025.

AeroChamber Plus je zaštićeni žig kompanije Trudell Medical International.