

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Strepsils 0,6 mg/1,2 mg/100 mg pastile s vitaminom C i okusom naranče

amilmetakrezol  
2,4-diklorbenzilni alkohol  
askorbatna kiselina

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što su Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče
3. Kako uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što su Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče i za što se koriste**

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče sadrže tri djelatne tvari - amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol i vitamin C.

Amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol su antiseptici koji imaju blago djelovanje kojim suzbijaju bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela.

Vitamin C pomaže nadoknaditi razinu vitamina C u organizmu, budući da se smatra da se za vrijeme infekcije razine vitamina C smanjuju.

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija usne šupljine i ždrijela u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina. Polagano otapanje pastile u ustima omogućuje djelovanje djelatnih tvari u području infekcije te pomaže podmazivanju i umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče**

##### **Nemojte uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče:**

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- djeca mlađa od 6 godina.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

### **Djeca**

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

### **Drugi lijekovi i Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu poznate značajne interakcije s drugim lijekovima.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim razdobljima ne preporučuje.

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče se ne smiju koristiti tijekom dojenja.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

### **Važne informacije o nekim sastojcima lijeka**

- Jedna pastila sadrži 968 mg glukoze i 1438 mg saharoze. O tome treba voditi računa u bolesnika sa šećernom bolesti (dijabetesom). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
- Jedna pastila sadrži 0,162 mg boje Sunset Yellow (E110) i 0,0162 boje Ponceau 4R (E124). Boje Sunset Yellow (E110) i Ponceau 4R (E124) mogu uzrokovati alergijske reakcije.
- Jedna pastila sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija, tj. zanemarive količine natrija.
- Jedna pastila sadrži 3 mg propilen glikola.
- Ovaj lijek sadrži aromu s citralom, citronelolom, d-limonenom, geraniolom i linaloolom koji mogu uzrokovati alergijske reakcije.
- Jedna pastila ne sadrži više od 19,36 mikrograma glutena. Ovaj lijek sadrži samo vrlo nisku razinu glutena (iz pšeničnog škroba koji je prisutan u tekućoj glukozi). Smatra se da je „bez glutena” i malo je vjerojatno da će uzrokovati probleme ako imate celijakiju. Ako imate alergiju na pšenicu (što je stanje koje je različito od celijakije) ne smijete uzimati ovaj lijek.
- Ovaj lijek sadrži sulfite (sumporov dioksid E220 koji je prisutan u tekućoj glukozi) što rijetko može uzrokovati teške reakcije preosjetljivosti i bronhospazam.

### **3. Kako uzimati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Za ublažavanje simptoma lijek je potrebno primijeniti kratkotrajno u najnižim učinkovitim dozama!

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### Odrasli i djeca starija od 6 godina:

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 12 pastila tijekom 24 sata. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

#### Starije osobe

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

#### **Primjena u djece**

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

#### **Ako uzmete više Strepsils pastila s vitaminom C i okusom naranče nego što ste trebali**

Veća količina lijeka može izazvati nelagodu u želucu i crijevima. U tom slučaju prestanite uzimati ovaj lijek.

Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

#### **Ako ste zaboravili uzeti Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče**

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

#### **4.      **Moguće nuspojave****

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost niže navedenih nuspojava je nepoznata, odnosno ne može se procijeniti iz dostupnih podataka:

- preosjetljivost (reakcije preosjetljivosti mogu se pojaviti u obliku osipa, angioedema (oticanje lica, jezika i dušnika koje uzrokuje velike poteškoće u disanju koje su znak teške alergijske reakcije), urtikarije (koprivnjača), bronhospazama (otežano disanje) i hipotenzije (nizak tlak) sa sinkopom (nesvjestica)),
- bol u trbuhu, mučnina, nelagoda u ustima (nelagoda u ustima može se pojaviti u obliku iritacije grla, oralne parestezije (neuobičajeni/poremećeni osjećaj u ustima), edema (oticanje) usta i glosodinije (poremećaj osjeta i boli u jeziku)).

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### **5.      **Kako čuvati Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče****

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče sadrže**

Djelatne tvari su: amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol i askorbatna kiselina u obliku askorbatne kiseline i natrijevog askorbata.

Jedna pastila sadrži: 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorbenzalnog alkohola i 100,0 mg askorbatne kiseline (u obliku askorbatne kiseline i natrijevog askorbata).

Pomoćne tvari su: aroma crvene naranče (sadrži: citral, citronelol, d-limonen, geraniol i linalool), levomentol, propilen glikol (1520), boja Sunset Yellow (E110), boja Ponceau 4R (E124), tartaratna kiselina, tekuća glukoza i tekuća saharoza. Vidjeti dio 2 za važne informacije uz: glukoza, saharoza, natrij, gluten, pšenični škrob i sumporov dioksid E220 (iz tekuće glukoze), propilen glikol, boje te citral, citronelol, d-limonen, geraniol i linalool.

### **Kako Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče izgledaju i sadržaj pakiranja**

Strepsils pastile s vitaminom C i okusom naranče su narančaste, okrugle pastile karakterističnog okusa naranče sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja**

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

#### **Proizvođači**

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

#### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2022.**