

## **Uputa o lijeku: Informacije za korisnika**

### **Strepsils 0,6 mg/1,2 mg/8 mg pastile s okusom mentola i eukaliptusa**

amilmetakrezol  
2,4-diklorbenzilni alkohol  
levomentol

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što su Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa
3. Kako uzimati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što su Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa i za što se koriste**

Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa sadrže tri djelatne tvari - amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol i levomentol.

Amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol su antiseptici koji imaju blago djelovanje kojim suzbijaju bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela. Mentol djeluje blago anestetski na ždrijelo, te ublažava simptome začepljenja nosa.

Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija usne šupljine i ždrijela, suhog nadražajnog kašla povezanog s prehladom i začepljenja nosa u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina. Polagano otapanje pastile u ustima omogućuje djelovanje djelatnih tvari u području infekcije te pomaže podmazivanju i umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa**

##### **Nemojte uzimati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa:**

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- djeca mlađa od 6 godina.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

### **Djeca**

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

### **Drugi lijekovi i Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa**

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu poznate značajne interakcije s drugim lijekovima.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim razdobljima ne preporučuje.

Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa se ne smiju koristiti tijekom dojenja.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

### **Važne informacije o nekim sastojcima lijeka**

- Jedna pastila sadrži 1013 mg glukoze i 1496 mg saharoze. O tome treba voditi računa u bolesnika sa šećernom bolesti (dijabetesom). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
- Jedna pastila sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.
- Jedna pastila ne sadrži više od 20,26 mikrograma glutena. Ovaj lijek sadrži samo vrlo nisku razinu glutena (iz pšeničnog škroba koji je prisutan u tekućoj glukozi). Smatra se da je „bez glutena” i malo je vjerojatno da će uzrokovati probleme ako imate celijakiju. Ako imate alergiju na pšenicu (što je stanje koje je različito od celjakije) ne smijete uzimati ovaj lijek.
- Ovaj lijek sadrži sulfite (sumporov dioksid E220 koji je prisutan u tekućoj glukozi) što rijetko može uzrokovati teške reakcije preosjetljivosti i bronhospazam.
- Ovaj lijek sadrži eukaliptusovo eterično ulje s citralom i d-limonenom koji mogu uzrokovati alergijske reakcije.

### **3. Kako uzimati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Za ublažavanje simptoma lijek je potrebno primjeniti kratkotrajno u najnižim učinkovitim dozama!

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

#### **Odrasli i djeca starija od 6 godina:**

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 12 pastila tijekom 24 sata. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

### **Starije osobe:**

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

### **Primjena u djece**

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

### **Ako uzmete više Strepsils pastila s okusom mentola i eukaliptusa nego što ste trebali**

Veća količina lijeka može izazvati nelagodu u želucu i crijevima. U tom slučaju prestanite uzimati ovaj lijek.

Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

### **Ako ste zaboravili uzeti Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa**

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost niže navedenih nuspojava je nepoznata, odnosno ne može se procijeniti iz dostupnih podataka:

- preosjetljivost (reakcije preosjetljivosti mogu se pojaviti u obliku osipa, angioedema (oticanje lica, jezika i dušnika koje uzrokuje velike poteškoće u disanju koje su znak teške alergijske reakcije), urtikarije (koprivnjača), bronhospazama (otežano disanje) i hipotenzije (nizak tlak) sa sinkopom (nesvjesticom),
- bol u trbuhu, mučnina, nelagoda u ustima (nelagoda u ustima može se pojaviti u obliku iritacije grla, oralne parestezije (neobičajeni/poremećeni osjećaj u ustima), edema (oticanje) usta i glosodinije (poremećaj osjeta i boli u jeziku)).

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa sadrže**

Djelatne tvari su: amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol i levomentol.

Jedna pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola i 8 mg levomentola.

Pomoćne tvari su: eukaliptusovo eterično ulje (sadrži citral i d-limonen), boja indigokarmin (E132), tartaratna kiselina, tekuća saharoza i tekuća glukoza. Vidjeti dio 2 za važne informacije uz: glukozu, saharuzu, natrij (iz boje indigokarmin), gluten, pšenični škrob i sumporov dioksid E220 (iz tekuće glukoze) te citral i d-limonen.

**Kako Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa izgledaju i sadržaj pakiranja**

Strepsils pastile s okusom mentola i eukaliptusa su plave, okrugle pastile karakterističnog okusa mentola i eukaliptusa, sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

**Nositelj odobrenja**

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

**Proizvođači**

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2022.**