

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Streptusan divlja gorušica meke pastile

suhi ekstrakt zeleni divlje gorušice  
(*Sisymbrium officinale herba extractum siccum*)

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Ako simptomi potraju tijekom primjene ovog lijeka ili ako se pojave nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku, obratite se svom liječniku.

#### Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što su Streptusan divlja gorušica meke pastile i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Streptusan divlja gorušica meke pastile
3. Kako uzimati Streptusan divlja gorušica meke pastile
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Streptusan divlja gorušica meke pastile
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što su Streptusan divlja gorušica meke pastile i za što se koriste

Streptusan divlja gorušica meke pastile su tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje simptoma nadraženosti grla kao što su promuklost i suhi kašalj.

Ovaj lijek je tradicionalni biljni lijek za primjenu u navedenoj indikaciji isključivo na temelju dugotrajne primjene.

Ovaj lijek je indiciran kod odraslih, adolescenata i djece od 6 godina starosti.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Streptusan divlja gorušica meke pastile

**Nemojte uzimati Streptusan divlja gorušica meke pastile:**

- ako ste alergični na zelen divlje gorušice ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

#### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ako simptomi potraju tijekom primjene ovog lijeka ili ako se pojave nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku.

Odmah se obratite liječniku ako se pojavi dispneja, vrućica ili gnojna sluz.

Ovaj lijek sadrži aromu s cinamalom.

Cinamal može uzrokovati alergijske reakcije.

## **Djeca**

Primjena Streptusan divlja gorušica mekih pastila nije preporučena u djece mlađe od 6 godina zbog rizika od gutanja mekih pastila te zbog nedostatka odgovarajućih podataka.

## **Drugi lijekovi i Streptusan divlja gorušica meke pastile**

Interakcije nisu prijavljene. Nisu provedena ispitivanja u svrhu istraživanja interakcija ovog lijeka s drugim lijekovima. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

## **Streptusan divlja gorušica meke pastile s hranom, pićem i alkoholom**

Interakcija se ne očekuje. Međutim, nema dostupnih podataka.

## **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

### **Trudnoća**

Sigurnost tijekom trudnoće nije utvrđena. Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, ne preporučuje se primjena Streptusan divlja gorušica mekih pastila tijekom trudnoće.

### **Dojenje**

Nije poznato izlučuje li se djelatna tvar ili njeni metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Stoga se Streptusan divlja gorušica meke pastile ne smiju koristiti tijekom dojenja.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ne očekuje se gubitak sposobnosti. Međutim, nisu provedena nikakva ispitivanja o učincima lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

## **Streptusan divlja gorušica meke pastile sadrže maltitol i sorbitol**

Ovaj lijek sadrži 441 mg maltitola i 100 mg tekućeg sorbitola u svakoj mekoj pastili. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek.

## **3. Kako uzimati Streptusan divlja gorušica meke pastile**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

- adolescenti u dobi od 12 godina, odrasli i stariji 1 meku pastilu 10 do 12 puta dnevno

### **Primjena u djece**

- preporučena doza u djece u dobi od 6 do 11 godina je 1 meka pastila 5 do 6 puta dnevno

Primjena u djece mlađe od 6 godina se ne preporučuje (pogledajte dio 2. "Djeca").

## **Primjena u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre**

Nije dostupna dovoljna količina podataka kako bi se odredila preporučena doza bolesnicima s oštećenom funkcijom jetre ili bubrega. Stoga se ne preporučuje primjena Streptusan divlja gorušica mekih pastila kod ove skupine bolesnika.

## **Način primjene**

Meku pastilu otopite u ustima bez žvakanja.

### **Trajanje liječenja**

Ako se simptomi pogoršaju ili potraju dulje od 1 tjedna, potrebno je obratiti se liječniku (pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza").

### **Ako uzmete više Streptusan divlja gorušica mekih pastila nego što ste trebali**

Nije prijavljen slučaj predoziranja.

Ako ste slučajno uzeli dvostruku ili trostruku dozu Streptusan divlja gorušica mekih pastila, u pravilu se ne očekuje pojava neželjenih posljedica ili simptoma. Nastavite s primjenom ovog lijeka kako je propisano doziranjem ili kako Vam je rekao liječnik. Ako uzmete znatno veću količinu nego što je preporučena doza opisana u ovoj uputi, obratite se liječniku.

### **Ako ste zaboravili uzeti Streptusan divlja gorušica meke pastile**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nastavite liječenje kako je opisano u ovoj uputi o lijeku ili kako Vam je rekao liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave nisu prijavljene.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Streptusan divlja gorušica meke pastile**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Streptusan divlja gorušica meke pastile sadrže**

1 meka pastila sadrži:

- 10 mg suhog ekstrakta iz *Sisymbrium officinale* (L.) Scop., herba (6-8:1), ekstrakcijsko otapalo: voda.

Drugi sastojci su:

tekući maltitol (E965), akacija (E414), tekući sorbitol (nekrystalizirajući) (E420), trigliceridi srednje duljine lanca, sukraloza (E955), kukuruzni škrob, pročišćena voda, maltodekstrin, aroma med-limun-verbena (sadrži cinamal).

Jedna meka pastila sadrži 100 mg sorbitola.

### **Kako Streptusan divlja gorušica meke pastile izgledaju i sadržaj pakiranja**

Streptusan divlja gorušica meke pastile su smečkaste, okrugle meke pastile promjera 16 mm u Al/PVC/PE/PVDC blisterima.

Jedno pakiranje sadrži 10, 12, 20, 24, 30, 36, 40 ili 48 mekih pastila.  
Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 269d  
10000 Zagreb  
Hrvatska

Proizvođač

BOLDER Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Rheinische Allee 11  
50858 Köln  
Njemačka

**Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:**

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgija    | Streptuss heeskruid zuigtabletten                                                         |
| Bugarska   | StrepTuss Sisymbrium 10 mg lozenges<br>СтрепТус Лечебна Мъдрица 10 mg таблетки за смучене |
| Češka      | Strevox se sisymbriem měkké pastilky                                                      |
| Danska     | StrepHost                                                                                 |
| Estonija   | Streptusol                                                                                |
| Finska     | Strepsolve lääkepastilli                                                                  |
| Francuska  | ERYSIMUM RECKITT HEALTHCARE, pastille                                                     |
| Grčka      | Strepcough Sissibrium                                                                     |
| Hrvatska   | Streptusan divlja gorušica meke pastile                                                   |
| Island     | StrepHost                                                                                 |
| Italija    | Benactuss Tosse secca e Gola Irritata                                                     |
| Latvija    | Streptusol pastilas                                                                       |
| Litva      | Streptusol 10 mg minkštosios pastilės                                                     |
| Mađarska   | StrepTuss 10 mg pasztilla                                                                 |
| Nizozemska | Streptuss heeskruid zuigtabletten                                                         |
| Njemačka   | Dobendan Husten & Halsreizung Wegrauke                                                    |
| Norveška   | Strepsolve Pastiller                                                                      |
| Poljska    | Strepsils Natur kaszel suchy i chrypka                                                    |
| Portugal   | Streptosse Tosse Seca pastilhas                                                           |
| Rumunjska  | StrepTuss Brâncuță 10 mg pastile                                                          |
| Slovačka   | Strevox so sisymbriom 10 mg mäkké pastilky                                                |
| Slovenija  | Navadni dihenik Streptusan mehke pastile                                                  |
| Španjolska | Streptos erísimo pastillas para chupar                                                    |
| Švedska    | Strepsolve                                                                                |

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji put revidirana u svibnju 2025.**

