

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Streptusan trputac sirup

suhi ekstrakt lista trputca
(*Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum*)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Streptusan trputac sirup i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Streptusan trputac sirup
3. Kako uzimati Streptusan trputac sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Streptusan trputac sirup
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Streptusan trputac sirup i za što se koristi

Streptusan trputac sirup je tradicionalni biljni lijek koji se primjenjuje za ublažavanje simptoma nadraženosti usne šupljine ili ždrijela i povezanog suhog kašlja.

Ovaj lijek je tradicionalni biljni lijek za primjenu u navedenoj indikaciji isključivo na temelju dugotrajne primjene.

Ovaj lijek je indiciran kod odraslih, adolescenata i djece od 3 godine starosti.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Streptusan trputac sirup

Nemojte uzimati Streptusan trputac sirup

- ako ste alergični na uskolisni trputac ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Streptusan trputac sirup.

Odmah se obratite liječniku ako se simptomi pogoršaju, ako osjetite nedostatak zraka, vrućicu ili gnojnu sluz (žučkasti ispljuvak) tijekom primjene ovog lijeka.

Primjena kod bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre

Ako bolujete od zatajenja bubrega ili oštećenja jetre, molimo da se obratite svojem liječniku ili ljekarniku prije uzimanja Streptusan trputac sirupa. Podaci o preporučenoj dozi nisu ustanovljeni u ovih bolesnika.

H A L M E D
16 - 09 - 2025
ODOBRENO

Djeca

Primjena Streptusan trputac sirupa nije preporučena u djece ispod 3 godine starosti zbog potrebe za liječničkim savjetom i zbog nedostatka odgovarajućih podataka.

Drugi lijekovi i Streptusan trputac sirup

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu provedena ispitivanja interakcija. Međutim, interakcije s drugim lijekovima nisu prijavljene.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Sigurnost tijekom trudnoće nije utvrđena. Zbog nedostatka podataka, ne preporučuje se primjena tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se djelatna tvar ili njeni metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Stoga se Streptusan trputac sirup ne smije koristiti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena nikakva ispitivanja o učincima lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Streptusan trputac sirup sadrži tekući maltitol (sadrži maltitol i sorbitol)

Ovaj lijek sadrži do 225 mg sorbitola u 5 ml što odgovara 45 mg/ml. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Može imati blagi laksativni učinak. Kalorijska vrijednost tekućeg maltitola je 2,3 kcal/g.

Streptusan trputac sirup sadrži etanol (alkohol).

Ovaj lijek sadrži 78,5 mg alkohola (etanol) u svakoj pojedinačnoj dozi što odgovara 7,85 mg/ml (0,785 % (w/v)). Količina u 10 ml ovog lijeka odgovara manje od 2 ml piva ili 1 ml vina.

Mala količina alkohola u ovom lijeku neće imati značajniji učinak.

3. Kako uzimati Streptusan trputac sirup

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Adolescenti u dobi od 12 godina, odrasli i stariji:

10 ml sirupa tri do četiri puta dnevno.

Djeca u dobi od 5 do 11 godina:

10 ml sirupa 3 puta dnevno.

Djeca u dobi od 3 do 4 godine:

5 ml sirupa tri puta dnevno.

Primjena u djece

Primjena Streptusan trputac sirupa nije preporučena u djece mlađe od 3 godine zbog potrebe za liječničkim savjetom i nedostatka odgovarajućih podataka.

H A L M E D

16 - 09 - 2025

ODOBRENO

Primjena u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre

Molimo pogledajte dio 2.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Za pravilno doziranje je potrebno primijeniti priloženu odmjernu žlicu, koristeći odgovarajuće oznake 2,5 ml i 5 ml.

Protresite bočicu prije uporabe.

Trajanje liječenja

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje, ako se osjećate lošije ili ako se simptomi ne povuku nakon 7 dana.

Ako uzmete više Streptusan trputac sirupa nego što ste trebali

Nije prijavljen slučaj predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Streptusan trputac sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nisu poznate.

Ako primijetite nuspojave, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V.**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Streptusan trputac sirup

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Tijekom čuvanja može doći do pojave taloga. To ne utječe na kvalitetu lijeka.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C nakon prvog otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne smije se upotrebljavati dulje od 3 mjeseca nakon prvog otvaranja bočice.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Streptusan trputac sirup sadrži

H A L M E D

16 - 09 - 2025

ODOBRENO

- Djelatna tvar je suhi ekstrakt lista trputca. Svaki ml (odgovara 1,2 g) sirupa sadrži 30 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Plantago lanceolata* L., folium (trpučev list) (DER 3-5:1). Ekstrakcijsko otapalo: etanol 20 % (m/m)
- Drugi sastojci su: maltodekstrin, tekući maltitol (E965), ksantanska guma (E415), kalijev sorbat (E202), citratna kiselina (E330), prirodna aroma med-limun-verbena (aroma sadrži etanol), pročišćena voda.

Kako Streptusan trputac sirup izgleda i sadržaj pakiranja

Sirup je smeđa tekućina karakterističnog mirisa, pakiran u bočice volumena 100 ili 200 ml.

Bočice su pakirane u kartonske kutije s uputom o lijeku i odmjernom žlicom.

Veličina pakiranja 100 ml i 200 ml: odmjerna žlica pokazuje dvije različite skale, uključujući oznake od 2,5 i 5 ml.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
Hrvatska

Proizvođač

Phytopharm Kłęka S.A.
Kłęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Poljska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija	StrepHustan Spitzwegerich Hustenstiller Sirup
Belgija	Streptuss weegbree siroop Streptuss plantain sirop Streptuss Wegerich Sirup
Bugarska	StrepTuss Plantain 30 mg/ml, syrup СтрепТус Живовляк 30 mg/ml сироп
Češka	Strevox sirup
Njemačka	Dobendan Hustenstiller
Danska	StrepHost Tør
Estonija	Septils
Grčka	StrepCough Plantain
Španjolska	Streptos llantén 30 mg/ml jarabe
Finska	Streptus siirappi
Francuska	SILASILS SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide
Mađarska	StrepTuss 30 mg/ml szirup
Hrvatska	Streptusan trputac sirup
Island	StrepHost Tør
Italija	Benactuss Tosse Secca E Emolliente Gola
Latvija	Septils sīrups
Litva	Septils Plantaginis lanceolatae folium 30 mg/ml siroop
Nizozemska	Streptuss weegbree siroop, stroop
Norveška	Streplieve
Poljska	Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

HALMED

16 - 09 - 2025

ODOBRENO

Portugal	StrepTosse Tosse Seca
Rumunjska	StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop
Švedska	Streplieve
Slovenija	Trpotec Streptusan sirup
Slovačka	Strevox 30 mg/ml sirup

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u kolovozu 2025.