Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Supremin Forte 7,5 mg/5 ml sirup
butamiratcitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana (djeca mlađa od 12 godina) ili 4 do 5 dana (djeca starija od 12 godina i odrasli).

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Supremin Forte i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Supremin Forte
3. Kako uzimati Supremin Forte
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Supremin Forte
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Supremin Forte i za što se koristi

Supremin Forte sadrži djelatnu tvar butamiratcitrat, koja pripada skupini lijekova za liječenje kašlja koji se zovu antitusici.

Supremin Forte se koristi za simptomatsko liječenje neproduktivnog (suhog) kašlja.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana (djeca mlađa od 12 godina) ili 4 do 5 dana (djeca starija od 12 godina i odrasli).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Supremin Forte

Nemojte uzimati Supremin Forte
- ako ste alergični na butamiratcitrat ili neku od pomoćnih tvari ovog lijeka (navedenih u dijelu 6).
- kod djece mlađe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Supremin Forte.

Prije upotrebe lijeka protiv kašlja, trebali biste saznati uzrok kašlja i odlučiti sa svojim liječnikom ili ljekarnikom treba li ga liječiti odgovarajućim lijekom. Ako je kašalj otporan na lijek protiv kašlja u preporučenoj dozi, nemojte povećavati preporučenu dozu, već se posavjetujte s liječnikom.

Ovaj lijek protiv kašlja ne smije se koristiti dulje vrijeme.

Nemojte koristiti ovaj lijek protiv kašlja dulje nego što Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

HALMED
28 - 10 - 2026
ODOBRENO

Ovaj lijek potiskuje refleks kašlja. Trebali biste izbjegavati istodobno uzimanje s nekim drugim lijekovima protiv kašlja koji se nazivaju "ekspektoransi" jer to može dovesti do nakupljanja sluzi u plućima, što može uzrokovati poteškoće s disanjem i/ili infekciju pluća.

Djeca i adolescenti
Nemojte koristiti Supremin Forte kod djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Supremin Forte
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trebali biste izbjegavati istodobno uzimanje lijeka Supremin Forte s nekim drugim lijekovima protiv kašlja koji se nazivaju "ekspektoransi" jer to može dovesti do nakupljanja sluzi u plućima, što može uzrokovati poteškoće s disanjem i/ili infekciju pluća.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, nemojte koristiti Supremin Forte osim ako Vam to ne preporuči liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima
Supremin Forte može uzrokovati pospanost. Supremin Forte treba koristiti s oprezom ako vozite ili upravljate strojevima.

Supremin Forte sadrži sorbitol, natrij, propilenglikol, natrijev benzoat.
Ovaj lijek sadrži 2250 mg sorbitola u 5 ml, što odgovara 450 mg/ml.

Sorbitol je izvor fruktoze. Ako nepodnosite neke šećere ili imate nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki genetski poremećaj u kojem osoba ne može razgraditi fruktozu sadržanu u ovom lijeku, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što uzmete ili primite ovaj lijek.
Sorbitol može uzrokovati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po 5 ml, tj. zanemarive količine natrija.

Ovaj lijek sadrži 16,9 mg propilenglikola u 5 ml, što odgovara 3,38 mg/ml.

Ovaj lijek sadrži 5,0 mg natrijevog benzoata (E 211) u 5 ml, što odgovara 1,0 mg/ml.

3. Kako uzimati Supremin Forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:
Odrasli: 15 ml do 4 puta dnevno.

Primjena u djece u adolescenata
Djeca od 6 do 12 godina starosti: 10 ml do 3 puta dnevno.
Djeca starija od 12 godina: 15 ml do 3 puta dnevno.

Koristite najmanju učinkovitu dozu najkraće moguće vrijeme. Ne prekoračujte preporučenu dozu.

Samo za primjenu kroz usta.
Za pravilno doziranje koristite priloženu odmjernu čašicu. Potrebno je isprati i posušiti odmjernu čašicu nakon svake uporabe i između različitih korisnika.

Trebali biste prestati uzimati ovaj lijek kada simptomi nestanu.

HALMED
28 - 10 - 2026
ODOBRENO

Obratite se liječniku ako kašalj traje dulje od 3 dana (djeca mlađa od 12 godina) ili dulje od 4 do 5 dana (djeca starija od 12 godina i odrasli), ili ako se razvije vrućica, kratkoća daha ili bol u prsima.

Ako uzmete više lijeka Supremin Forte nego što ste trebali
Ako ste slučajno uzeli previše lijeka Supremin Forte odmah se obratite svom liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Supremin Forte
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih nuspojava:
- pospanost
- mučnina
- proljev
- svrbež kože
- alergijske reakcije

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Supremin Forte

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake „EXP". Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.
Rok valjanosti nakon prvog otvaranja bočice: 6 mjeseci

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Supremin Forte sadrži

- Djelatna tvar je butamiratcitrat.
- 5 ml sirupa sadrži 7,5 mg butamiratcitrata.
- Ostali sastojci su: sorbitol (E420), glicerol, sukraloza (E955), natrijev benzoat (E211), citratna kiselina hidrat, okus karamel (sadrži: tvari za poboljšanje okusa**,** pripravke za aromatiziranje**,** prirodne tvari za okus**,** propilenglikol (E1520)), okus gorka čokolada F2428 (sadrži: tvari za poboljšanje okusa**,** pripravke za aromatiziranje, kinin klorid, prirodne tvari za okus**,** propilenglikol (E1520)**,** voda**,** kvasin), pročišćena voda.

HALMED
28 - 10 - 2026
ODOBRENO

Kako Supremin Forte izgleda i sadržaj pakiranja

Supremin Forte sirup je bezbojna do svijetložuta tekućina.

Supremin Forte sirup je pakiran u staklenu ili plastičnu bočicu od 100 ml ili 200 ml s navojnim plastičnim čepom sigurnim za djecu. Svako pakiranje sadrži plastičnu odmjernu čašicu graduiranu za doziranje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Proizvođač
Balkanpharma Troyan AD
1 Krayrechna Street
5600 Troyan
Bugarska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:
Danska: Tinguri
Rumunjska: StopTussin 1,5 mg/ml sirop

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u listopadu 2026.

HALMED
28 - 10 - 2026
ODOBRENO