

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Symbicort 160 mikrograma/4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija *budezonid/ formoterolfumarat dihidrat*

Pazljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Symbicort i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Symbicort
3. Kako primjenjivati Symbicort
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Symbicort
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Symbicort i za što se koristi

Symbicort je inhalator koji se koristi za liječenje simptoma kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB) u odraslih u dobi od 18 i više godina. KOPB je dugotrajna bolest dišnih putova u plućima, koju često uzrokuje pušenje cigareta. Symbicort sadrži dva različita lijeka: budezonid i formoterolfumarat dihidrat.

- Budezonid pripada skupini lijekova koji se nazivaju "kortikosteroidi". Djeluje na način da smanjuje i sprječava oticanje i upalu u Vašim plućima.
- Formoterolfumarat dihidrat pripada skupini lijekova koji se nazivaju "dugodjelujući agonisti beta₂-adrenoreceptora" ili "bronhodilatatori". Djeluje na način da opušta mišićje dišnih putova, čime Vam pomaže da lakše dišete.

Nemojte koristiti ovaj lijek kao inhalator za neposredno ublažavanje simptoma.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Symbicort

Nemojte primjenjivati Symbicort:

- ako ste alergični na budezonid, formoterol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Symbicort ako:

- bolujete od šećerne bolesti.
- imate infekciju pluća.
- imate visoki krvni tlak ili ste ikada imali probleme sa srcem (uključujući i neravnomjerne otkucaje srca, vrlo brz puls, suženje arterija ili zatajenje srca).
- imate tegobe vezane uz štitnjaču ili nadbubrežne žlijezde.
- imate nisku razinu kalija u krvi.
- imate teške probleme s jetrom.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Djeca i adolescenti

Symbicort se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Symbicort

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete, nedavno ste primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Posebno obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- beta-blokatore (kao što su atenolol ili propranolol za liječenje visokog krvnog tlaka), što uključuje i kapi za oči (poput timolola za liječenje glaukoma).
- lijekove za liječenje ubrzanih ili neravnomjernih otkucaja srca (poput kinidina).
- lijekove poput digoksina, koji se često koristi za liječenje zatajenja srca.
- diuretike, poznate i kao 'tablete za vodu' (poput furosemida). Oni se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka.
- steroide predviđene za uzimanje kroz usta (poput prednizolona).
- ksantine (kao što su teofilin ili aminofilin). Ovi lijekovi se često koriste za liječenje kopb-a ili astme.
- druge bronhodilatatore (kao što je salbutamol).
- tricikličke antidepresive (kao što je amitriptilin) i antidepresiv nefazodon.
- fenotiazine (kao što su klorpromazin i proklorperazin).
- lijekove nazvane 'inhibitorima hiv-proteaze' (poput ritonavira), za liječenje infekcije virusom koji izaziva imunodeficienciju u ljudi (hiv; od engl. *human immunodeficiency virus*).
- lijekove za suzbijanje infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klaritromicin i telitromicin).
- lijekove za liječenje parkinsonove bolesti (poput levo-dope).
- lijekove za liječenje problema sa štitnjačom (poput levo-tiroksina).

Ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas ili ako niste sigurni, prije uporabe lijeka Symbicort porazgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Također obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko ćete morati biti uvedeni u opću anesteziju zbog kirurškog ili stomatološkog zahvata.

Trudnoća, dojenje i plodnost

- Ako ste trudni ili planirate imati dijete, porazgovarajte sa svojim liječnikom prije uporabe lijeka Symbicort – nemojte uzimati Symbicort, osim ako Vam tako nije rekao Vaš liječnik.
- Zatrudnite li tijekom uporabe lijeka Symbicort, lijek nemojte prestati uzimati, ali odmah porazgovarajte sa svojim liječnikom.
- Ako dojite, porazgovarajte sa svojim liječnikom prije uporabe lijeka Symbicort.

Upravljanje vozilima i strojevima

Symbicort ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, te rukovanja alatima ili strojevima.

3. Kako primjenjivati Symbicort

- Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.
- Važno je da Symbicort uzimate svakodnevno, čak i ako trenutno nemate simptome KOPB-a.

Uobičajena doza je 2 inhalacije dvaput dnevno. Symbicort se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ukoliko za liječenje Vašeg KOPB-a uzimate steroidne tablete, Vaš liječnik može smanjiti broj tableta koje uzimate, kad jednom počnete uzimati Symbicort. Ukoliko uzimate oralne steroidne tablete dulje vrijeme, Vaš liječnik će možda htjeti provjeriti Vaše nalaze krvi s vremena na vrijeme. Prilikom smanjivanja uzimanja oralnih steroidnih tableta, mogli biste se osjećati općenito loše, iako bi moglo doći do poboljšanja Vaših simptoma u prsima. Mogli biste osjetiti simptome poput začepljenog nosa ili curenja nosa, slabosti ili bolova u zglobovima ili mišićima, te osipa (ekcema). Ukoliko Vam bilo koji od ovih simptoma smeta, ili ukoliko se

pojave simptomi poput glavobolje, umora, mučnine ili povraćanja, molimo odmah se javite svom liječniku. Možda ćete morati uzeti drugi lijek ukoliko se pojave simptomi alergije ili artritisa. Morate razgovarati sa svojim liječnikom ako niste sigurni trebate li nastaviti uzimati Symbicort.

Vaš liječnik će razmotriti uvođenje dodatnih steroidnih tableta u Vaš uobičajen režim liječenja za vrijeme razdoblja stresa (npr. kada imate infekciju u prsima ili prije operacije).

Važne informacije o Vašim simptomima KOPB-a

Osjećate li da tijekom razdoblja uzimanja lijeka Symbicort ostajete bez zraka ili Vam u prsima "zviždi", morate nastaviti uzimati Symbicort, ali se čim prije obratite svom liječniku, jer je moguće da Vam je potrebno dodatno liječenje.

Odmah se obratite svom liječniku ako:

- Sve teže dišete ili se često noću budite uz osjećaj nedostatka zraka.
- Ujutro počinjete osjećati stezanje u prsima ili stezanje u prsima potraje dulje nego obično.
- Ovi znakovi mogu upućivati na to da nad Vašim KOPB-om nije uspostavljena primjerena kontrola te da Vam je neodgodivo potrebno drugačije ili dodatno liječenje.

Vaš liječnik može propisati i druge bronhodilatatore, na primjer antikolinergike (kao što je tiotropij ili ipratropij bromid) za Vaš KOPB.

Informacije o lijeku Symbicort

- Prije nego počnete uzimati Symbicort, izvadite ga iz omota od folije. Bacite omot zajedno s tvari za isušivanje koja se nalazi unutar omota. Ako je tvar za isušivanje iscurila iz svog pakiranja, nemojte koristiti inhalator.
- Nakon što izvadite inhalator iz omota, trebate ga upotrijebiti unutar 3 mjeseca. Napišite rok valjanosti (3 mjeseca od datuma otvaranja omota) na naljepnicu inhalatora kako biste znali kada prestati koristiti inhalator.
- Dijelovi Vašeg inhalatora prikazani su na slici. Inhalator ćete dobiti sastavljen. Nemojte ga rastavljati. Ako se spremnik olabavi, vratite ga natrag u inhalator i nastavite koristiti inhalator.



Priprema inhalatora Symbicort

Vaš inhalator morate pripremiti za uporabu u sljedećim situacijama:

- Ako koristite svoj novi Symbicort prvi put.
- Ako niste koristili inhalator duže od 7 dana.
- Ako Vam je inhalator ispao.

Kako biste inhalator pripremili za uporabu, slijedite donje upute:

1. Dobro protresite inhalator tijekom najmanje 5 sekundi kako biste promiješali sadržaj spremnika s aerosolom.
2. Skinite poklopac za nastavak za usta nježnim pritiskom na izbočine sa strane. Traka na poklopcu za nastavak za usta ostat će pričvršćena za inhalator.
3. Držite inhalator uspravno. Zatim pritisnite brojač (na vrhu inhalatora) kako biste ispustili potisak u zrak. Možete koristiti jednu ili obje ruke, kako je prikazano na slikama.



4. Maknite prst(e) s brojača.
5. Pričekajte 10 sekundi, dobro protresite i ponovite korake 3 i 4.
6. Vaš inhalator je sada spreman za uporabu.

Kako udahnuti lijek

Svaki put kada trebate uzeti dozu lijeka, slijedite donje upute:

1. Dobro protresite inhalator tijekom najmanje 5 sekundi kako biste promiješali sadržaj spremnika s aerosolom.
2. Skinite poklopac za nastavak za usta nježnim pritiskom na izbočine sa strane. Provjerite da nastavak za usta nije začepljen.
3. Držite inhalator uspravno (koristeći jednu ili obje ruke). Lagano izdahnite.
4. Nastavak za usta nježno postavite između zubi. Zatvorite usne.
5. Počnite udisati na usta polako i duboko. Čvrsto pritisnite brojač (na vrhu inhalatora) kako biste ispustili potisak. Nastavite udisati još kratko vrijeme nakon što ste pritisnuli brojač. Udisanje istodobno s pritiskom na brojač osigurava dospijanje lijeka u Vaša pluća.
6. Zadržite dah 10 sekundi ili do granice neugode.
7. Prije nego izdahnete, maknite prst s brojača i maknite inhalator iz usta. Držite inhalator uspravno.
8. Zatim polako izdahnite. Za uzimanje druge doze, dobro protresite inhalator tijekom najmanje 5 sekundi i ponovite korake 3 do 7.
9. Vratite poklopac za nastavak za usta.
10. Nakon svoje dnevne jutarnje i večernje doze isperite usta vodom i ispljunite.



Njegovatelji moraju osigurati da bolesnici kojima je propisan Symbicort primjenjuju ispravnu tehniku inhalacije. Uporaba s komorom za inhalaciju još nije ispitana.

Korištenje inhalacijske komore


Vaš liječnik, medicinska sestra ili ljekarnik, mogu Vam preporučiti korištenje inhalacijske komore (npr. **AeroChamber Plus Flow Vu ili AeroChamber Plus**). Slijedite upute za upotrebu u uputi koja se nalazi u svakom pakiranju inhalacijske komore.

Čišćenje inhalatora Symbicort

- Obrišite nastavak za usta iznutra i izvana suhim rupčićem najmanje jedanput tjedno.
- Nemojte koristiti vodu ili tekućine i nemojte vaditi spremnik iz inhalatora.

Kako ću znati kada moram zamijeniti svoj inhalator?

- Brojač na vrhu inhalatora Vam pokazuje koliko je potisaka (doza) ostalo u inhalatoru. Početni broj iznosi 120 potisaka kada je inhalator pun.



- Svaki put kada primijenite dozu ili ispustite potisak u zrak, strelica na brojaču pomiče se prema nuli ('0').

- Kada strelica prvi put uđe u žuto polje, znači da Vam je preostalo još oko 20 potisaka.



- Kada strelica dopiše na '0', morate prestati koristiti Vaš inhalator. Možda će se činiti da Vaš inhalator nije prazan te da i dalje pravilno radi. Međutim, nećete dobiti točnu količinu lijeka ako ga nastavite koristiti.

Ako primijenite više lijeka Symbicort nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Symbicort nego što ste trebali, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet. Mogu se javiti sljedeći učinci: drhtanje, glavobolja ili ubrzani otkucaji srca.

Ako ste zaboravili primijeniti Symbicort

- Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. No, ako se bliži vrijeme kada biste po rasporedu trebali uzeti sljedeću dozu, zaboravljenu dozu preskočite.
- **Nemojte** uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Symbicort

Prije nego prestanete uzimati Symbicort, trebate porazgovarati sa svojim liječnikom ili ljekarnikom. Ako prestanete uzimati Symbicort, znakovi i simptomi Vašeg KOPB-a mogu se pogoršati.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo što od dolje navedenog, odmah prestanite uzimati Symbicort i odmah se obratite svom liječniku:

- Oticanje lica, posebno oko usta (jezik i/ili grlo i/ili otežano gutanje) ili koprivnjaču popraćenu otežanim disanjem (angioedem) i/ili iznenađan osjećaj da ćete se onesvijestiti. To može značiti da imate alergijsku reakciju. Ona se javlja rijetko, u manje od 1 na 1000 osoba.
- Iznenadna akutna pojava „zviždanja u prsima“ ili nedostatka zraka odmah nakon korištenja inhalatora. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prestanite koristiti svoj inhalator Symbicort i upotrijebite svoj inhalator za neposredno ublažavanje simptoma (*reliever*). Odmah kontaktirajte svog liječnika, budući da ćete možda morati promijeniti terapiju. Ovo se događa vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 ljudi.

Druge moguće nuspojave:

Česte (mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba)

- Palpitacije (osjećaj lupanja srca), drhtavica ili tresavica. Dogode li se ove nuspojave, one su obično blage i obično nestaju s daljnjim uzimanjem lijeka Symbicort.
- Kandidijaza (gljivična infekcija) usne šupljine. Ta pojava manje je vjerojatna ukoliko nakon svake uporabe lijeka Symbicort usta isperete vodom.
- Blaga grlobolja, kašalj i promuklost.
- Glavobolja.

- Upala pluća (infekcija pluća) u bolesnika s KOPB-om

Obavijestite svog liječnika ako se pri primjeni lijeka Symbicort pojavi bilo koja od sljedećih nuspojava - može se raditi o simptomima infekcije pluća:

- vrućica ili zimica
- pojačano lučenje sluzi, promjena boje sluzi
- pojačan kašalj ili otežano disanje

Manje česte (mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba)

- Osjećaj nemira, nervoze ili uznemirenosti.
- Poremećaj spavanja.
- Omaglica.
- Mučnina.
- Ubrzani otkucaji srca.
- Pojava modrica na koži.
- Grčevi u mišićima.
- Zamućen vid.

Rijetke (mogu se javiti u najviše 1 na 1 000 osoba)

- Osip, svrbež.
- Bronhospazam (stezanje mišića dišnih putova, što uzrokuje "zviždanje u prsima"). Ako zviždanje uslijedi naglo nakon uporabe lijeka Symbicort, prestanite ga koristiti i odmah porazgovarajte sa svojim liječnikom.
- Niska razina kalija u krvi.
- Neravnomjerni otkucaji srca.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba)

- Depresija.
- Promjene ponašanja, pogotovo u djece.
- Bol ili stezanje u prsima (angina pectoris).
- Povećanje količine šećera (glukoze) u krvi.
- Promjene okusa, poput neugodnog okusa u ustima.
- Promjene krvnog tlaka.

Inhalacijski kortikosteroidi mogu utjecati na normalno stvaranje steroidnih hormona u Vašem tijelu, osobito ukoliko ih uzimate u visokim dozama kroz dulje vrijeme. Učinci uključuju:

- promjene u mineralnoj gustoći kostiju (smanjenje gustoće kostiju)
- mrenu (zamućenje očne leće)
- glaukom (porast očnog tlaka)
- usporavanje brzine rasta u djece i adolescenata
- učinak na nadbubrežnu žlijezdu (malu žlijezdu smještenu neposredno pokraj bubrega).

Vjerojatnost nastanka ovih učinaka je puno manja uz primjenu inhalacijskih kortikosteroida nego uz primjenu kortikosteroida u obliku tableta.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V](#)**. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Symbicort

- Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici, kutiji ili omotu iza oznake „Rok valjanosti“ ili „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenoga mjeseca.
- Kao i kod većine inhalacijskih lijekova u spremniku pod pritiskom, terapijski učinak ovog lijeka može biti smanjen kada je spremnik hladan. Za najbolje rezultate, ovaj lijek treba držati na sobnoj temperaturi prije primjene. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Zaštitite od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti.
- Nakon što izvadite inhalator iz omota od folije, trebate ga upotrijebiti unutar 3 mjeseca. Napišite rok valjanosti (3 mjeseca od datuma otvaranja omota) na naljepnicu inhalatora kako biste znali kada prestati koristiti inhalator.
- Nakon primjene uvijek vratite poklopac za nastavak za usta i čvrsto ga gurnite na mjesto.
- Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Upozorenje: Spremnik sadrži stlačenu tekućinu. Ne izlažite ga temperaturama iznad 50 °C. Ne bušite spremnik. Spremnik se ne smije lomiti, bušiti ili paliti, čak ni kada se čini prazan.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Symbicort sadrži

Djelatne tvari su budezonid i formoterolfumarat dihidrat. Svaki potisak (doza) sadrži 160 mikrograma budezonida i 4,5 mikrograma formoterolfumarata dihidrata.

Pomoćne tvari su apafluran (HFA 227), povidon i makrogol. Ovaj inhalator ne sadrži CFC.

Ovaj lijek sadrži fluorirane stakleničke plinove. Jedan inhalator sadrži 10,6 g apaflurana (HFC-227ea), što odgovara 0,034 tone ekvivalenta CO₂ (potencijal globalnog zagrijavanja [engl. *global warming potential*, GWP] = 3220).

Kako Symbicort izgleda i sadržaj pakiranja

Symbicort je inhalator u kojem se nalazi Vaš lijek. Stlačeni spremnik s pričvršćenim pokazivačem doze, koji sadrži bijelu suspenziju za inhalaciju. Spremnik je uložen u crveni plastični aktivator čiji su sastavni dio bijeli plastični nastavak za usta i integrirani sivi plastični zaštitni poklopac. Svaki inhalator sadrži 120 potisaka (doza), nakon prvotne pripreme inhalatora. Svaki inhalator se nalazi u zasebnom omotu od folije koji sadrži tvar za isušivanje.

Symbicort 160 mikrograma/4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija (budezonid/formoterolfumarat dihidrat) dostupan je u pakiranju koje sadrži jedan inhalator.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AstraZeneca d.o.o.
Ulica Vjekoslava Heinzela 70
10 000 Zagreb
Hrvatska

Proizvođač

AstraZeneca Dunkerque Production
224 Avenue de la Dordogne
59640 Dunkerque
Francuska

Ovaj lijek je odobren u zemljama članicama EEZ pod sljedećim nazivima:

Država	Trgovački naziv i jačina
Austrija	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Belgija	Symbicort 160 microgram /4,5 microgram/inhalatie, aërosol, suspensie

	Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm/Inhalation, Druckgasinhalation, Suspension
Bugarska	Симбикорт 160 микрограма /4,5 микрограма/впръскване Суспензия под налягане за инхалация
Hrvatska	Symbicort 160 mikrograma /4,5 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija
Cipar	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Česka	Symbicort 160 mikrogramů /4,5 mikrogramů
Danska	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Estonija	Symbicort
Finska	Symbicort 160 mikrog /4.5 mikrog/inhalaatio
Francuska	Symbicort 200 micro grammes /6 micro grammes par inhalation
Njemačka	Symbicort 160 Mikrogramm /4,5 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Suspension
Grčka	Symbicort 160 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/ψεκασμό
Mađarska	Symbicort 4,5 mikrogramm /160 mikrogramm túlnyomásos inhalációs szuszpenzió
Island	Symbicort 160 mikrógrömm /4,5 mikrógrömm/ inhalation
Irska	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Italija	Symbicort 160 microgrammi /4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione
Latvija	Symbicort 160 mikrogrami /4.5 mikrogrami/ inhalācijā, izsmidzinājumā, aerosols inhalācijām zem spiediena
Litva	Symbicort 160 mikrogramų /4,5 mikrogramo išpurškime suslėgtoji įkvepiamoji suspensija
Luksemburg	Symbicort 160 microgrammes /4,5 microgrammes/inhalation, suspension pour inhalation en flacon pressurisé
Malta	Symbicort 200 micrograms /6 micrograms/inhalation
Nizozemska	Symbicort 200/6, 200 microgram /6 microgram/inhalatie
Norveška	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/ inhalasjon
Poljska	Symbicort
Portugal	Symbicort 160 microgramas /4,5 microgramas/inalação Suspensão pressurizada para inalação
Rumunjska	Symbicort 160 micrograme /4.5 micrograme/inhalație, suspensie de inhalat presurizată
Slovačka	Symbicort 160 mikrogamov /4,5 mikrogamov/inhalačná dávka
Slovenija	Symbicort 160 mikrogramov /4,5 mikrograma na vdih, inhalacijska suspenzija pod tlakom
Španjolska	Symbicort 160 microgramos /4,5 microgramos/inhalación suspensión para inhalación en envase a presión
Švedska	Symbicort 160 mikrogram /4.5 mikrogram/inhalation
Ujedinjeno Kraljevstvo	Symbicort 200 micrograms/6 micrograms per actuation pressurised inhalation, suspension

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2025.