

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem Triapin 5 mg/5 mg tablete s produljenim oslobađanjem

ramipril, felodipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Triapin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Triapin
3. Kako uzimati Triapin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Triapin
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Triapin i za što se koristi

Triapin tablete sadrže dvije djelatne tvari koje se zovu ramipril i felodipin.

- Ramipril pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Djeluje tako da zaustavlja stvaranje tvari koje podižu krvni tlak te tako Vaše krvne žile opušta i širi.
- Felodipin pripada skupini lijekova koji se zovu antagonisti kalcija. Pomaže u snižavanju krvnoga tlaka opuštajući i šireći Vaše krvne žile.

Triapin tablete koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzija). Visoki krvni tlak može značiti da postoji veća vjerovatnost da ćete imati probleme kao što su srčana bolest, bolest bubrega i moždani udar. Ovaj lijek snizuje Vaš krvni tlak, a time smanjuje i rizik od tih problema.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Triapin

Nemojte uzimati Triapin tablete

- ako ste alergični (preosjetljivi):
 - na ramipril ili na bilo koji drugi ACE inhibitor;
 - na felodipin ili na bilo koji drugi antagonist kalcija;
 - na neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
- ako ste ikada imali tešku alergijsku reakciju zvanu „angioedem“. Znakovi uključuju svrbež, koprivnjaku (urtikariju), crvene mrlje na dlanovima, stopalima i grlu, naticanje grla i jezika, naticanje predjela oko očiju i usana, poteškoće u disanju i gutanju. Uzimanje ovog lijeka može povećati rizik od pojave težeg oblika tog stanja.
- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).

- ako imate problema sa srcem kao što su zatajenje srca, opstrukcije u srcu, nestabilna angina pektoris, srčani poremećaj poznat kao atrioventrikularni blok II. ili III. stupnja, srčani udar (akutni infarkt miokarda) ili moždani udar (poremećaj cirkulacije krvi u mozgu);
- ako imate teški problem s bubrežima;
- ako ste na dijalizi,
- ako imate teški problem s jetrom,
- ako ste trudni, pokušavate zatrudnjeti ili dojite (vidjeti niže dio Trudnoća i dojenje),
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Triapin tablete:

- ako imate problema s bubrežima, šećernu bolest ili uzimate lijekove koji povisuju razinu kalija; liječnik može odrediti uobičajene krvne pretrage, osobito za kontrolu razine kalija u krvi;
- ako uzimate lijekove koji mogu smanjiti razinu natrija u krvi ili imate stanje u kojem se može dogoditi isto; liječnik može provoditi redovite pretrage krvi, posebno provjeru razine natrija u krvi i to naročito ako ste starije dobi
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 - racecadotril, koji se koristi za liječenje proljeva
 - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus)
 - vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti
- ako imate problema s bubrežnom arterijom;
- ako imate suženje glavne krvne žile koja vodi krv iz srca (stenoza aorte) ili bolest srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija);
- ako imate bilo koji drugi problem sa srcem;
- ako imate sistemski eritemski lupus ili sklerodermiju;
- ako patite od problema s jetrom;
- ako ćete primiti anesteziju ili biti operirani;
- ako uzimate lijekove koji smanjuju broj određenih krvnih stanica;
- ako ste crne rase jer lijek može manje učinkovito djelovati na Vaš krvni tlak i možete imati više nuspojava;
- ako planirate liječenje kojim će se smanjiti alergijski učinak na ubod pčele ili ose (desenzibilizacija);
- ako se liječite na način da se Vaša krv obrađuje izvan tijela, kao što je „afereza lipoproteina niske gustoće“.
- ako Vam oticu desni što može biti znak upale desni ili parodontitisa. Možda će biti potrebna pažljiva dentalna higijena da bi se izbjegli dodatni problemi s desnim, kao što je stanje koje uzrokuje povećavanje desni.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 - aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom "Nemojte uzimati Triapin tablete".

Ako niste sigurni odnosi li se na Vas nešto od gore navedenog, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Triapin tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta te biljne lijekove. Ovaj lijek može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. Isto tako, neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje ovog lijeka.

Posebice je važno obavijestiti liječnika ako uzimate ili se liječite s nekim od sljedećih lijekova:

- lijekovi za snižavanje visokog krvnog tlaka (antihipertenzivi), uključujući lijekove koji sadrže aliskiren i drugi lijekovi koji snizuju krvni tlak (nitrati, antipsihotici, narkotici i anestetici)
- lijekovi za liječenje HIV infekcija
- prokainamid (koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma)
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij (npr. amilorid, spironolakton, triamteren) i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)
- pripravci litija (koriste se za liječenje manije, depresije i manično-depresivne bolesti)
- fenitoin, karbamazepin i barbiturati koji se uobičajeno koriste za liječenje epilepsije, napadaja i konvulzija; barbiturati se koriste i za probleme sa spavanjem)
- teofilin (koristi se za liječenje astme)
- simpatomometici kao što su adrenalin, noradrenalin ili efedrin (lijekovi koji djeluju na srce i krvne žile)
- eritromicin, itrakonazol, ketokonazol (koriste se za liječenje infekcija)
- rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze)
- allopurinol (koristi se za liječenje gihta)
- nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL) (koriste se za smanjenje bolova i upale)
- imunosupresivi (koriste se za reumatoidni artritis ili nakon transplantacije organa)
- takrolimus (lijek koji se daje za sprječavanje odbacivanja presađenih organa, kao što su bubreg ili jetra)
- sirolimus, everolimus (lijekovi za sprječavanje odbacivanja presatka)
- racekadotril (lijek za liječenje proljeva)
- temsirolimus (lijek za liječenje raka)
- citostatici (koriste se za liječenje raka)
- inzulin, glibenklamid, metformin, vildagliptin i drugi lijekovi koji se koriste za liječenje šećerne bolesti
- glukokortikoidi („steroidi“)
- gospina trava.

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:

- Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima "Nemojte uzimati Triapin tablete" i "Upozorenja i mjere opreza").

Ako niste sigurni odnosi li se na Vas nešto od gore navedenog, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Triapin tablete s hranom, pićem i alkoholom

- Uzimanje tablete s alkoholom može pojačati učinak lijeka.
- Ne preporučuje se uzimanje ovog lijeka sa sokom od grejpa.
- Povećanje količine soli u Vašoj prehrani može smanjiti učinak ovog lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek:

- ako ste trudni, možete zatrudnjiti ili mislite da ste trudni, jer lijek može našteti Vašoj bebi.
 - ako dojite ili planirate dojiti, jer male količine lijeka mogu prijeći u majčino mlijeko.
- Ako za vrijeme liječenja ovim lijekom posumnjate na trudnoću, odmah obavijestite svog liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon uzimanja lijeka možete osjećati omaglicu ili ošamućenost. U tom slučaju nemojte voziti ili koristiti bilo kakve alete ili strojeve.

Triapin tablete sadrže laktozu i makrogolglicerolhidroksistearat (polioksilirano hidrogenizirano ricinusovo ulje)

Laktoza je vrsta šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Makrogolglicerolhidroksistearat (polioksilirano hidrogenizirano ricinusovo ulje) može uzrokovati nadražaj želuca i proljev.

Triapin tablete sadrže natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Triapin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Triapin 2,5mg/2,5 mg i Triapin 5 mg/5 mg tablete namijenjene su isključivo odraslim osobama.

Uzimanje ovog lijeka

- Lijek uzmite kroz usta.
- Tablete uzimajte na prazan želudac ili nakon laganog obroka.
- Tablete progušujte cijele s pola čaše vode ili drugog pića. Tablete nemojte lomiti, drobiti ili žvakati.
- Nemojte uzimati tablete sa sokom od grejpova ili alkoholom.

Koliko lijeka uzeti

- Uobičajena doza je jedna Triapin 2,5mg /2,5 mg tableta ili jedna Triapin 5 mg/5 mg tableta jednom dnevno.
- Liječnik može početi liječenje s Triapin 2,5mg /2,5 mg tabletama, te prijeći na Triapin 5 mg/5 mg tablete i time Vam povećati dozu.
- Maksimalna doza iznosi dvije Triapin 2,5mg /2,5 mg tablete jednom dnevno ili jedna Triapin 5 mg/5 mg tableta jednom dnevno.
- Ako već uzimate diuretike (lijekove za poticanje mokrenja), liječnik Vam prije početka liječenja s Triapin 2,5 mg /2,5 mg ili Triapin 5 mg/5 mg tabletama može ukinuti ili smanjiti dozu diuretika koji uzimate.

Primjena u djece

Nemojte davati Triapin 2,5mg /2,5 mg ili Triapin 5 mg/5 mg djeci.

Ako uzmete više Triapina nego što ste trebali

Ako uzmete više Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili otidite u hitnu službu najbliže bolnicu. Kutiju lijeka uzmite sa sobom kako bi liječnik znao što ste uzeli. Možete osjećati omaglicu i ošamućenost jer Vam je krvni tlak prenizak.

Ako ste zaboravili uzeti Triapin

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka i sjetite se toga istog dana

- uzmite ju čim se sjetite
- sljedećeg dana uzmite svoju uobičajenu dozu Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg.

H A L M E D

25 - 10 - 2024

O D O B R E N O

Ako ste zaboravili uzeti dozu i sjetite se toga sljedećeg dana

- uzmite samo svoju uobičajenu dozu Triapina 2,5 mg/2,5 mg ili Triapina 5 mg/5 mg
- nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Triapin

Lijek nastavite uzimati sve dok Vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte prestati uzimati lijek samo zato što se osjećate bolje. Ako prestanete, Vaš krvni tlak se može ponovno povisiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati ovaj lijek i odmah potražite liječnika ako primijetite bilo koju od navedenih ozbiljnih nuspojava – možda ćete trebati hitno medicinsko liječenje:

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- naticanje lica, usana ili grla koje može uzrokovati poteškoće s gutanjem ili disanjem, svrbež i osipe. To mogu biti znakovi teške alergijske reakcije na ovaj lijek;
- teške kožne reakcije, uključujući osip, ranice u ustima, pogoršanje postojeće kožne bolesti, crvenilo, pojавa mjehurića ili ljuštenje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, multiformni eritem ili pemfigus).

Odmah obavijestite liječnika ako primijetite bilo što od navedenog

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- kratkoča dah ili kašalj; to mogu biti znakovi problema s plućima;

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- jaka bol u trbuhi koja se može širiti kroz leđa; to može biti znak upale gušterića (pankreatitisa);
- ubrzani rad srca, neujednačeni ili snažni otkucaji srca (palpitacije), bol u prsištu, stezanje u prisu ili teži problemi uključujući srčani ili moždani udar;

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- lakši nastanak masnica, krvarenje dulje nego što je to uobičajeno, bilo koji znak krvarenja (npr. krvarenje iz desni), ljubičaste mrlje, prištići na koži ili češće infekcije nego što je uobičajeno, grlobolja i vrućica, osjećaj umora, nesvjestica, omaglica ili blijedoča kože; to mogu biti znakovi problema s krvju ili koštanom srži;
- vrućica, zimica, osjećaj umora, gubitak apetita, bol u trbuhi, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica); to mogu biti znakovi problema s jetrom kao što je upala jetre (hepatitis) ili oštećenja jetre.

Ostale nuspojave uključuju

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako bilo koja od sljedećih nuspojava postane ozbiljna ili traje dulje od nekoliko dana.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

- oticanje ruku i nogu; to može biti znak da vaše tijelo zadržava više tekućine nego je to uobičajeno

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- glavobolja
- umor

- omaglica; veća je vjerojatnost da će se javiti na početku liječenja ovim lijekom ili nakon uzimanja veće doze
- nesvjestica
- neuobičajeno nizak krvni tlak (hipotenzija), posebno nakon naglog ustajanja ili sjedanja,
- crvenilo praćeno osjećajem vrućine
- suhi nadražajni kašalj
- upala sinusa (sinusitis)
- bronhitis
- kratkoća dah
- bol u želucu ili crijevima
- upala probavnog sustava
- proljev
- loša probava
- mučnina
- povraćanje
- kožni osip s ili bez uzdignuća na koži
- bol u prsištu
- grčevi ili bol u mišićima
- krvne pretrage pokazuju veću razinu kalija u Vašoj krvi od uobičajene.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- vrtoglavica
- svrbež
- neuobičajeni osjeti na koži kao što su utrnulost, trnci, bockanje, pečenje ili mravinjanje pod kožom (parestezija)
- gubitak okusa ili promjena okusa hrane
- problemi sa spavanjem, uključujući izrazitu pospanost
- depresivno raspoloženje
- tjeskoba
- nervozna
- nemir
- začepljjen nos
- poteškoće s disanjem, uključujući pogoršanje astme
- oticanje u crijevima zvano 'intestinalni angioedem' koji se očituje simptomima kao što su bol u trbuhu, povraćanje i proljev
- upala sluznice želudca (gastritis)
- zatvor
- suhoća usta
- oštećenje bubrega, uključujući akutno zatajenje bubrega
- obilnije mokrenje od uobičajenog tijekom dana
- pojačano znojenje
- gubitak apetita (anoreksija)
- smanjeni apetit
- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
- poremećaji vida, uključujući zamogljen vid
- bol u zglobovima
- vrućica
- impotencija u muškaraca
- smanjena seksualna želja u muškaraca i žena
- povećani broj određene vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija), vidljivo u krvnim pretragama
- krvne pretrage pokazuju promjene u načinu rada jetre, gušterače ili bubrega.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- osjećaj nesigurnosti ili zbumjenosti
- nevoljno drhtanje dijelova tijela (tremor)
- poremećaj ravnoteže
- suženje krvnih žila

- smanjeni protok krvi kroz tijelo
- upala krvnih žila
- crven i natečen jezik
- teško perutanje ili ljuštenje kože uz crvenilo i svrbež
- problemi s noktima (npr. klimavost ili odvajanje noktiju od podloga)
- koprivnjača (urtikarija)
- crvene, s osjećajem svrbeža, natečene ili vodenaste oči
- poremećaj sluha
- zvonjava u ušima
- osjećaj slabosti
- krvne pretrage pokazuju smanjeni broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica ili krvnih pločica (trombocita) ili smanjenu razinu hemoglobina
- smanjena seksualna sposobnost u muškaraca ili žena

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

- povećana osjetljivost na sunčevu svjetlost
- lagano oticanje desni ili krvarenje desni,
- krvne pretrage pokazuju povisenu razinu šećera u krvi

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- teškoće s koncentracijom
- upala sluznice usta s pojavim afti
- krvne pretrage pokazuju smanjeni broj svih vrsta krvnih stanica
- poremećaj krvi uzrokovani smanjenim brojem crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)
- krvne pretrage pokazuju smanjene razine natrija u krvi
- koncentrirana mokraća (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se svom liječniku što je prije moguće.
- promjena boje prstiju na rukama i nogama na hladnoći te trnci ili bol pri zagrijavanju (Raynaudov fenomen)
- povećanje dojki u muškaraca
- usporene ili oslabljene reakcije
- osjećaj pečenja
- promjena osjeta mirisa
- gubitak kose.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputji. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Triapin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Tablete čuvati u pakiranju na temperaturi ispod 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Triapin sadrži

- Djelatne tvari u Triapinu 2,5 mg/2,5 mg i Triapinu 5 mg/5 mg su ramipril i felodipin.
 - Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete sadrže 2,5 mg ramiprla i 2,5 mg felodipina.
 - Triapin 5 mg/5 mg tablete sadrže 5 mg ramiprla i 5 mg felodipina.
- Pomoćne tvari su: hidroksipropilceluloza; hipromeloza; bezvodna laktosa; kukuruzni škrob; mikrokristalična celuloza; makrogol; polioksil 40 hidrogenirano ricinusovo ulje, propilgalat; natrijev aluminijev silikat; natrijev stearulfumarat; željezovi oksidi (E172); titanijev dioksid (E171) i parafin.

Kako Triapin izgleda i sadržaj pakiranja

- Triapin 2,5 mg/2,5 mg tablete su boje marelice s oznakom H/OD s jedne strane i 2,5 s druge strane.
- Triapin 5 mg/5 mg tablete su crvenkastosmeđe s oznakom H/OE s jedne strane i 5 s druge strane.
- Triapin 2,5 mg/2,5 mg i Triapin 5 mg/5 mg tablete dostupne su u pakiranju od 28 tableta u blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Sanofi Winthrop Industrie
82 avenue Raspail
94250 Gentilly
Francuska

Proizvođači

Opella Healthcare Hungary Ltd,
Levai utca 5, 2112 Veresegyház
Mađarska

Sanofi Winthrop Industrie
30-36 avenue Gustave Eiffel
37100 Tours
Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Swixx Biopharma d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 15
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 2078 500

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2024.