

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Tritazide 2,5 mg/12,5 mg tablete

Tritazide 5 mg/25 mg tablete

ramipril/hidroklorotiazid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Tritazide i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tritazide?
3. Kako uzimati Tritazide?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tritazide?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tritazide i za što se koristi?

Tritazide je kombinacija dvaju lijekova koji se zovu ramipril i hidroklorotiazid.

Ramipril pripada skupini lijekova zvanih "ACE inhibitori" (Angiotensin Converting Enzyme - angiotenzin konvertirajući enzim). Djeluje tako da:

- smanjuje stvaranje tvari koje povisuju krvni tlak u Vašem tijelu,
- čini Vaše krvne žile opuštenijima i širim,
- olakšava Vašem srcu pumpati krv po tijelu.

Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova zvanih "tiazidski diuretici" ili "tablete za vodu". Djeluje tako da povećava količinu vode (urina) koju izlučujete. To pomaže u snižavanju krvnog tlaka.

Tritazide se koristi za liječenje povišenog krvnog tlaka. Dvije djelatne tvari zajedno snizuju krvni tlak. Koriste se zajedno kad liječenje samo jednom od tih tvari nije bilo uspješno.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tritazide?

Nemojte uzimati Tritazide

- Ako ste alergični na ramipril, hidroklorotiazid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

- Ako ste alergični na lijekove slične Tritazideu (drugi ACE inhibitori ili lijekovi derivati sulfonamida).
Znaci alergijske reakcije mogu uključivati osip, probleme s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika.
- Ako ste ikad imali ozbiljnu alergijsku reakciju zvanu angioedem. Znaci te reakcije uključuju svrbež, koprivnjaču (urtikarija), crvene mrlje po rukama, stopalima i vratu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teškoće u disanju i gutanju.
- Ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, koji se koristi za liječenje jedne vrste dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).
- Ako ste na dijalizi ili nekom drugom obliku filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se pri tom koristi, Tritazide možda nije pogodan za Vas.
- Ako imate teških problema s jetrom.
- Ako imate abnormalne količine soli u krvi (klacij, kalij, natrij).
- Ako imate problema s bubrežima, pri čemu je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežene arterije).
- Tijekom **zadnjih 6 mjeseci trudnoće** (vidjeti dio 'Trudnoća, dojenje i plodnost').
- Ako dojite (vidjeti dio 'Trudnoća, dojenje i plodnost').
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren

Nemojte uzimati Tritazide ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovorajte s Vašim liječnikom prije uzimanja Tritazidea.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tritazide:

- ako imate problema sa srcem, jetrom ili bubrežima
- ako ste izgubili puno soli ili tekućine iz tijela (zbog bolesti – povraćanje, proljeva, neuobičajeno pojačanog znojenja, prehrane s malim unosom soli, dugotrajnog uzimanja diuretika ili zbog dijalize)
- ako imate predviđenu terapiju za smanjenje alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija)
- ako trebate primiti anestetik; primjerice kod operacije ili zahvata na zubima, možda ćete trebati prekinuti liječenje Tritazideom jedan dan prije; upitajte Vašeg liječnika za savjet
- ako imate visoku koncentraciju kalija u krvi (vidljivu u rezultatima krvnih pretraga)
- ako uzimate lijekove ili imate stanja koja mogu smanjiti razinu natrija u krvi. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage, osobito za provjeru razine natrija u krvi, pogotovo ako ste stariji.
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 - racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva
 - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, everolimus, sirolimus)
 - vildagliptin, koji se koristi za liječenje šećerne bolesti
- ako ste u prošlosti imali probleme s disanjem ili plućima (uključujući upalu ili tekućinu u plućima) nakon unosa hidroklorotiazida. Ako osjetite bilo kakav težak

nedostatak zraka ili otežano disanje nakon uzimanja lijeka Tritazide, odmah potražite liječničku pomoć.

- ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što je skleroderma ili sistemski lupus erythematoses
- ako ste trudni ili mislite da biste mogli zatrudnjeti morate obavijestiti Vašeg liječnika; Tritazide se ne preporuča u prvih tri mjeseca trudnoće, a može ozbiljno našteti Vašem djetetu nakon trećeg mjeseca trudnoće (vidjeti poglavljje 'Trudoća, dojenje i plodnost').
- ako Vam se vid pogorša ili imate bol u oku. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja tlaka u oku (glaukom), a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedana nakon uzimanja lijeka Tritazide. Ako se ne liječi, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, možete biti u većem riziku od razvoja ove komplikacije. Prestanite uzimati Tritazide i zatražite hitnu liječničku pomoć.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
 - aliskiren
- ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promjena) na koži tijekom liječenja. Liječenje hidroklorotiazidom, naročito dugotrajna primjena uz visoke doze, može povećati rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski rak kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zrakama za vrijeme uzimanja Tritazide

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom "Nemojte uzimati Tritazide".

Djeca i adolescenti

Tritazide se ne preporučuje djeci i adolescentima mlađim od 18 godina, jer lijek nikada nije primjenjivan u toj dobnoj skupini.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom prije uzimanja Tritazidea.

Drugi lijekovi i Tritazide

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Tritazide može utjecati na učinak drugih lijekova, a drugi lijekovi mogu također utjecati na učinak Tritazidea.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu smanjiti učinak Tritazidea:

- lijekovi za ublažavanje boli i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, NSAIL, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina)

- lijekovi za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka, zatajenja srca, astme ili alergija, kao što su efedrin, noradreanlin ili adrenalin. Liječnik će vam trebati provjeriti krvni tlak.

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer oni mogu povećati vjerojatnost razvoja nuspojava ako ih uzimate s Tritazideom:

- lijekovi za ublažavanje bola i upale (tj. nesteroidni protuupalni lijekovi, kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilatna kiselina)
- lijekovi koji mogu smanjiti količinu kalija u krvi, uključujući lijekove protiv zatvora, diuretike (tablete za vodu), amfotericin B (koristi se za gljivične infekcije) i ACTH (koristi se za provjeru aktivnosti adrenalnih žljezda)
- lijekovi za liječenje raka (kemoterapija)
- lijekovi za srčane probleme, uključujući probleme s brojem otkucaja srca
- diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje tekućine iz organizma), kao što je furosemid
- nadomjeske kalija (uključujući nadomjeske soli), diuretike koji štede kalij (npr. spironolakton, triamteren ili amilorid) i druge lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za bakterijske infekcije; ciklosporin, imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa; i heparin, koji se koristi za razrjeđivanje krvi radi sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka)
- steroidni lijekovi za liječenje upale, kao što je prednizolon
- nadomjesci kalcija
- alopurinol (koristi se za sniženje koncentracije urične kiseline)
- prokainamid (za liječenje problema sa srčanim ritmom)
- kolestiramin (za smanjenje masnoća u krvi)
- karbamazepin (za epilepsiju)
- heparin (koristi se za razrjeđivanje krvi)
- temsirolimus (za liječenje raka)
- lijekove koji se najčešće primjenjuju kako bi se izbjeglo odbacivanje presađenih organa (sirolimus, everolimus i ostali lijekovi koji pripadaju skupini mTOR inhibitora). Pogledajte dio "Upozorenja i mjere opreza".
- vildagliptin (koristi se za liječenje dijabetesa tipa 2)
- racekadotril (za liječenje proljeva)
- Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza: Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima "Nemojte uzimati Tritazide" i "Upozorenja i mjere opreza")

Obavijestite Vašeg liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer Tritazide može utjecati na njihov učinak:

- lijekovi za liječenje dijabetesa, kao što su lijekovi za snižavanje koncentracije glukoze u krvi koji se uzimaju kroz usta i inzulin; Tritazide može dovesti do smanjenja koncentracije šećera u krvi, pa je potrebno redovito provjeravati razinu šećera u krvi dok uzimate Tritazide
- litij (za liječenje mentalnih problema); Tritazide može povisiti koncentraciju litija u krvi, stoga je potrebno da Vaš liječnik pažljivo prati koncentraciju litija;
- lijekovi za opuštanje mišića
- kinin (za malariju)

- lijekovi koji sadržavaju jod, a koriste se prilikom rendgenskog ili CT pregleda u bolnici
- peniclin (za infekcije)
- lijekovi za razrjeđivanje krvi koji se uzimaju kroz usta (oralni antikoagulansi), kao što je varfarin.

Ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas (ili u to niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom prije uzimanja Tritazidea.

Pretrage

Posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka:

- ako trebate obaviti ispitivanje funkcije paratiroidne žljezde; Tritazide može utjecati na rezultate pretrage,
- ako ste sportaš i trebate obaviti anti-doping kontrolu; Tritazide može dati pozitivan rezultat na testu.

Tritazide s hranom, pićem i alkoholom

- Uzimanje alkohola s Tritazideom može izazvati omaglicu ili ošamućenost. Ako ne znate koliko smijete popiti dok uzimate Tritazide, razgovarajte s Vašim liječnikom, s obzirom da lijekovi za snižavanje krvnog tlaka i alkohol mogu imati aditivni učinak (učinci im se zbrajaju);
- Tritazide se može uzeti s obrokom ili između obroka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporuča se uzimati Tritazide tijekom prvih 12 tjedana trudnoće, a ne smije se uzimati od 13-og tjedna, s obzirom da uzimanje Tritazidea za vrijeme trudnoće može biti štetno za dijete.

Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja Tritazidea, odmah obavijestite Vašeg liječnika. Ako planirate trudnoću, potrebno je unaprijed prijeći na primjerenu alternativnu terapiju.

Dojenje

Ne biste smjeli uzimati Tritazide ako dojite.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka upitajte za savjet Vašeg liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme korištenja Tritazidea možete osjetiti omaglicu. Veća je vjerojatnost da se to dogodi na početku liječenja ili kad uzmete veću dozu Tritazidea. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili koristiti alate i strojeve.

Tritazide sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Tritazide?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Liječenje visokog krvnog tlaka

Liječnik će prilagoditi dozu koju uzimate tako da Vaš krvni tlak bude pod kontrolom.

Stariji bolesnici

Liječnik će smanjiti početnu dozu i postupno prilagođavati Vašu terapiju.

Uzimanje lijeka

- Lijek uzmite kroz usta, svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro.
- Tablete progutajte s tekućinom.
- Nemojte drobiti ili žvakati tablete

Ako uzmete više Tritazidea nego što ste trebali

Obavijestite liječnika ili otidite na odjel hitne pomoći u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti u bolnicu, neka Vas poveze netko drugi ili pozovite hitnu pomoć. Uzmite sa sobom pakiranje lijeka, da liječnik može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Tritazide

- Ako zaboravite uzeti lijek, uzmite sljedeću dozu prema rasporedu uzimanja.
- Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljeni tabletu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati Tritazide i odmah se obratite liječniku, ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava – možda će Vam biti potrebna i hitna medicinska skrb:

- oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip - to mogu biti znaci teške alergijske reakcije na Tritazide;
- teške kožne reakcije, uključujući osip, čireve (ulceracije) u ustima, pogoršanje postojećih kožnih bolesti, crvenilo, mjehurići na koži ili ljuštenje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme).

Odmah obavijestite liječnika, ako osjetite nešto od sljedećeg:

- ubrzani puls, nepravilne ili snažne otkucaje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili ozbiljnije probleme, kao što su srčani i moždani udar;
- zadihanost, vrućica uz kašalj koja traje 2 do 3 dana te smanjeni apetit; to mogu biti znaci problema s plućima, uključujući upalu;
- ako primijetite da Vam se češće javljaju modrice, krvarete dulje nego što je normalno, bilo kakvi znakovi krvarenja (npr. krvarenje desni), ljubičaste točke na koži, mrlje na koži ili infekcije češće nego što je to uobičajeno, ako imate bolno grlo i groznicu, osjećate umor, nesvjesticu, omaglicu ili imate blijedu kožu - to mogu biti znaci problema s krvi ili koštanom srži;
- jaki bolovi u želucu, koji se mogu proširiti na leđa (to može biti znak pankreatitisa – upala gušterače);
- grozница, zimica, umor, gubitak apetita, bol u želucu, mučnina, žutilo kože ili očiju (žutica) - to mogu biti znaci problema s jetrom, kao što je hepatitis (upala jetre) ili oštećenje jetre;
- Oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta).

Ostale nuspojave

Obavijestite Vašeg liječnika ako neke od sljedećih nuspojava postanu ozbiljne ili traju duže od par dana.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- glavobolja, osjećaj slabosti ili umora
- omaglica (češće se javlja na početku liječenja ili kod uzimanja veće doze Tritazidea)
- suhi, nadražujući kašalj ili bronhitis
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu šećera u krvi, ako imate dijabetes, može se pogoršati
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu urične kiseline ili masti u krvi,
- bolni, crveni ili natečeni zglobovi (pogoršanje stanja kod oboljelih od gihta).

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- osip na koži, s/bez ispuštenja dijelova kože
- crvenilo praćeno vrućinom, nesvjestica, hipotenzija (abnormalno nizak krvni tlak), posebice kod naglog sjedanja ili ustajanja
- problemi s ravnotežom (vrtoglavica)
- svrbež i neobični osjećaji na koži, kao što su ukočenost, žarenje, peckanje, vrućina ili trnci (parestezija)
- gubitak ili poremećaj okusa (disgeuzija)
- problemi sa snom
- osjećaj depresije, napetosti, povećanje nervoze ili nemira
- začepljeno nos, upala sinusa (sinusitis), zadihanost
- upala desni, nateknuta usta (gingivitis)
- crvene, natečene oči, koje svrbe ili suze (konjuktivitis)
- zvonjava u ušima (tinnitus)
- zamućen vid
- gubitak kose

- bol u prsnom košu
- bol u mišićima (mijalgija)
- zatvor, bol u želucu ili crijevima
- probavne tegobe ili mučnina
- povećano izlučivanje tekućine (urin) tijekom dana, što može biti posljedica oštećenja bubrega
- znojenje jače od uobičajenog ili osjećaj žedi
- gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija), smanjen osjećaj gladi
- ubrzani ili nepravilni otkucaji srca
- natečene ruke i noge (to mogu biti znaci da zadržavate više vode nego je uobičajeno)
- groznica
- seksualna impotencija u muškaraca
- krvne pretrage pokazuju smanjenje broja crvenih ili bijelih krvnih stanica, trombocita ili koncentracije hemoglobina
- krvne pretrage pokazuju promjene u radu jetre, gušterače ili bubrega
- krvne pretrage pokazuju smanjenu razinu kalija u krvi.

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba)

- mučnina, proljev ili žgaravica
- crven i nateknut jezik (glositis) ili sluznica usta (aftozni stomatitis); suha usta
- krvne pretrage pokazuju povećanu razinu kalija u krvi
- akutni respiratorni distres (znakovi uključuju težak nedostatak zraka, vrućicu, slabost i smetenost)

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- teškoće u koncentraciji, nemir ili zbumjenost
- prsti na nogama i rukama mijenjaju boju kad Vam je hladno uz osjećaj peckanja ili boli kad se ugrijete (Raynaudov fenomen)
- povećanje grudi u muškaraca (ginekomastija)
- krvni ugrušci uslijed teškog gubitka tekućine
- poremećaj sluha
- smanjeno suzenje očiju
- objekti izgledaju žućkasto (ksantopsija)
- dehidracija
- oticanje, bol ili crvenilo u obrazima (upala žlijezde slinovnice)
- oticanje crijeva zvano 'angioedem tankog crijeva', uz simptome kao što su bol u trbuhi, povraćanje i proljev
- povećana osjetljivost kože na sunce (fotoosjetljivost)
- teško ljuštenje ili guljenje kože, osip praćen svrbežom i kvrgama ili druge kožne reakcije kao što je osip praćen crvenilom na licu i čelu
- kožni osip
- mrlje na koži ili hladnoća u ekstremitetima
- problemi s noktima (npr. klimavost nokta ili odvajanje nokta iz ležišta)
- mišénokoštana ukočenost ili nemogućnost pomicanja vilice (tetanija)
- slabost ili grčevi u mišićima
- smanjen spolni nagon (libido) u muškaraca i žena
- krv u mokraći ,to može biti znak problema s bubrezima (intersticijski nefritis)

- povećana razina šećera u mokraći
- povećan broj određene vrste bijelih krvnih stanica (ezinofilija) vidljiv prilikom krvnih pretraga
- krvne pretrage pokazuju premali broj krvnih stanica (pancitopenija)
- krvne pretrage pokazuju promjenu razina soli (elektrolita) kao što su natrij, kalcij, magnezij i klorid u krvi
- koncentrirani urin (tamne boje), mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji koji mogu biti posljedica neodgovarajućeg izlučivanja ADH-a (antidiuretskog hormona). Ako imate te simptome, obratite se Vašem liječniku što je prije moguće
- usporena ili narušena sposobnost reakcije
- poremećaj njuha (parosmija)
- teškoće pri disanju ili pogoršanje astme
- smanjeno suzenje oka
- rak kože i usana (nemelanomski rak kože)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tritazide?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju i blisteru iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tritazide sadrži?

Jedna tableta Tritazidea 2,5 mg/12,5 mg sadrži 2,5 mg ramipril i 12,5 mg hidroklorotiazida.

Jedna tableta Tritazidea 5 mg/25 mg sadrži 5 mg ramipril i 25 mg hidroklorotiazida.

Pomoćne tvari su hipromeloza, prethodno geliran kukuruzni škrob, mikrokristalična celuloza i natrijev stearilfumarat.

Kako Tritazide izgleda i sadržaj pakiranja?

Tritazide 2,5 mg/12,5 mg su bijele do bjelkaste ovalne tablete s urezom te utisnutom oznakom HNV i logom tvrtke s obje strane. Tableta se može razdijeliti u jednake polovice.

28 (2x14) tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Tritazide 5 mg/25 mg su bijele do bjelkaste ovalne tablete s urezom te utisnutom oznakom HNW i logom tvrtke s obje strane. Tableta se može razdijeliti u jednake polovice.

28 (2x14) tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvodač**Nositelj odobrenja**

sanofi-aventis groupe
54 rue La Boétie
75008 Paris
Francuska

Proizvodač

Sanofi S.r.l.
Strada Statale 17, KM 22
67019 Scoppito, Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Swixx Biopharma d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića - Gavrana 15
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 2078 500

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2022.