

UPUTA O LIJEKU

Oikamid 400 mg kapsule

piracetam

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek. Sačuvajte ju, jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Oikamid 400 mg kapsule. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Sadržaj ove upute:

- 1. Što su Oikamid kapsule i za što se koriste?**
- 2. Prije nego počnete uzimati Oikamid kapsule**
- 3. Kako uzimati Oikamid kapsule?**
- 4. Moguće nuspojave**
- 5. Kako čuvati Oikamid kapsule?**
- 6. Dodatne informacije**

1. Što su Oikamid 400 mg kapsule i za što se koriste?

Što sadrže Oikamid kapsule?

Djelatna tvar Oikamid kapsula je piracetam

Oikamid kapsule pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju psihostimulansi.

Za što se koriste Oikamid kapsule?

Oikamid kapsule se koriste u liječenju mioklonusa (nevoljne kretnje uzrokovane mišićnim kontrakcijama) kao pojedinačni lijek ili u kombinaciji s drugim lijekovima.

Oikamid kapsule se koriste u liječenju afazije (narušena sposobnost govorne komunikacije) uz intenzivne logopetske vježbe.

Oikamid kapsule se koriste u liječenju disleksije (poremećaj čitanja i pisanja) kod djece.

2. Prije nego počnete uzimati Oikamid 400 mg kapsule

Nemojte uzimati Oikamid kapsule:

- Ako ste ikada imali neuobičajene reakcije na piracetam ili bilo koji od navedenih pomoćnih sastojaka.
- Ako imate tešku bubrežnu bolest
- Ako imate tešku bolest jetre
- Kod djece mlađe od 6 godina
- Ako se imali moždani udar (izljev krvi u mozak)

Budite oprezni i posavjetujte se s liječnikom prije započinjanja liječenja lijekom Oikamid kapsule ako:

- Imate epilepsiju
- Imate poremećaj zgrušavanja krvi
- Ste imali veću operaciju ili teško krvarenje
- Imate poremećenu funkciju bubrega

Uzimanje drugih lijekova s Oikamid kapsulama

Oikamid kapsule mogu stupiti u interakcije sa slijedećim lijekovima:

- Kortikosteroidi (lijekovi koji se koriste u liječenju upalnih, alergijskih i kožnih bolesti)
- Hormoni koji se koriste kod liječenja štitnjače
- Acenokumarol (pripada skupini lijekova koji se koriste u sprečavanju zgrušavanja krvi)

Trudnoća i dojenje

Oikamid kapsule treba izbjegavati tijekom trudnoće.

S obzirom da se lijek izlučuje u mlijeko tijekom dojenja, njegova primjena se ne preporuča tijekom dojenja.

Mlade žene koje koriste Oikamid kapsule trebaju koristiti odgovarajuća kontracepcijska sredstva

Upravljanje vozilima i strojevima

Bolesnici koji namjeravaju upravljati vozilima i strojevima tijekom uzimanja Oikamid kapsula moraju biti oprezni jer se može pojaviti hiperkineza (nevoljni pokreti mišića), pospanost, nervoza ili depresija.

Ostala upozorenja

Liječenje Oikamid kapsulama ne smijete naglo prekinuti jer nagli prekid u nekih bolesnika s mioklonusom (nevoljne kretnje uzrokovane mišićnim kontrakcijama) može uzrokovati pojačane napadaje grčeva.

3. Kako uzimati Oikamid 400 mg kapsule?

Vaš liječnik će odrediti koju dozu Oikamid kapsula ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputa Vašeg liječnika i uzimajte ovaj lijek točno onako kako vam je rekao.

Veličina doze i učestalost doziranja se prilagođavaju svakom bolesniku ponaosob.

Obično se počinje s dozom od 7,2 g dnevno, koja se povećava svaka 3 do 4 dana za 4,8 g dnevno do maksimalne doze od 20 g dnevno podijeljeno u 2 ili 3 doze.

Kronična afazija (narušena sposobnost govorne komunikacije) se liječi piracetamom u dozama od 4,8 g (12 kapsula) dnevno u kombinaciji s intenzivnim logopedskim vježbama tijekom nekoliko mjeseci.

Djeca:

Kod djece starije od 6 godina uobičajena doza je 50 – 100 mg/kg/dan, obično 4 kapsule dva puta na dan.

Terapijski učinci piracetama u liječenju kroničnih poremećaja i poremećaja kod djece se postižu polako, stoga liječenje može trajati mjesecima.

Ako uzmete više Oikamid kapsula nego što ste trebali?

Ako greškom uzmete preveliku dozu lijeka Oikamid kapsula, o tome odmah obavijestite liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Oikamid kapsule?

Ako ste zaboravili uzeti dozu Oikamid kapsula, uzmite ju čim se sjetite, a slijedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Oikamid kapsula obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Oikamid kapsule mogu izazvati nuspojave

Nuspojave su niže navedene i razvrstane po organskom sustavima i učestalosti i to kao:

Vrlo često ($\geq 10\%$), često ($\geq 1\%$ do $< 10\%$), manje često ($\geq 0,1\%$ do $< 1\%$), rijetko ($\geq 0,01\%$ do $< 0,1\%$), vrlo rijetko ($< 0,01\%$), nepoznate učestalosti.

Poremećaji probavnog sustava:

Nepoznate učestalosti: bol u trbuhu ili želucu, proljev, mučnina, povraćanje

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:

Manje često: nemoć, slabost

Poremećaji imunološkog sustava:

Nepoznate učestalosti: alergijske reakcije, preosjetljivost

Pretrage:

Često: porast težine

Poremećaji živčanog sustava:

Često: nevoljni pokreti mišića

Nepoznate učestalosti: vrtoglavica, poremećaji ravnoteže i koordinacije pokreta, pogoršanje epilepsije, glavobolja, nesаница, pospanost

Psihijatrijski poremećaji:

Često: nervoza

Manje često: depresija

Nepoznate učestalosti: nemir, tjeskoba, zbunjenost, halucinacije

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Manje često: otok kože i sluznica, dermatitis, svrbež, urtikarija, osip

Uz primjenu velikih doza opisuju se nervoza, pojačan libido, seksualna stimulacija, gubitak kose i pojačano znojenje.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Oikamid 400 mg kapsule?

OIKAMID 400 mg KAPSULE MORATE ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Oikamid 400 mg kapsule se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što sadrže Oikamid 400 mg kapsule?

Djelatna tvar Oikamid kapsula je piracetam.

Svaka kapsula sadrži 400 mg piracetama.

U Oikamid kapsulama su sadržane i slijedeće pomoćne tvari: talk; magnezijev stearat. Kapsula: želatina; titanijev dioksid (E171); azorubine, carmoisine (E122).

Kako Oikamid 400 mg kapsule izgledaju i sadržaj pakovanja

Kapsula, tvrda.

60 (6x10) kapsula u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Ime i adresa proizvođača i nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:



PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25,

10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Datum revizije upute :

Svibanj, 2011.