

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

**Deferasiroks Pharmascience 90 mg filmom obložene tablete
Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablete
Deferasiroks Pharmascience 360 mg filmom obložene tablete**

deferasiroks

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćeće je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, обратите se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama ili Vašem djetetu. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Deferasiroks Pharmascience i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Deferasiroks Pharmascience
3. Kako uzimati Deferasiroks Pharmascience
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Deferasiroks Pharmascience
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Deferasiroks Pharmascience i za što se koristi

Što je Deferasiroks Pharmascience

Deferasiroks Pharmascience sadrži djelatnu tvar koja se zove deferasiroks. To je kelator željeza, lijek koji se koristi za uklanjanje viška željeza iz tijela (također se zove preopterećenje željezom). On hvata i uklanja višak željeza koje se potom izlučuje uglavnom stolicom.

Za što se Deferasiroks Pharmascience koristi

U bolesnika s različitim vrstama anemije (npr. talasemijom, bolešću srpastih stanica ili mijelodisplastičnim sindromima (MDS)) može biti nužno provoditi ponovljene transfuzije krvi. No, ponovljene transfuzije krvi mogu uzrokovati prekomjerno nakupljanje željeza. To se događa zato što krv sadrži željezo, a ne postoji prirodan način na koji bi tijelo uklonilo višak željeza primljen transfuzijama krvi. U bolesnika sa sindromima talasemije neovisnim o transfuziji s vremenom se može razviti i preopterećenost željezom, uglavnom zbog pojačane apsorpcije željeza unesenog u tijelo prehranom s obzirom na nizak broj krvnih stanica. Višak željeza s vremenom može oštetiti važne organe, poput jetre i srca. Da bi se uklonio višak željeza i smanjio rizik od oštećenja organa, koriste se lijekovi koji se nazivaju kelatorima željeza.

Deferasiroks Pharmascience se koristi za liječenje kroničnog preopterećenja željezom uzrokovanog čestim transfuzijama krvi u bolesnika s beta-talasemijom major u dobi od 6 godina i starijih.

Deferasiroks Pharmascience se također koristi za liječenje kroničnog preopterećenja željezom kad je terapija deferoksaminom kontraindicirana ili neodgovarajuća u bolesnika s beta-talasemijom major s preopterećenjem željezom uzrokovanim rijetkim transfuzijama krvi, u bolesnika s ostalim vrstama anemija te u djece u dobi od 2 do 5 godina.

Deferasiroks Pharmascience se također koristi za liječenje bolesnika u dobi od 10 godina ili starijih u kojih je došlo do preopterećenja željezom povezanog sa sindromima talasemije neovisnim o transfuziji..

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Deferasiroks Pharmascience

Nemojte uzimati Deferasiroks Pharmascience

- ako ste alergični na deferasiroks ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Ako se to odnosi na Vas, **obavijestite svog liječnika prije nego počnete uzimati Deferasiroks Pharmascience**. Ako mislite da biste mogli biti alergični, posavjetujte se sa svojim liječnikom.
- ako imate umjerenu ili tešku bolest bubrega.
- ako trenutno uzimate bilo koje druge lijekove koji su također kelatori željeza.

Deferasiroks Pharmascience se ne preporučuje

- ako ste u uznapredovalom stadiju mijelodisplastičnog sindroma (MDS; bolest smanjenog stvaranja krvnih stanica u koštanoj srži) ili ako imate uznapredovali stadij raka.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Deferasiroks Pharmascience:

- ako imate probleme s bubrezima ili jetrom;
- ako zbog preopterećenja željezom imate probleme sa srcem;
- ako primijetite izrazito smanjenje izlučivanja mokraće (znak bubrežnog problema);
- ako razvijete jaki osip ili teškoće pri disanju i omaglicu ili oticanje uglavnom lica i grla (znakovi teške alergijske reakcije, pogledajte također dio 4. „Moguće nuspojave”);
- ako primijetite kombinaciju bilo kojih od sljedećih simptoma: osip, crvenu kožu, stvaranje mjeđurića na usnicama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućicu, simptome nalik gripi, povećane limfne čvorove (znakovi teške kožne reakcije, pogledajte također dio 4. „Moguće nuspojave”);
- ako osjetite kombinaciju omamljenosti, bolova u gornjem desnom dijelu trbuha, požutite ili Vam se pojača žutilo kože ili očiju i imate tamnu mokraću (znakovi jetrenih problema);
- ako primijetite poteškoće u razmišljanju, pamćenju informacija ili rješavanju problema, smanjenu pozornost ili svijest ili osjećaj izrazite pospanosti uz nisku razinu energije (znakovi visoke razine amonijaka u Vašoj krvi, što može biti povezano s jetrenim ili bubrežnim tegobama, pogledajte također dio 4. „Moguće nuspojave”);
- ako povraćate krv i/ili imate crne stolice;
- ako imate česte bolove u trbuhu, posebno nakon jela ili uzimanja lijeka Deferasiroks Pharmascience;
- ako imate česte žgaravice;
- ako imate nizak broj krvnih pločica ili bijelih krvnih stanica u krvnoj pretrazi;
- ako imate zamagljen vid;
- ako imate proljev ili povraćate.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, odmah obavijestite svog liječnika.

Praćenje liječenja lijekom Deferasiroks Pharmascience

Tijekom liječenja redovito ćete obavljati pretrage krv i mokraće. Njima će se pratiti količina željeza u Vašem tijelu (razina feritina u krvi) da se vidi kako dobro Deferasiroks Pharmascience djeluje.

Pretragama će se pratiti i funkcija Vaših bubrega (razina kreatinina u krvi, prisutnost bjelančevina u mokraći) i jetrene funkcije (razina transaminaza u krvi). Vaš liječnik može zatražiti da Vam se napravi biopsija bubrega ako sumnja na značajno oštećenje bubrega. Možda ćete obaviti i pretragu MR-om (snimanje magnetskom rezonancijom) kako bi se utvrdila količina željeza u Vašoj jetri. Liječnik će uzeti u obzir nalaze tih pretraga prilikom odlučivanja o najprikladnijoj dozi lijeka Deferasiroks Pharmascience za Vas, a na temelju tih pretraga će odlučiti i kad morate prekinuti uzimanje lijeka Deferasiroks Pharmascience.

Kao mjeru opreza, svake ćete godine, sve dok se liječite, kontrolirati vid i sluš.

Drugi lijekovi i Deferasiroks Pharmascience

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To se posebno odnosi na:

- druge kelatore željeza, koji se ne smiju uzimati s lijekom Deferasiroks Pharmascience,

- antacide (lijekove koji se koriste za liječenje žgaravice) koji sadrže aluminij, koji se ne smiju uzimati u isto doba dana kad i Deferasiroks Pharmascience,
- ciklosporin (koristi se za sprečavanje odbacivanja presađenog organa ili za druga stanja kao što su reumatoidni artritis ili atopijski dermatitis),
- simvastatin (koristi se za sniženje kolesterol-a),
- određene lijekove protiv bolova ili protuupalne lijekove (npr. acetilsalicilna kiselina, ibuprofen, kortikosteroidi),
- oralne bisfosfonate (koriste se za liječenje osteoporoze),
- antikoagulantne lijekove (koriste se za sprečavanje ili liječenje krvnih ugrušaka),
- hormonske kontraceptivne lijekove (lijekovi za kontrolu začeća),
- bepridil, ergotamin (koriste se za liječenje srčanih problema i migrene),
- repaglinid (koristi se za liječenje šećerne bolesti),
- rifampicin (koristi se za liječenje tuberkuloze),
- fenitoin, fenobarbital, karbamazepin (koriste se za liječenje epilepsije),
- ritonavir (koristi se za liječenje HIV infekcije),
- paklitaksel (koristi se za liječenje raka),
- teofilin (koristi se za liječenje bolesti dišnih puteva poput astme),
- klozapin (koristi se za liječenje psihiatrijskih poremećaja poput shizofrenije),
- tizanidin (koristi se kao lijek za opuštanje mišića),
- kolestiramin (koristi se za snižavanje razina kolesterol-a u krvi),
- busulfan (koristi se kao terapija prije transplantacije radi uništavanja postojeće koštane srži prije transplantacije).

Možda će biti potrebno napraviti dodatne pretrage za neke od ovih lijekova radi praćenja njihovih razina u krvi.

Starije osobe (65 godina i više)

Osobe u dobi od 65 godina i više mogu uzimati Deferasiroks Pharmascience u istim dozama kao i druge odrasle osobe. Stariji bolesnici mogu imati više nuspojava (osobito proljev) od mlađih bolesnika. Njihovih liječnika treba pažljivo pratiti s obzirom na nuspojave zbog kojih će možda biti potrebna prilagodba doze.

Djeca i adolescenti

Deferasiroks Pharmascience mogu uzimati djeca i adolescenti u dobi od 2 godine i stariji koji primaju redovite transfuzije krvi te djeca i adolescenti u dobi od 10 godina i stariji koji ne primaju redovite transfuzije krvi. Kako pacijenti budu rasli, liječnik će prilagođavati dozu.

Deferasiroks Pharmascience se ne preporučuje za djecu mlađu od 2 godine.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Deferasiroks Pharmascience se ne preporučuje tijekom trudnoće, osim ako to nije posve neophodno.

Ako trenutno uzimate oralne kontraceptive ili koristite kontraceptive u obliku flastera radi sprječavanja trudnoće, morate koristiti dodatnu ili drugačiju vrstu kontracepcije (npr. prezervativ), budući da Deferasiroks Pharmascience može smanjiti učinkovitost oralnih kontraceptiva ili kontraceptiva u obliku flastera.

Tijekom liječenja lijekom Deferasiroks Pharmascience ne preporučuje se dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako nakon uzimanja lijeka Deferasiroks Pharmascience osjetite omaglicu, nemojte upravljati vozilima niti raditi s alatima ili strojevima sve dok se ponovno ne počnete osjećati normalno.

3. Kako uzimati Deferasiroks Pharmascience

Liječenje lijekom Deferasiroks Pharmascience će nadzirati liječnik iskusan u liječenju preopterećenja željezom uzrokovanih transfuzijama krvi.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka Deferasiroks Pharmascience uzeti

Doza lijeka Deferasiroks Pharmascience u svakog bolesnika ovisi o njegovoj tjelesnoj težini. Liječnik će izračunati kolika Vam doza treba i reći koliko tableta trebate uzimati svakoga dana.

- Uobičajena dnevna doza Deferasiroks Pharmascience filmom obloženih tableta na početku liječenja za bolesnike koji primaju redovite transfuzije krvi je 14 mg po kilogramu tjelesne težine. Liječnik može preporučiti višu ili nižu početnu dozu ovisno o Vašim individualnim potrebama. Uobičajena dnevna doza Deferasiroks Pharmascience filmom obloženih tableta na početku liječenja za bolesnike koji ne primaju redovite transfuzije krvi je 7 mg po kilogramu tjelesne težine.
- Ovisno o Vašem odgovoru na liječenje, liječnik kasnije može prilagoditi liječenje višom ili nižom dozom.
- Najviša preporučena dnevna doza Deferasiroks Pharmascience filmom obloženih tableta je:
 - 28 mg po kilogramu tjelesne težine za bolesnike koji primaju redovite transfuzije krvi,
 - 14 mg po kilogramu tjelesne težine za odrasle bolesnike koji ne primaju redovite transfuzije krvi,
 - 7 mg po kilogramu tjelesne težine za djecu i adolescente koji ne primaju redovite transfuzije krvi.

Deferasiroks je dostupan i u obliku tableta za „oralnu suspenziju“. Ako prelazite s tableta za oralnu suspenziju na ove filmom obložene tablete, bit će Vam potrebna prilagodba doze. *Deferasiroks Pharmascience nije dostupan u obliku tableta za oralnu suspenziju. Za ovaj farmaceutski oblik potrebno je koristiti druge lijekove koji sadrže deferasiroks.*

Kada uzimati Deferasiroks Pharmascience

- Deferasiroks Pharmascience uzimajte jedanput na dan, svaki dan, približno u isto vrijeme svakoga dana uz malo vode
- Deferasiroks Pharmascience filmom obložene tablete uzimajte ili na prazan želudac ili uz lagani obrok.

Uzimanje lijeka Deferasiroks Pharmascience svakoga dana u isto vrijeme pomoći će Vam sjetiti se kada uzeti tablete.

Bolesnici koji ne mogu progutati cijele tablete, mogu zdrobiti Deferasiroks Pharmascience filmom obložene tablete i uzeti posipanjem cijele doze na maku hranu kao što je jogurt ili jabučna kaša (pire od jabuke). Hranu treba odmah i u cijelosti konzumirati. Ne pohranjujte je za buduću uporabu.

Koliko dugo uzimati Deferasiroks Pharmascience

Nastavite uzimati Deferasiroks Pharmascience svakog dana onoliko dugo koliko Vam je rekao liječnik. To je dugotrajno liječenje koje bi moglo trajati mjesecima ili godinama. Liječnik će redovito pratiti Vaše stanje kako bi provjerio ima li liječenje željeni učinak (pogledajte također dio 2: „Praćenje liječenja lijekom Deferasiroks Pharmascience“).

Ako imate pitanja o tome koliko dugo uzimati Deferasiroks Pharmascience, obratite se svom liječniku.

Ako uzmete više lijeka Deferasiroks Pharmascience nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše lijeka Deferasiroks Pharmascience, ili je tablete zabunom uzeo netko drugi, odmah se javite svom liječniku ili u bolnicu i zatražite savjet. Pokažite liječniku pakiranje tableta. Možda će biti potrebna hitna medicinska skrb. Mogli biste razviti nuspojave poput boli u trbušu, proljeva, mučnine i povraćanja te tegobe s bubrezima ili jetrom koje mogu biti ozbiljne.

Ako ste zaboravili uzeti Deferasiroks Pharmascience

Ako ste propustili uzeti dozu, uzmite ju istog dana čim se sjetite. Iduću dozu uzmite prema uobičajenom rasporedu. Sljedećeg dana nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu(e).

Ako prestanete uzimati Deferasiroks Pharmascience

Ne prekidajte uzimanje lijeka Deferasiroks Pharmascience osim ako Vam to ne kaže liječnik. Ako ga prestanete uzimati, višak željeza više se neće uklanjati iz Vašeg tijela (pogledajte također dio „Koliko dugo uzimati Deferasiroks Pharmascience“).

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave su većinom blage do umjerene i obično nestaju nakon nekoliko dana do nekoliko tjedana liječenja.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne i treba ih odmah liječiti.

Ove nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba) ili rijetke (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba).

- Ako dobijete teški osip ili teškoće pri disanju i omaglicu ili oticanje uglavnog lica i grla (znakovi teške alergijske reakcije),
- ako primijetite kombinaciju bilo kojih od sljedećih simptoma: osip, crvenu kožu, mjehuriće na usnicama, očima ili u ustima, ljuštenje kože, vrućicu, simptome nalik gripi, povećane limfne čvorove (znakovi teških kožnih reakcija),
- ako primijetite izrazito smanjenje izlučivanja mokraće (znak bubrežnog problema),
- ako osjetite kombinaciju omamljenosti, bolova u gornjem desnom dijelu trbuha, požutite ili Vam se pojača žutilo kože ili očiju i imate tamnu mokraću (znakovi jetrenih problema),
- ako primijetite poteškoće u razmišljanju, pamćenju informacija ili rješavanju problema, smanjenu pozornost ili svijest ili osjećaj izrazite pospanosti uz nisku razinu energije (znakovi visoke razine amonijaka u Vašoj krvi, što može biti povezano s jetrenim ili bubrežnim tegobama te dovesti do promjene moždane funkcije),
- ako povraćate krv i/ili imate crne stolice,
- ako imate česte bolove u trbuhu, posebno nakon jela ili uzimanja lijeka Deferasiroks Pharmascience,
- ako imate česte žgaravice,
- ako imate djelomičan gubitak vida,
- ako osjetite jaku bol u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis),
prestanite uzimati ovaj lijek i odmah obavijestite svog liječnika.

Neke nuspojave mogu postati ozbiljne.

Ove nuspojave su manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba).

- Ako Vam se zamagli ili zamuti vid,
- ako Vam oslabi sluh,
čim prije obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba).

- Poremećaj testova funkcije bubrega.

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba).

- Probavni poremećaji poput mučnine, povraćanja, proljeva, боли u trbuhu, nadutosti, zatvora i probavnih tegoba,
- osip,
- glavobolja,
- poremećaj testova jetrene funkcije,

- svrbež,
- poremećaj testova mokraće (bjelančevine u mokraći).

Ako se bilo koja od ovih nuspojava kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Manje česte (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba).

- Omaglica,
- vrućica,
- grlobolja,
- oticanje ruku ili nogu,
- promjena boje kože,
- tjeskoba,
- poremećaj spavanja,
- umor.

Ako se bilo koja od ovih nuspojava kod Vas javi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Učestalost nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

- Smanjenje broja stanica koje su uključene u zgrušavanje krvi (trombocitopenija), broja crvenih krvnih stanica (pogoršanje anemije), broja bijelih krvnih stanica (neutropenijska) ili svih vrsta krvnih stanica (pancitopenija),
- gubitak kose,
- bubrežni kamenci,
- slabo mokrenje,
- probijanje stijenke želuca ili crijeva koje može biti bolno i uzrokovati mučninu,
- jaka bol u gornjem dijelu trbuha (pankreatitis),
- nenormalna razina kiseline u krvi.

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Deferasiroks Pharmascience

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno ili su vidljivi znakovi otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Deferasiroks Pharmascience sadrži

Djelatna tvar je deferasiroks.

- Jedna Deferasiroks Pharmascience 90 mg filmom obložena tableta sadrži 90 mg deferasiroksa.
- Jedna Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložena tableta sadrži 180 mg deferasiroksa.
- Jedna Deferasiroks Pharmascience 360 mg filmom obložena tableta sadrži 360 mg deferasiroksa.

H A L M E D
06 - 09 - 2021
O D O B R E N O

deferasiroksa.

Drugi sastojci su:

- Jezgra tablete: krospovidon (vrsta A) (E1202); povidon K30 (E1201); mikrokristalična celuloza (vrsta 101) (E460); mikrokristalična celuloza (vrsta 102); magnezijev stearat (E470b); poloksamer 188 i koloidni bezvodni silicijev dioksid (E551).
- Ovojnica: hipromeloza 2910 (3 mPa·s) (E464); titanijev dioksid (E171); makrogol 4000 (E1521); talk (E553b) i boja *indigo carmine aluminium lake* (E132).

Kako Deferasiroks Pharmascience izgleda i sadržaj pakiranja

- Deferasiroks Pharmascience 90 mg filmom obložene tablete su svijetloplave, ovaloidne, bikonveksne, filmom obložene tablete ukošenih rubova s utisnutom oznakom „90“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani. Približne dimenzije tablete su 10,3 mm × 4,1 mm.
- Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablete su plave, ovaloidne, bikonveksne, filmom obložene tablete ukošenih rubova s utisnutom oznakom „180“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani. Približne dimenzije tablete su 13,4 mm × 5,4 mm.
- Deferasiroks Pharmascience 360 mg filmom obložene tablete su tamnoplave, ovaloidne, bikonveksne, filmom obložene tablete ukošenih rubova s utisnutom oznakom „360“ na jednoj strani i bez oznake na drugoj strani. Približne dimenzije tablete su 16,6 mm × 6,6 mm.

Deferasiroks Pharmascience dostupan je u prozirnim PVC/PE/PVDC/aluminij blisterima. Dostupan je kao:

- Blisteri koji sadrže 30 ili 90 filmom obloženih tableta u pakiranju ili višestruka pakiranja koja sadrže 300 (10 pakiranja od 30) filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED

Lampousas 1
1095 Nicosia
Cipar

Proizvođač

PharOS MT Ltd
HF 62X Hal-Far Industrial Estate
BBG3000 Birzebbugia
Malta

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PHOENIX Farmacija d.o.o.
Ozaljska 95
10 000 Zagreb
Tel: 015588297

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Bugarska:	Deferasirox Pharmascience 180 mg, 360mg филмирани таблетки
Cipar:	Deferasirox Pharmascience 90 mg, 180mg, 360mg επικαλυμμένα με λεπτό νημένο δισκία
Hrvatska:	Deferasiroks Pharmascience 90 mg, 180mg, 360mg filmom obložene tablete
Mađarska:	Deferasirox Pharmascience 90 mg, 180mg, 360mg filmtabletta
Slovenija:	Deferasiroks Pharmascience 360 mg filmsko obložene tablete

HALMED
06 - 09 - 2021
ODOBRENO

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u rujnu 2021.