

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Voltaren retard 100 mg tablete s produljenim oslobađanjem

diklofenaknatrij

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Voltaren retard i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Voltaren retard
3. Kako uzimati Voltaren retard
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Voltaren retard
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Voltaren retard i za što se koristi

Voltaren retard sadrži djelatnu tvar diklofenak koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi.

Voltaren retard se primjenjuje za uklanjanje boli i upale različitog intenziteta u nizu stanja, uključujući:

- reumatske bolesti: reumatoidni artritis, osteoartritis, spondiloartritis (ankilozantni spondilitis i srodne bolesti), akutni napadaj gihta;
- akutni mišićno-koštani poremećaji: periartritis (upala zglobova), tendinitis (upala tetiva), tendosinovitis (upala tetiva i tetivnih ovojnica), burzitis (upala zglobnih vrećica);
- druga bolna stanja: bolna i upalna stanja nakon ozljede (prijelomi, uganuća, iščašenja), bolna menstruacija, bolna stanja kralježnice, bolna stanja nakon manjih ortopedskih, stomatoloških i drugih manjih kirurških zahvata.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Voltaren retard

Nemojte uzimati Voltaren retard:

- ako ste alergični na diklofenak, aspirin, ibuprofen ili neki drugi nesteroidni protuupalni lijek, ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). Znakovi reakcije preosjetljivosti uključuju poteškoće s disanjem, bol u prsnoj koži, curenje iz nosa, kožni

osip, oticanje lica, usana, jezika, grla i/ili ekstremiteta (znakovi angioedema) ili bilo koju drugu reakciju alergijskog tipa.

- ako imate ili ste ikada imali čir želuca ili crijeva, krvarenje u probavnom sustavu ili simptome poput krvi u sadržaju koji ste povratili, krvi u stolici te crne ili stolice boje katrana
- ako ste u zadnjem tromjesečju trudnoće
- ako bolujete od zatajenja jetre
- ako bolujete od zatajenja bubrega
- ako Vam je utvrđena bolest srca i/ili cerebrovaskularna bolest, npr. ako ste pretrpjeli srčani udar, moždani udar, mali moždani udar (TIA - tranzitorna ishemijska ataka) ili su Vam začepljene krvne žile koje vode do srca ili mozga, ili ste imali operativni zahvat radi uklanjanja ili premošćivanja začepljenja krvne žile
- ako imate ili ste imali probleme s cirkulacijom krvi (bolest perifernih arterija).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Voltaren retard.

Prije nego primijenite ovaj lijek, svakako obavijestite svog liječnika:

- ako pušite
- ako imate dijabetes
- ako istovremeno koristite druge protuupalne lijekove, uključujući acetilsalicilnu kiselinu/aspirin, kortikosteroide, lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi, antidepresive iz skupine SSRI.
- ako imate anginu, krvne ugruške, povišeni krvni tlak, povišen kolesterol ili povišene trigliceride
- ako patite ili ste ikada patili od neke bolesti probavnog sustava, npr. želučanih čireva, ulceroznog kolitisa ili Crohnove bolesti
- ako patite od nekog poremećaja krvi ili zgrušavanja krvi. U tom slučaju će liječnik vjerojatno zatražiti da se redovito kontrolirate za vrijeme dok uzimate Voltaren retard.
- ako imate ili ste ikada ranije imali bronhalnu astmu, ako patite od sezonskih alergija ili ste inače alergičar, ako patite od kronične opstruktivne bolesti pluća ili kroničnih infekcija dišnog sustava
- ako imate teško oštećenje funkcije jetre ili bolujete od porfirije (rijetke genetske bolesti)
- ako imate oštećenje funkcije bubrega
- ako ste ikada imali težak kožni osip ili ljuštenje kože, mjehuriće na koži i/ili ranice u ustima nakon uzimanja Voltarena retard ili drugih lijekova protiv boli
- ako imate oštećenje funkcije srca ili visok krvni tlak
- ako bolujete od sistemskog eritemskog lupusa ili mješovite bolesti vezivnog tkiva
- ako planirate zatrudnjeti ili dojite
- ako ste nedavno bili na operaciji ili morate ići na operaciju
- ako ste starije dobi (preko 65 g.), naročito ako ste krhkog zdravlja ili manje tjelesne težine.

Ako ste nedavno imali ili ćete imati kirurški zahvat na želucu ili crijevima, obavijestite svojeg liječnika prije uzimanja Voltarena, jer Voltaren može ponekad štetno utjecati na cijeljenje rana u crijevima nakon kirurškog zahvata.

Nuspojave se mogu umanjiti primjenom najniže učinkovite doze tijekom najkraćeg neophodnog vremenskog razdoblja.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Voltaren retard

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Voltaren retarda te se može pokazati potrebnim promijeniti dozu kojeg lijeka ili obustaviti njegovu primjenu stoga obavijestite svog liječnika ili ljekarnika uzimate li bilo koji od sljedećih lijekova:

- lijekove za sniženje razine šećera u krvi,
- lijekove protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin),
- antidepresive - lijekove koji se primjenjuju u liječenju depresije,
- lijekove za mokrenje (diuretike),
- litij – lijek koji se primjenjuje u liječenju nekih psihijatrijskih bolesti,
- metotreksat – lijek koji se primjenjuje u liječenju novotvorina,
- ciklosporin i takrolimus – lijekove koji se primjenjuju za supresiju imunološkog sustava tijela, što omogućuje tijelu da prihvati transplantirani organ,
- kinolonske antibiotike – lijekove koji se primjenjuju u liječenju infekcija,
- kortikosteroide – lijekove koji djeluju protuupalno i koče djelovanje imunološkog sustava,
- bilo koji drugi nesteroidni protuupalni lijek, na primjer acetilsalicilatnu kiselinu ili ibuprofen,
- mifepriston – lijek koji se primjenjuje za prekid trudnoće,
- srčane glikozide (na primjer digoksin) – lijekove koji se primjenjuju zbog poteškoća sa srcem,
- lijekove za liječenje srčanih stanja i povišenog krvnog tlaka, npr. beta-blokatore ili ACE inhibitore,
- fenitoin – lijek koji se primjenjuje u liječenju epilepsije,
- kolestipol i kolestiramin – lijekove koji se primjenjuju u liječenju povišenih masnoća u krvi,
- ostale lijekove koji se metaboliziraju putem određenih jetrenih enzima (inhibitori enzima CYP2C9, poput sulfinpirazona i vorikonazola),
- trimetoprim – lijek koji se primjenjuje za liječenje bakterijskih infekcija,
- rifampicin – lijek koji se primjenjuje za liječenje bakterijskih infekcija.

Ostala upozorenja

- Lijek je potrebno primijeniti u najnižim učinkovitim dozama u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju potrebnom za kontrolu simptoma, posebno u starijih bolesnika ili u onih manje tjelesne težine.
- Postoji manji porast rizika od srčanog napada ili moždanog udara kada uzimate ovaj lijek. Rizik je veći ako uzimate visoke doze dulje vrijeme. Uvijek slijedite upute liječnika o tome koliko uzeti i koliko dugo uzimati lijek.
- Dok uzimate ovaj lijek, liječnik će Vas možda povremeno trebati pregledati.

- Ako ste imali želučanih problema kada ste uzimali nesteroidne protuupalne lijekove (NSAIL), osobito ako ste starije dobi, morate odmah obavijestiti svog liječnika ukoliko primijetite neke neuobičajene simptome.
- Budući da je ovo protuupalni lijek, Voltaren retard može ublažiti znakove infekcije, npr. glavobolju ili vrućicu. Ako se ne osjećate dobro i trebate posjetiti liječnika, ne zaboravite mu reći da uzimate Voltaren retard.

Voltaren retard s hranom i pićem

Voltaren retard tablete se preporučuje popiti cijele s čašom vode prije jela i ne smiju se lomiti niti žvakati.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Zabilježeni su povećan rizik od pobačaja i poremećaji u razvoju djece čije su majke tijekom rane trudnoće uzimale lijekove iz skupine nesteroidnih protuupalnih lijekova.

Voltaren retard se **ne preporučuje** uzimati tijekom prvog i drugog tromjesečja trudnoće.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako ste u posljednjem tromjesečju trudnoće jer to može naškoditi Vašem nerođenom djetetu ili prouzročiti probleme pri porodu. Lijek može prouzročiti probleme s bubrezima i srcem u Vašeg nerođenog djeteta. Može utjecati na Vašu ili djetetovu sklonost krvarenju te prouzročiti da porod nastupi kasnije ili traje dulje od očekivanog. Lijek Voltaren retard ne smijete uzimati tijekom prvih šest mjeseci trudnoće, osim ako je to izričito neophodno i ako Vam to savjetuje liječnik. Ako Vam je potrebno liječenje tijekom tog razdoblja ili dok pokušavate zatrudnjeti, morate uzimati najnižu dozu tijekom najkraćeg mogućeg razdoblja. Ako se uzima dulje od nekoliko dana od 20. tjedna trudnoće nadalje, Voltaren retard može prouzročiti probleme s bubrezima u Vašeg nerođenog djeteta što može dovesti do niskih razina plodne vode koja okružuje dijete (oligohidramnion), ili suženje krvne žile (arterijski duktus) u djetetovom srcu. Ako Vam je liječenje potrebno dulje od nekoliko dana, Vaš liječnik može preporučiti dodatno praćenje.

Dojenje

Diklofenak prelazi u malim količinama u majčino mlijeko. Ne uzimajte ovaj lijek tijekom dojenja kako biste izbjegli neželjene učinke koje lijek može imati na dijete.

Plodnost

Ako pokušavate zatrudnjeti, uzimanje ovog lijeka to može otežati. Obratite se svom liječniku ako planirate zatrudnjeti, ili ako imate poteškoća sa začećem.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako tijekom primjene ovog lijeka imate omaglicu, vrtoglavicu, pospanost ili slične simptome, uključujući smetnje vida, nemojte upravljati vozilima niti raditi na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Voltaren retarda

Voltaren retard sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Voltaren retard sadrži natrij iz diklofenaknatrija. Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Voltaren retard

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Voltaren retard se primjenjuje u najnižoj dozi tijekom najkraćeg vremenskog razdoblja potrebnog za postizanje zadovoljavajućeg terapijskog učinka.

Odrasle osobe

U odraslih je uobičajena doza jedna Voltaren retard 100 mg tableta dnevno.

Maksimalna preporučena dnevna doza diklofenaka je 150 mg.

Tamo gdje su simptomi najizraženiji tijekom noći ili ujutro, Voltaren retard tablete treba uzimati navečer.

Starije osobe

Stariji, pogotovo oni koji su slabi ili imaju nisku tjelesnu težinu, mogu biti osjetljiviji na učinke Voltarena od ostalih odraslih osoba. Liječnik Vam može propisati nižu dozu od one uobičajene za odrasle. Posebno pažljivo treba pratiti upute liječnika i uzeti najnižu dozu te odmah prijaviti neželjene učinke svom liječniku.

Oštećenje funkcije bubrega i jetre

Preporučuje se oprez pri primjeni diklofenaka u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega te u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije jetre.

Primjena u djece i adolescenata

Voltaren retard tablete se ne smiju primjenjivati u djece i adolescenata.

Način primjene

Tabletu treba progutati cijelu s čašom vode, po mogućnosti s jelom. Tabletu nemojte lomiti niti žvakati.

Ako uzmete više Voltarena retard nego što ste trebali

Ako greškom uzmete preveliku dozu Voltarena retard, o tome odmah obavijestite liječnika.

Znakovi predoziranja diklofenakom nisu tipični. Mogu se pojaviti simptomi u probavnom sustavu (od nadražaja do krvarenja iz probavnog sustava), snižen krvni tlak, usporeno disanje, znakovi oštećenja rada bubrega (do naglog bubrežnog zatajenja) i znakovi oštećenja rada središnjeg živčanog sustava (od letargije i pospanosti do konvulzija i kome).

Ako ste zaboravili uzeti Voltaren retard

Ako ste zaboravili uzeti dozu Voltaren retarda, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je prošlo dosta vremena i blizu je vrijeme za sljedeću dozu, zaboravljenu dozu ne nadoknađujte, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Unutar 24 sata nemojte uzeti više od jedne doze lijeka Voltaren retard.

Ako prestanete uzimati Voltaren retard

Voltaren retard uzimajte onoliko dugo koliko Vam je to preporučio liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite bilo što od niže navedenog, odmah prestanite uzimati Voltaren retard i obavijestite o tome liječnika ili otiđite u najbližu bolnicu:

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- znakovi koji ukazuju na zatajivanje srca: osjećaj lupanja srca, oticanje dijelova tijela, osjećaj nedostatka zraka, umor, slabost, nesvjestica
- znakovi koji ukazuju na srčani udar: pritisak, stezanje i bol u prsima ili rukama, koja se može proširiti na vrat, čeljust i leđa, mučnina, probavne smetnje, žgaravica ili bolovi u trbuhu, kratkoća daha, znojenje ili hladan znoj, osjećaj tjeskobe, umor, vrtoglavica.

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- reakcije preosjetljivosti (alergijske reakcije) koje mogu dovesti do sniženja krvnog tlaka i nesvjestice, smetenosti ili grozničavosti
- bilo koji znak krvarenja u želucu ili crijevu, npr. pri pražnjenju crijeva, krv u sadržaju koji ste povratili, crna ili stolica poput katrana
- blagi grčevi i osjetljivost u trbuhu koji su se javili nedugo nakon početka liječenja ovim lijekom, praćeni rektalnim krvarenjem ili krvavim proljevom, obično u roku 24 sata od pojave boli u trbuhu.

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

- alergijska reakcija kao što je osip i svrbež, ponekad udružen s problemima s disanjem ili oteklinom usana, jezika, grla ili lica te nedostatkom zraka (tzv. angioedem)
- mjehuri po koži, kožni osip ili crvenilo s plikovima i ljuštenjem kože što može biti popraćeno s oštećenjem sluznice usne šupljine, koji se mogu razviti u po život opasne reakcije na koži (Stevens Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)
- ustrajne i česte grlobolje ili povišena tjelesna temperatura (znakovi agranulocitoze)
- neočekivana promjena količine mokraće i/ili njena izgleda (poremećaji rada bubrega karakterizirani općim lošim osjećanjem, čestim mokrenjem, krvi ili proteini u mokraći, boli tijekom mokrenja, prisilnom potrebom za mokrenjem, pojavom boli u leđima i slabinama, visokim krvnim tlakom, otečenim licem i abdomenom, teškim smanjenjem izlučivanja urina)
- znakovi koji ukazuju na meningitis (upala membrana koje prekrivaju mozak i leđnu moždinu): vrućica, glavobolja, ukočeni vrat, povraćanje, osjetljivost na svjetlo (fotofobija), promijenjeno stanje svijesti (preosjetljivost, nemir, smetenost, pospanost do kome)
- znakovi koji ukazuju na moždani udar: utrnulost, slabost ili oduzetost lica, ruke ili noge, poremećaj govora, poremećaj vida, jaka glavobolja, gubitak ravnoteže i/ili koordinacije, omaglica ili vrtoglavica

- zatajenje funkcije jetre (karakterizirano pojavom žutog obojenja kože i sluznica, sklonosti stvaranju podljeva ili krvarenja, nakupljanjem tekućine u trbuhu, umorom, slabošću, mučninom i gubitkom apetita)
- poremećaji debelog crijeva (uključujući upalu debelog crijeva i pogoršanje stanja kao što su ulcerozni kolitis ili Chronova bolest), upala gušterače (karakterizirana bolovima u gornjem dijelu trbuha koji se šire prema leđima i pojačavaju se nakon jela, mučnina i povraćanje)
- upala pluća karakterizirana kratkoćom daha, kašljanjem i povišenom temperaturom (pneumonitis).

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- bol u prsnom košu, što može biti znak potencijalno ozbiljne alergijske reakcije poznate pod nazivom Kounisov sindrom
- ozbiljna alergijska kožna reakcija koja može uključivati velike, raširene crvene i/ili tamne mrlje, oticanje kože, mjehuriće i svrbež (generalizirana bulozna fiksna erupcija uzrokovana lijekom).

Ostale nuspojave različite težine u bolesnika koji su uzimali diklofenak su navedene niže:

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- glavobolja, omaglica, vrtoglavica
- mučnina, povraćanje, proljev, loša probava, gubitak teka, bol u trbuhu, vjetrovi
- kožni osip
- povišene razine jetrenih enzima.

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- osjećaj lupanja srca (palpitacije), bol u prsnom košu

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- pospanost, umor
- upala želuca (gastritis)
- astma (osjećaj stezanja u prsima, piskanje pri disanju i kašalj), otežano disanje
- poremećaji funkcije jetre, uključujući upalu jetre (hepatitis) i žuticu (žuto obojenje kože ili bjeloočnica)
- koprivnjača (urtikarija)
- zadržavanje tekućine, simptomi među koje se ubraja i oticanje zglobova.

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

- poremećaji krvi uključujući manjak crvenih krvnih stanica (eritrocita), manjak bijelih krvnih stanica (leukocita) i krvnih pločica (trombocita)
- dezorijentacija, depresija, nesanica, noćne more, razdražljivost, psihotični poremećaji, promjene raspoloženja
- peckanje ili utrnulost prstiju, oslabljeno pamćenje, napadaji, tjeskoba, nevoljno drhtanje, poremećaj okusa
- poremećaji vida, zamućen ili dvostruki vid
- oštećenje sluha, zvonjenje u ušima (tinitus)
- povišenje krvnog tlaka (hipertenzija), sniženje krvnog tlaka (hipotenzija), upala krvnih žila (vaskulitis)

- zatvor, upala jezika, ulceracije u ustima (afte), poremećaji jednjaka, grčevi u gornjem dijelu trbuha, naročito nakon jela (znak bolesti intestinalne dijafragme), promjene okusa
- mjehuri po koži, žareći osip, kožni osip koji se može pogoršati izlaganjem sunčevu svjetlu, ispadanje kose, svrbež, crvenilo, ljubičasti kožni osip (znak purpura)
- impotencija.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- ishemijski kolitis
- optički neuritis
- smetenost, halucinacije, malaksalost
- alergijska kožna reakcija koja može uključivati okrugle ili ovalne crvene mrlje i oticanje kože, pojavu mjehurića i svrbež (fiksna erupcija uzrokovana lijekom). Može doći i do tamnjenja kože u zahvaćenim područjima, što se može zadržati i nakon zacjeljivanja. Fiksna erupcija uzrokovana lijekom obično se ponavlja na istom(im) mjestu(ima) ako se lijek ponovno uzme.

Ako uzimate Voltaren retard više od nekoliko tjedana, svakako posjetite svog liječnika zbog redovitog pregleda kako bi se utvrdilo da ne patite od neželjenih učinaka lijeka.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Voltaren retard

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte ga na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Voltaren retard sadrži

Djelatna tvar je diklofenaknatrij.

Jedna Voltaren retard tableta s produljenim oslobađanjem sadrži 100 mg diklofenaknatrija.

Drugi sastojci su: saharoza, cetilni alkohol, silicijev dioksid koloidni, bezvodni, povidon, magnezijev stearat, hipromeloza, željezov oksid, crveni (E172), polisorbit 80, talk, titanijev dioksid (E171), makrogol.

Kako Voltaren retard izgleda i sadržaj pakiranja

Voltaren retard 100 mg tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete s ovalnim rubovima, s utisnutom oznakom „CGC“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „CG“ na drugoj strani, promjera oko 9,2 mm.

Voltaren retard tablete su dostupne u pakiranju od 20 tableta s produljenim oslobađanjem, u blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**

Novartis Hrvatska d.o.o.
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb

Proizvođač

Novartis Farma S.p.A.
Via Provinciale Schito 131
80058 Torre Annunziata (NA)
Italija

Novartis Pharma GmbH
Roonstrasse 25
D-90429 Nürnberg
Njemačka

Novartis Farmacéutica S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 764
08013 Barcelona
Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u kolovozu 2025.