

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Zegluxen 6 mg/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici liraglutid

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Zegluxen i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zegluxen
3. Kako primjenjivati Zegluxen
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Zegluxen
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Zegluxen i za što se koristi

Zegluxen sadrži djelatnu tvar liraglutid. Ona pomaže Vašem organizmu da snizi razinu šećera u krvi samo onda kad je šećer u krvi previsok. Ona također usporava prolazak hrane kroz želudac.

Zegluxen se koristi samostalno ako ne postizete dobru kontrolu šećera u krvi samo djetom i tjelovježbom, a ne možete uzimati metformin (drugi lijek za šećernu bolest).

Zegluxen se koristi s drugim lijekovima za šećernu bolest kada oni nisu dovoljni za kontrolu razine šećera u krvi. To mogu biti:

- lijekovi za liječenje šećerne bolesti koji se primjenjuju kroz usta (primjerice, metformin, pioglitazon, sulfonilureja, inhibitor suprijenosnika natrija-glukoze 2 (inhibitor SGLT2)) i/ili inzulin.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Zegluxen

##### Nemojte primjenjivati Zegluxen

- ako ste alergični na liraglutid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri:

- prije nego primijenite lijek Zegluxen.
- ako imate ili ste imali bolest gušterače.

Ako znate da ćete biti podvrgnuti kirurškom zahvatu u kojem ćete biti pod anestezijom (u stanju sna), obavijestite svog liječnika da uzimate ovaj lijek.

Ovaj lijek ne smijete primjenjivati ako imate šećernu bolest tipa 1 (tijelo uopće ne stvara inzulin) ili dijabetičku ketoacidozu (komplikacija šećerne bolesti s visokim šećerom u krvi i pojačanim naporom pri disanju). To nije inzulin i stoga se ne smije koristiti kao zamjena za inzulin.

Primjena lijeka Zegluxen ne preporučuje se ako ste na dijalizi.  
Primjena lijeka Zegluxen ne preporučuje se ako imate tešku bolest jetre.  
Primjena lijeka Zegluxen se ne preporučuje ako imate teško zatajenje srca.

Ovaj lijek se ne preporučuje ako imate teških problema sa želucom ili crijevima, što rezultira odgođenim pražnjenjem želuca (naziva se i gastropareza) ili upalnu bolest crijeva.

Ako imate simptome akutne upale gušterače, kao što je ustrajna i jaka bol u trbuhu, morate se odmah posavjetovati s liječnikom (pogledajte dio 4).

Ako imate bolest štitnjače uključujući čvoriće u štitnjači i povećanu štitnu žlijezdu, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Pri započinjanju liječenja lijekom Zegluxen u nekim slučajevima možete osjetiti gubitak tekućine/dehidraciju, primjerice u slučaju povraćanja, mučnine i proljeva. Važno je izbjeći dehidraciju tako što ćete piti puno tekućine. Kontaktirajte svog liječnika ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica.

### **Djeca i adolescenti**

Zegluxen se može primijeniti u adolescenata i djece u dobi od 10 i više godina. Nema dostupnih podataka u djece mlađe od 10 godina.

### **Drugi lijekovi i Zegluxen**

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Naročito je potrebno da liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru obavijestite ako uzimate lijekove koji sadrže bilo koju od sljedećih djelatnih tvari:

- Sulfonilureju (kao što je glimepirid ili glibenklamid) ili inzulin. Može se javiti hipoglikemija (niska razina šećera u krvi) kad lijek Zegluxen primjenjujete zajedno sa sulfonilurejom ili inzulinom, jer sulfonilureja i inzulin povećavaju rizik od hipoglikemije. Kad prvi puta započnete ove lijekove uzimati zajedno, liječnik Vam može reći da smanjite dozu sulfonilureje ili inzulina. Pogledajte dio 4. za znakove upozorenja na nizak šećer u krvi. Ako uzimate i sulfonilureju (kao što je glimepirid ili glibenklamid) ili inzulin, liječnik Vam može reći da provjerite razine šećera u krvi. To će pomoći Vašem liječniku da odluči da li je potrebno promijeniti dozu sulfonilureje ili inzulina.
- Ako primjenjujete inzulin, Vaš će vas liječnik uputiti kako da smanjite dozu inzulina te će Vam preporučiti da učestalije pratite razinu šećera u krvi kako biste izbjegli hiperglikemiju (visoka razina šećera u krvi) i dijabetičku ketoacidozu (komplikacija dijabetesa koja se pojavljuje ako organizam ne može razgraditi glukozu jer nema dovoljno inzulina).
- Varfarin ili druge lijekove protiv zgrušavanja krvi koji se uzimaju kroz usta. Možda će biti potrebne učestalije pretrage krvi kako bi se odredila sposobnost zgrušavanja krvi.

### **Trudnoća i dojenje**

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku. Ovaj lijek se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće jer nije poznato može li naštetiti Vašem nerođenom djetetu.

Nije poznato prelazi li liraglutid u majčino mlijeko, stoga nemojte koristiti ovaj lijek ako dojite.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Niska razina šećera u krvi (hipoglikemija) može umanjiti Vašu sposobnost koncentracije. Izbjegavajte upravljanje vozilima ili strojevima ako osjetite znakove hipoglikemije. Pogledajte dio 4. za znakove upozorenja na nizak šećer u krvi. Posavjetujte se s liječnikom kako biste dobili dodatne podatke o ovoj temi.

### **Zegluxen sadrži natrij.**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

### **3. Kako primjenjivati Zegluxen**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

- Početna doza je 0,6 mg jedanput na dan, kroz najmanje jedan tjedan.
- Liječnik će Vam reći kad trebate povisiti dozu na 1,2 mg jedanput na dan.
- Liječnik Vam može reći da povisite dozu na 1,8 mg jedanput na dan, ako se uz dozu od 1,2 mg nije postigla primjerena regulacija glukoze u krvi.

Nemojte mijenjati dozu lijeka ako Vam liječnik to nije rekao.

Zegluxen se daje kao injekcija pod kožu (supkutano). Nemojte je injicirati u venu ili mišić. Najbolja mjesta za davanje injekcija su prednja strana bedara, područje trbuha (abdomen) ili nadlaktica. Svakog dana promijenite mjesto injiciranja kako biste smanjili rizik od nastanka kvržica.

Injekciju si možete dati u bilo koje doba dana, bez obzira na obroke. Kad jednom utvrdite koje doba dana Vam je najprikladnije, poželjno je Zegluxen injicirati otprilike u isto vrijeme svakog dana.

Prije prve uporabe brizgalice liječnik ili medicinska sestra pokazat će Vam kako je upotrebljavati. Detaljne upute za uporabu nalaze se na drugoj strani ove upute.

Igle za injekcije nisu uključene u brizgalicu. Na primjer, mogu se koristiti BD Ultra-Fine™ jednokratne igle ili NovoFine® jednokratne igle debljine do 32 G i dužine do 8 mm.

### **Ako primijenite više lijeka Zegluxen nego što ste trebali**

Ako primijenite više lijeka Zegluxen nego što ste trebali, odmah razgovarajte s liječnikom. Možda ćete trebati medicinski tretman. Može se pojaviti mučnina, povraćanje, proljev ili niska razina šećera u krvi (hipoglikemija). Za znakove upozorenja na nisku razinu šećera u krvi pogledajte dio 4.

### **Ako ste zaboravili primijeniti Zegluxen**

Ako ste zaboravili primijeniti jednu dozu, primijenite Zegluxen čim se sjetite. Međutim, ako je prošlo više od 12 sati od vremena kad ste trebali primijeniti Zegluxen, preskočite propuštenu dozu. Potom primijenite sljedeću dozu kako je uobičajeno sljedeći dan. Nemojte uzeti dodatnu dozu niti povećati dozu sljedeći dan kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

### **Ako prestanete primjenjivati Zegluxen**

Nemojte prestati primjenjivati ovaj lijek bez razgovora s liječnikom. Ako ga prestanete primjenjivati, razina šećera u krvi može Vam se povisiti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

#### **Ozbiljne nuspojave**

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

- Hipoglikemija (niska razina šećera u krvi). Znakovi koji upozoravaju na nisku razinu šećera u krvi mogu se pojaviti iznenada, a mogu uključivati: hladan znoj, hladnu blijedu kožu, glavobolju, ubrzane otkucaje srca, mučninu, snažan osjećaj gladi, promjene vida, osjećaj pospanosti, osjećaj slabosti, nervozu, tjeskobu, smetenost, poteškoće s koncentracijom te tresavicu (nevoljno drhtanje). Liječnik će Vam reći kako liječiti nizak šećer u krvi i što učiniti

primijetite li te znakove upozorenja. Veća je vjerojatnost da će se to dogoditi ako uzimate i sulfonilureju ili inzulin. Liječnik Vam može smanjiti dozu ovih lijekova prije nego započnete s primjenom lijeka Zegluxen.

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

- Težak oblik alergijske reakcije (anafilaktička reakcija) s dodatnim simptomima kao što su problemi s disanjem, oticanje grla i lica, ubrzani otkucaji srca itd. Ako osjetite ove simptome, morate odmah zatražiti medicinsku pomoć i što prije obavijestiti svog liječnika.
- Opstrukcija crijeva. Teški oblik zatvora s dodatnim simptomima kao što je bol u trbuhu, nadutost, povraćanje itd.

Vrlo rijetko: mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba

- Slučajevi upale gušterače (pankreatitis). Pankreatitis može biti ozbiljno medicinsko stanje, potencijalno opasno po život. Prestanite primjenjivati Zegluxen i odmah se obratite liječniku ako primijetite bilo koju od navedenih ozbiljnih nuspojava:

Jaku i ustrajnu bol u abdomenu (području trbuha) koja se može protezati na leđa, kao i mučninu i povraćanje, jer to mogu biti znakovi upale gušterače (pankreatitisa).

### **Druge nuspojave**

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

- Mučnina. Obično prolazi s vremenom.
- Proljev. Obično prolazi s vremenom.

Često: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

- Povraćanje

Pri započinjanju liječenja lijekom Zegluxen u nekim slučajevima možete osjetiti gubitak tekućine/dehidraciju, primjerice u slučaju povraćanja, mučnine i proljeva. Važno je izbjeći dehidraciju tako što ćete piti puno tekućine.

- Glavobolja
- Probavne tegobe
- Upala želuca (gastritis). Znakovi uključuju bolove u želucu, mučninu i povraćanje.
- Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB). Znakovi uključuju žgaravicu.
- Bolan ili otečen trbuh (abdomen)
- Nelagoda u trbuhu
- Zatvor
- Vjetrovi (flatulencija)
- Smanjen apetit
- Bronhitis
- Obična prehlada
- Omaglica
- Ubrzani puls
- Umor
- Zubobolja
- Reakcije na mjestu injiciranja (kao što su modrice, bol, nadraženost, svrbež i osip)
- Porast enzima gušterače (kao što su lipaza i amilaza).

Manje često: mogu se javiti u do 1 na 100 osoba

- Alergijske reakcije kao što su pruritus (svrbež) i koprivnjača (vrsta kožnog osipa)
- Dehidracija, ponekad sa smanjenjem bubrežne funkcije
- Opće loše stanje (malaksalost)
- Žučni kamenci
- Upala žučnog mjehura
- Poremećaj osjeta okusa

- Odgođeno pražnjenje želuca.

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

- Kvržice ispod kože koje mogu biti uzrokovane nakupljanjem bjelančevine koja se zove amiloid (kožna amiloidoza, učestalost nuspojave nije poznata).

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojave: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojave možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Zegluxen**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici brizgalice i kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

### Prije otvaranja:

Čuvati u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

### Tijekom uporabe:

Brizgalicu možete koristiti mjesec dana ako je čuvate na temperaturi ispod 30°C ili u hladnjaku (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

Kad brizgalicu ne koristite, zatvorite je zatvaračem brizgalice radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako otopina nije bistra i bezbojna ili gotovo bezbojna.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Zegluxen sadrži**

- Djelatna tvar je liraglutid. Jedan ml otopine za injekciju sadrži 6 mg liraglutida. Jedna napunjena brizgalica sadrži 18 mg liraglutida.
- Drugi sastojci su natrijev citrat dihidrat, propilenglikol, fenol i voda za injekcije. Osim toga, otopina kloridne kiseline i/ili natrijevog hidroksida može biti dodana za prilagodbu pH vrijednosti.

### **Kako Zegluxen izgleda i sadržaj pakiranja**

Zegluxen je bistra i bezbojna ili gotovo bezbojna otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici. Jedna brizgalica sadrži 3 ml otopine za davanje 30 doza od 0,6 mg, 15 doza od 1,2 mg ili 10 doza od 1,8 mg.

Zegluxen je dostupan u pakiranjima koja sadrže 1, 2, 3, 5 brizgalica ili višestruko pakiranje od 2 pakiranja 5 napunjenih brizgalica (10 napunjenih brizgalica). Igle nisu priložene.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja:**

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130

102 37 Prag 10

Češka

**Proizvođač:**

Pharmadox Healthcare Ltd.  
KW20A Kordin Industrial Park  
Paola PLA 3000  
Malta

**Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**

Zentiva d.o.o.  
Av. V. Holjevca 40  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel: +385 1 6641 830  
[PV-Croatia@zentiva.com](mailto:PV-Croatia@zentiva.com)

**Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:**

Austrija	Zegluxen 6 mg/ml Injektionslösung in einem Fertigpen
Bugarska	ЗЕГЛУКСЕН
Češka	ZEGLUXEN
Poljska	ZEGLUXEN
Rumunjska	ZEGLUXEN 6mg/ml solutie injectabila in stilou preumplut

**Način i mjesto izdavanja lijeka**






Lijek se izdaje na recept, u ljekarni




**Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2025.**

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode (<http://www.halmed.hr>).

## Ostali izvori informacija

### UPUTE ZA UPORABU BRIZGALICE ZEGLUXEN

<p><b>Prije uporabe brizgalice pažljivo pročitajte ove upute.</b></p> <p>Vaša brizgalica sadrži 18 mg liraglutida. Možete odabrati doze od 0,6 mg, 1,2 mg i 1,8 mg.</p> <p>Brizgalica je namijenjena za uporabu s jednokratnim iglama. Igle nisu uključene u pakiranje. Za korištenje s ovim uređajem preporučuju se jednokratne igle BD Ultra fine™ ili NovoFine®.</p>	<p>Igla (primjer)</p> 
<p>Liraglutid injekcijska brizgalica</p> 	
<p><b>Priprema brizgalice</b></p> <p><b>Provjerite naziv i obojenu naljepnicu</b> Vaše brizgalice kako biste bili sigurni da sadrži liraglutid. Primjena krivog lijeka može uzrokovati teške posljedice.</p> <p>Skinite zatvarač brizgalice.</p>	
<p>Skinite papirnatu naljepnicu s nove jednokratne igle. Navijte iglu ravno i čvrsto na brizgalicu.</p>	
<p>Skinite vanjski zatvarač igle i sačuvajte ga za poslije.</p>	


<p>Skinite unutarnji zatvarač igle i bacite ga u otpad.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>△ Uvijek upotrijebite novu iglu za svaku injekciju. Time se smanjuje rizik od onečišćenja, infekcije, istjecanja liraglutida, začepljenja igala i netočnog doziranja.</li> <li>△ Pazite da ne savijete ili oštetite iglu.</li> <li>△ Nikad nemojte pokušavati vratiti unutarnji zatvarač igle natrag na iglu. Mogli biste se ubosti na iglu.</li> </ul>	
<p><b>Održavanje brizgalice</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemojte pokušavati popraviti brizgalicu ili je rastavljati.</li> <li>• Držite brizgalicu zaštićenu od prašine, prljavštine i svih vrsta tekućina.</li> <li>• Čistite brizgalicu tkaninom navlaženom blagim deterdžentom.</li> <li>• Nemojte je pokušavati prati, namakati ili podmazivati – to može oštetiti brizgalicu.</li> </ul>	
<p>△ <b>Važne informacije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nemojte dijeliti svoju brizgalicu i igle s drugim osobama.</li> <li>• Držite brizgalicu izvan dohvata drugih osoba, osobito djece.</li> <li>• Svaki dan promijenite mjesto injiciranja kako biste smanjili rizik od nastanka kvržica.</li> </ul>	
<p><b>Provjerite protok svaki puta kad uzmete novu brizgalicu</b></p> <p><b>Provjerite protok prije prvog injiciranja svaki puta kad uzmete novu brizgalicu. Ako je brizgalicu već u upotrebi, prijedite na dio ‘Odabir doze’, korak H.</b></p> <p>Okrećite izbornik doze dok se simbol za provjeru protoka ne poravnava s pokazivačem.</p>	
<p>Držite brizgalicu s iglom okrenutom prema gore. Nekoliko puta lagano kucnite prstom po ulošku. Tako će se mjehurići zraka skupiti na vrhu uloška.</p>	

Držeći iglu prema gore pritisnite gumb za doziranje sve dok se 0 mg ne poravna s pokazivačem.

Kapljica liraglutida trebala bi se pojaviti na vrhu igle. Ako se kapljica ne pojavi, ponavljajte korake **E** do **G** do četiri puta.

Ako se još uvijek ne pojavi kapljica liraglutida, promijenite iglu i ponovite korake **E** do **G** još jednom.

Nemojte koristiti brizgalicu ako se kapljica liraglutida i dalje ne pojavljuje. To ukazuje da je brizgatica neispravna pa morate upotrijebiti novu.



△ Ako Vam je brizgatica ispala na tvrdu površinu ili sumnjate da s njom nešto nije u redu, uvijek stavite novu jednokratnu iglu i provjerite protok prije injiciranja.

### Odabir doze

**Uvijek provjerite je li pokazivač poravnan sa 0 mg.**

Okrećite izbornik doze sve dok se potrebna doza ne poravna s pokazivačem (0,6 mg, 1,2 mg ili 1,8 mg).

Ako zabunom odaberete pogrešnu dozu, jednostavno je promijenite okretanjem izbornika doze unaprijed ili unazad sve dok se ispravna doza ne poravna s pokazivačem.

Pazite da ne pritisnete gumb za doziranje kad okrećete izbornik doze unazad, jer bi liraglutid mogao iscuriti.

Ako se izbornik doze zaustavi prije negoli se potrebna doza poravnala s pokazivačem, to znači da nije ostalo dovoljno liraglutida za cijelu dozu. Tada možete učiniti sljedeće:



#### **Razdijelite Vašu dozu u dvije injekcije:**

Okrećite izbornik doze u bilo kojem smjeru sve dok se 0,6 mg ili 1,2 mg ne poravna s pokazivačem. Injicirajte dozu. Potom pripremite novu brizgalicu za injiciranje i injicirajte preostali broj mg kako biste dopunili svoju dozu.

Dozu možete razdijeliti između sadašnje i nove brizgalice, samo ako ste za to obučeni ili su Vas tako savjetovali Vaš liječnik ili medicinska sestra. Koristite kalkulator za planiranje doza. Ako pogrešno razdijelite dozu, mogli biste injicirati previše ili premalo liraglutida.

#### **Injicirajte cijelu dozu novom brizgalicom:**

Ako se izbornik doze zaustavi prije negoli se 0,6 mg poravna s pokazivačem, pripremite novu brizgalicu i injicirajte cijelu dozu novom brizgalicom.




- ⚠ Nemojte pokušavati odabrati druge doze osim onih od 0,6 mg, 1,2 mg ili 1,8 mg. Brojke na zaslonu moraju se precizno poravnati s pokazivačem kako biste dobili točnu dozu. Izbornik doze škljoca kad ga se okreće. Nemojte koristiti taj zvuk za odabir doze. Nemojte koristiti skalu na ulošku za mjerenje količine liraglutida koju ćete injicirati – to nije dovoljno točno.

### Injicirajte svoju dozu

**Zabodite iglu u kožu tehnikom injiciranja koju Vam je pokazao liječnik ili medicinska sestra. Potom slijedite niže navedene upute:**

Injicirajte tako da pritisnete gumb za doziranje sve dok se 0 mg ne poravna s pokazivačem. Pazite da ostalim prstima ne dotičete zaslon ili da postrance ne pritisnete izbornik doze tijekom injiciranja, jer bi to moglo blokirati injiciranje.


Držite gumb za doziranje pritisnutim i zadržite iglu pod kožom najmanje 6 sekundi. Tako ćete biti sigurni da ste primili cijelu dozu.



Izvucite iglu.

Nakon toga možete vidjeti kapljicu liraglutida na vrhu igle.


To je normalno i nema učinka na Vašu dozu.



Gurnite vrh igle u vanjski zatvarač igle ne dotičući iglu ili vanjski zatvarač igle.



Kad je igla pokrivena, pažljivo gurnite vanjski zatvarač igle do kraja. Potom odvijte iglu. Pažljivo je bacite u otpad i vratite zatvarač na brizgalicu.



Kad je brizgalice prazna pažljivo je bacite u otpad, bez pričvršćene igle. Brizgalicu i iglu bacite u otpad sukladno lokalnim propisima.

- ⚠ Nakon svakog injiciranja uvijek skinite iglu i spremite svoju brizgalicu bez pričvršćene igle.
- ⚠ Tako se smanjuje rizik od onečišćenja, infekcije, istjecanja liraglutida, začepjenja igala i netočnog doziranja.
- ⚠ Osobe koje skrbe za bolesnika moraju biti osobito oprezne pri rukovanju rabljenim iglama kako bi spriječile ozljedu iglama i križnu infekciju.