

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Zopiklon Grindeks 3,75 mg filmom obložene tablete

Zopiklon Grindeks 5 mg filmom obložene tablete

Zopiklon Grindeks 7,5 mg filmom obložene tablete

zopiklon

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Zopiklon Grindeks i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Zopiklon Grindeks
3. Kako uzimati Zopiklon Grindeks
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Zopiklon Grindeks
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Zopiklon Grindeks i za što se koristi

Zopiklon Grindeks je lijek za spavanje sa djelatnom tvari zopiklon. Koristi se kod odraslih kao lijek za spavanje za različite vrste problema sa spavanjem, npr. poteškoće s uspjavanjem, prerano buđenje ili učestala noćna buđenja. Zopiklon Grindeks se koristi za kratkotrajne poremećaje spavanja. Zopiklon Grindeks će vam biti propisan samo ako je vaš problem sa spavanjem ozbiljan, onesposobljava ili vam uzrokuje veliku tjeskobu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Zopiklon Grindeks

Nemojte uzimati Zopiklon Grindeks

- ako ste alergični na zopiklon ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako bolujete od neke od sljedećih bolesti:
 - teška bolest jetre;
 - sindrom apneje u snu (poremećaj spavanja s privremenim prekidima disanja tijekom spavanja);
 - ozbiljna mišićna slabost koja se naziva miastenija gravis (autoimuna bolest);
 - jake poteškoće s disanjem (teško respiratorno zatajenje).
- ako ste ikada nakon uzimanja zopiklona doživjeli mjesečarenje ili drugo neuobičajeno ponašanje (poput vožnje, jedenja, telefoniranja ili spolnih odnosa itd.), a da niste potpuno budni.

Upozorenja i mjere opreza

Općenito

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Zopiklon Grindeks.

Prije početka liječenja lijekom Zopiklon Grindeks, potrebno je istražiti uzrok Vaših problema sa spavanjem i liječiti ostale podležće bolesti.

Obavijestite svog liječnika ako imate ili ste imali bilo koju bolest ili bilo koje drugo zdravstveno stanje, osobito ako imate nešto od sljedećeg:

- problemi s jetrom ili bubrezima;
- problemi s disanjem;
- narušeno opće stanje;
- starija ste osoba (kod starijih ljudi lijekovi dulje ostaju u tijelu);
- depresija ili tjeskoba povezana s depresijom;
- povijest zlouporabe alkohola, droga ili lijekova;
- nedavno ste uzimali Zopiklon Grindeks ili druge slične lijekove dulje od 4 tjedna.

Vaš će liječnik odlučiti trebate li uzimati Zopiklon Grindeks ili ne, ili prilagoditi dozu. Tijekom liječenja bit ćete pažljivo praćeni.

Ovisnost i simptomi ustezanja

Primjena lijekova poput lijeka Zopiklon Grindeks može dovesti do razvoja fizičke ili psihičke ovisnosti ili zlouporabe ovih lijekova. Rizik od ovisnosti raste s dozom i trajanjem liječenja. Rizik je također veći u bolesnika koji u povijesti bolesti imaju zlouporabu alkohola, droga ili lijekova i/ili izražene poremećaje osobnosti.

Ako dođe do razvoja psihičke ovisnosti, nagli prekid liječenja može uzrokovati simptome ustezanja kao što su: nesanica, glavobolja, bolovi u mišićima, ekstremna tjeskoba, napetost, nemir, smetenost i razdražljivost. U težim slučajevima mogu se pojaviti sljedeći simptomi: promjena u percepciji svijeta tako da se čini čudnim ili nestvarnim, gubitak vlastitog osobnog identiteta praćen osjećajem nestvarnosti i neobičnosti, povećana osjetljivost na zvukove, utrnulost i trnci u udovima, preosjetljivost na svjetlost, buku i fizički kontakt, da vidite, čujete ili osjećate stvari koje nisu stvarne (halucinacije) i epileptični napadaji.

Nesanica koja se ponovno javlja nakon prekida liječenja (povratna nesanica)

Ako se liječenje naglo prekine nakon dulje primjene, to ponekad dovodi do nesanice na nekoliko noći. Ovo je privremeni sindrom koji se naziva povratna nesanica (engl. *rebound insomnia*). Kako bi se izbjegli problemi s prekidom nakon dugotrajnog liječenja, preporuča se postupno smanjivanje doze. Pogledati također dio o nuspojavama.

Tolerancija

Učinak lijeka Zopiklon Grindeks može biti smanjen ako se lijek koristi neprekidno nekoliko tjedana. To se zove tolerancija. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate osjećaj da se učinak lijeka Zopiklon Grindeks smanjuje.

Kratkotrajni gubitak pamćenja, takozvana anterogradna amnezija

Zopiklon Grindeks može uzrokovati kratkotrajni gubitak pamćenja, osobito nekoliko sati nakon uzimanja tablete. Kako bi se umanjio rizik od ovoga, uzmite Zopiklon Grindeks neposredno prije ili nakon odlaska u krevet i osigurajte neometan san najmanje 7-8 sati.

Psihijatrijske i "paradoksalne reakcije"

Pri primjeni lijeka Zopiklon Grindeks mogu se pojaviti određene psihičke reakcije, kao što su nemir i tjeskoba, noćne more, razdražljivost, agresivnost, neprimjereno ponašanje, halucinacije (stanje u kojem vidite i čujete stvari koje nisu stvarne), smetenost i poteškoće s koncentracijom.

Mjesečarenje, takozvani somnambulizam i druga povezana ponašanja

Mjesečarenja ili druga povezana ponašanja kao što su vožnja u snu, kuhanje i jedenje ili telefoniranje u snu, s gubitkom sjećanja događaja su prijavljena u bolesnika koji su uzeli zopiklon a da nisu bili potpuno budni.

Rizik od takvog ponašanja se povećava ako se Zopiklon Grindeks primjenjuje istodobno s alkoholom ili određenim drugim specifičnim lijekovima (npr. lijekovima protiv bolova iz skupine opioida,

antipsihoticima, hipnoticima ili lijekovima protiv tjeskobe/sedativima). Rizik se također povećava ako se Zopiklon Grindeks uzima u dozama višim od najviše preporučene doze. Odmah se obratite liječniku ako osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma.

Depresija/suicidalne misli

Ovaj lijek nije namijenjen za liječenje depresije. Ako imate i depresiju, liječnik će vam propisati odgovarajuće liječenje. Ako se depresija ne liječi, može se pogoršati, postati trajna ili povećati mogući rizik od samoubojstva.

Neka ispitivanja su pokazala povećani rizik od suicidalnih misli, pokušaja samoubojstva i samoubojstva u bolesnika koji uzimaju određene sedative i hipnotike, uključujući ovaj lijek. Međutim, nije utvrđeno je li to uzrokovano lijekom ili možda postoje drugi razlozi za to. Ako imate suicidalne misli, obratite se svom liječniku što je prije moguće za daljnje medicinske savjete.

Rizik od pada

Zbog opuštajućeg učinka zopiklona na mišiće, postoji rizik od pada, osobito u starijih osoba kada ustanu tijekom noći.

Djeca i adolescenti

Zopiklon Grindeks se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Sigurnost i djelotvornost lijeka u djece i adolescenata mlađih od 18 godina nije ustanovljena.

Drugi lijekovi i Zopiklon Grindeks

Učinak liječenja može biti promijenjen ako se lijek Zopiklon Grindeks uzima u isto vrijeme s nekim drugim lijekovima, što znači da će možda trebati prilagoditi dozu lijeka Zopiklon Grindeks.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, a pogotovo neke od sljedećih lijekova:

- Lijekove za određene psihičke poremećaje (antipsihotici/neuroleptici)
- Tablete za spavanje (hipnotici)
- Lijekove koji se koriste za liječenje tjeskobe (anksiolitici)
- Lijekove za smirenje (sedativi)
- Lijekove za liječenje depresije (antidepresivi)
- Jake lijekove protiv bolova iz skupine opioida, npr. morfin i tvari slične morfinu
- Lijekove koji se koriste za vrijeme operacija (anestetici)
- Lijekove koji se koriste za liječenje alergija (antihistaminici)
- Neke lijekove koji se koriste za liječenje bakterijskih i gljivičnih infekcija kao što su eritromicin ili itrakonazol
- Lijekove koji se koriste za liječenje HIV infekcija
- Lijekove koji se koriste za liječenje epilepsije kao što su fenitoin, fenobarbital i karbamazepin
- Lijekove koji se koriste za liječenje tuberkuloze (npr. rifampicin)
- Pripravke koji sadrže gospinu travu (tradicionalni biljni lijek).

Istodobna primjena lijeka Zopiklon Grindeks i opioida (jaki lijekovi protiv bolova, lijekovi za zamjensku terapiju i određeni lijekovi protiv kašlja) povećava rizik od omamljenosti, otežanog disanja (respiratorna depresija), kome i može biti opasna po život. Stoga se istodobna primjena može razmotriti samo kada druge mogućnosti liječenja nisu moguće.

Međutim, ako Vam je liječnik propisao lijek Zopiklon Grindeks s opioidima, liječnik treba ograničiti doze i trajanje istodobnog liječenja.

Obavijestite svog liječnika o svim opioidnim lijekovima koje uzimate i pažljivo slijedite preporuke liječnika o doziranju. Bilo bi korisno reći svojim prijateljima ili rodbini o gore opisanim znakovima i simptomima. Obratite se svom liječniku kada se pojave takvi simptomi.

Zopiklon Grindeks s pićem i alkoholom

Tijekom uzimanja lijeka Zopiklon Grindeks potrebno je izbjegavati konzumaciju alkohola jer alkohol može pojačati učinak lijeka Zopiklon Grindeks. Ovaj učinak može potrajati do sljedećeg jutra, a to može štetno utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Tijekom uzimanja lijeka Zopiklon Grindeks treba izbjegavati grejp i sok od grejpa. Grejp može pojačati učinak lijeka Zopiklon Grindeks.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Ne preporučuje se primjena lijeka Zopiklon Grindeks tijekom trudnoće jer prolazi kroz placentu. Ako se primjenjuje tijekom trudnoće, postoji rizik od utjecaja na dijete. Neka ispitivanja su pokazala mogući povećani rizik od rascjepa usne i nepca u novorođenčadi. Može doći do smanjene pokretljivosti fetusa i promjene srčanog ritma fetusa nakon uzimanja lijeka Zopiklon Grindeks tijekom drugog i/ili trećeg tromjesečja trudnoće.

Ako ste uzimali lijek Zopiklon Grindeks pri kraju trudnoće ili tijekom porođaja, Vaše dijete može pokazati znakove mišićne slabosti, smanjenje tjelesne temperature, imati poteškoće s hranjenjem i probleme s disanjem (respiratorna depresija).

Ako redovito uzimate lijek Zopiklon Grindeks tijekom kasnih faza trudnoće, Vaše dijete može razviti fizičku ovisnost i može biti izloženo riziku od razvoja simptoma ustezanja poput uznemirenosti ili drhtanja. U tom slučaju novorođenče treba pažljivo nadzirati nakon porođaja.

Dojenje

Zopiklon se izlučuje u majčino mlijeko. Nemojte primjenjivati lijek Zopiklon Grindeks tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nemojte upravljati vozilima ili strojevima dok Vaše liječenje lijekom Zopiklon Grindeks ne završi ili dok nije utvrđeno da Vaša sposobnost nije narušena. Učinak također može potrajati do sljedećeg dana. Nuspojave lijeka Zopiklon Grindeks koje mogu utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima su:

- Umor i omamljenost sljedeći dan (rezidualna somnolencija)
- Omaglica
- Gubitak pamćenja (anterogradna amnezija)
- Smanjena sposobnost koncentracije.

Rizik od razvoja gore navedenih nuspojava je povećan ako ste konzumirali alkohol ili ako se niste dovoljno naspavali.

Zopiklon Grindeks sadrži boju Cochineal red A

Filmom obložena tableta od 5 mg sadrži boju Cochineal red A (E124) koja može izazvati alergijske reakcije.

Zopiklon Grindeks sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Zopiklon Grindeks

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena početna doza za odrasle je jedna tableta od 5 mg ili 7,5 mg, uzeta prije spavanja.

U nekih bolesnika, npr. u starijih i bolesnika s bolestima jetre, bubrega ili s problemima s disanjem, liječenje će započeti s manjom početnom dozom od 3,75 mg. Vaš liječnik može kasnije povećati dozu na 5 mg i po potrebi do 7,5 mg.
Maksimalna dnevna doza je 7,5 mg.

Kako uzimati Zopiklon Grindeks

Uzmite Zopiklon Grindeks neposredno prije odlaska na spavanje. Nemojte uzimati tablete u ležećem položaju jer bi apsorpcija u tijelu mogla biti odgođena. Osigurajte 7-8 sati neometanog spavanja. Progutajte tabletu s tekućinom (npr. 1/2 čaše vode).

Trajanje liječenja

Vaše liječenje lijekom Zopiklon Grindeks treba biti što je moguće kraće (nekoliko dana do 2 tjedna). Kako bi se smanjio rizik od simptoma ustezanja ili ponavljanih problema sa spavanjem nakon prekida liječenja, liječnik će vam objasniti kako postupno smanjivati dozu na kraju liječenja, takozvano postupno smanjivanje doze. Ne smijete uzimati Zopiklon Grindeks dulje od 4 tjedna, uključujući fazu postupnog smanjivanja doze. Pitajte svog liječnika za savjet ako se Vaši simptomi ne poprave u tom razdoblju.

Ako uzmete više Zopiklon Grindeks nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta ili ako je npr. dijete greškom progutalo lijek, odmah se obratite svom liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice za savjet.

Predoziranje zopiklonom zajedno s određenim tvarima ili lijekovima koji imaju supresivni učinak na središnji živčani sustav može biti opasno po život. Ovo također uključuje alkohol.

Uzimanje previše zopiklona može izazvati simptome kao što su:

- osjećaj omamljenosti, smetenosti, spavanje dubokim snom i mogući pad u komu
- mlohavost mišića
- osjećaj omaglice, ošamućenosti ili nesvjestica. Ovi učinci su posljedica niskog krvnog tlaka
- padanje ili gubitak ravnoteže
- plitko disanje ili otežano disanje (respiratorna depresija).

Ako ste zaboravili uzeti Zopiklon Grindeks

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako još uvijek imate vremena za spavati 7 do 8 sati, trebali biste odmah uzeti dozu. Ako nemate priliku za potpuni cjelonoćni san, preskočite propuštenu dozu i nemojte uzeti novu dozu dok ne odete na spavanje sljedeću noć.

Ako prestanete uzimati Zopiklon Grindeks

Ako iznenada prestanete uzimati Zopiklon Grindeks, Vaši problemi sa spavanjem mogu se privremeno vratiti. Također možete imati simptome ustezanja. Simptomi ustezanja uključuju poteškoće sa spavanjem, glavobolju, znojenje, halucinacije i ubrzan rad srca. U težim i vrlo rijetkim slučajevima mogu se pojaviti napadaji.

Rizik od simptoma ustezanja povećava se s dozom i trajanjem liječenja, stoga Vas liječnik može uputiti kako postupno smanjivati dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite primjenjivati Zopiklon Grindeks i **odmah** se obratite liječniku ili otiđite u najbližu hitnu službu ako osjetite bilo koji od sljedećih simptoma (vrlo rijetko, mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- Oticanje lica, jezika ili grla; poteškoće s gutanjem; koprivnjača i poteškoće s disanjem (angioedem).
- Simptomi teške alergijske reakcije: osip koji svrbi, oticanje usta koje može uzrokovati poteškoće s disanjem i gutanjem, piskanje (anafilaktička reakcija).

Ostale nuspojave

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- omamljenost
- gorak ili metalni okus u ustima
- suha usta.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- živčano uzbuđenje (uznemirenost), noćne more
- mučnina, opća nelagoda, bol u trbuhu
- smanjena pozornost, glavobolja, vrtoglavica
- otežano ustajanje ujutro, umor (astenija).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- osjećaj smetenosti, razdražljivost, agresivnost, halucinacije, depresija (postojeća depresija može se manifestirati tijekom liječenja zopiklonom), kratkotrajni gubitak pamćenja
- promjena seksualne želje (poremećaji libida)
- teškoće u disanju
- alergijske reakcije na koži (uključujući osip, svrbež, koprivnjaču)
- pad (uglavnom u starijih bolesnika).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- povećanje određenih jetrenih enzima što se uočava u nalazima krvi.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- nemir, lažna uvjerenja, ljutnja, abnormalno ponašanje (moguća povezanost s gubitkom pamćenja), mjesečarenje ili drugo neuobičajeno ponašanje tijekom spavanja (poput vožnje, jedenja, telefoniranja ili spolnih odnosa itd.), a da niste potpuno budni
- fizička i psihička ovisnost, sindrom ustezanja ili povratna nesanica nakon prekida uzimanja zopiklona
- gubite kontakt sa stvarnošću (psihoza); to može uključivati stanje u kojem vidite ili čujete stvari koje ne možete vidjeti ili čuti i vjerovanje u stvari koje zapravo nisu istinite
- poremećaj pamćenja, nemogućnost koncentracije, poremećaj govora
- poteškoće u koordinaciji određenih pokreta, utrnulost ili trnci u nekim dijelovima tijela
- dvoslike
- plitko disanje ili otežano disanje
- probavne smetnje, povraćanje
- mišićna slabost.

Ako se liječenje naglo prekine nakon dugotrajnog liječenja, mogu se pojaviti takozvani simptomi ustezanja. Simptomi ustezanja variraju i uključuju poteškoće sa spavanjem, nevoljno drhtanje, znojenje, smetenost (delirij), glavobolju, osjećaj lupanja srca i ubrzan rad srca, noćne more i halucinacije. Također možete osjećati tjeskobu, razdraženost i uznemirenost. U vrlo rijetkim slučajevima javili su se i napadaji.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V.**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Zopiklon Grindeks

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Zopiklon Grindeks sadrži

Djelatna tvar je zopiklon. Jedna tableta sadrži 3,75 mg odnosno 5 mg ili 7,5 mg zopiklona.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: kukuruzni škrob, hipromeloza (tip 2910) (E464), kalcijev hidrogenfosfat (E341), natrijev škroboglikolat (vrsta A), celuloza, mikrokristalična (E460), magnezijev stearat (E572).

Filmska ovojnica

5 mg tablete:

Makrogol poli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209); talk (E553b); titanijev dioksid (E171); glicerolkaprilokaprat (E471); poli(vinilni) alkohol (E1203); boja Indigo carmine (E132); boja Cochineal red A (E124); boja Quinoline Yellow (E104).

3.75 mg i 7.5 mg tablete:

Makrogol poli(vinilni alkohol), kopolimer, graftirani (E1209); talk (E553b); titanijev dioksid (E171); glicerolkaprilokaprat (E471); poli(vinilni) alkohol (E1203).

Kako Zopiklon Grindeks izgleda i sadržaj pakiranja

Zopiklon Grindeks 3,75 mg su bijele okrugle bikonveksne filmom obložene tablete s ravnom površinom; veličina tablete je približno 5 mm u promjeru.

Zopiklon Grindeks 5 mg su plave okrugle bikonveksne filmom obložene tablete s ravnom površinom; veličina tablete je približno 6 mm u promjeru.

Zopiklon Grindeks 7,5 mg su bijele okrugle filmom obložene tablete, konveksne s jedne strane i udubinom s razdjelnim urezom s druge strane s ravnom površinom; veličina tablete je približno 7 mm u promjeru. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Zopiklon Grindeks dostupan je u PVC/PVDC//Alu blisterima koji sadrže 10, 20, 30 ili 100 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Latvija

Telefon: +371 67083205

E-mail: grindeks@grindeks.com

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Švedska	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg filmdragerade tabletter
Austrija	Zopiclon Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg Filmdabletten
Belgija	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg comprimés pelliculés
Bugarska	Зопиклон Гриндекс 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg филмирани таблетки
	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg film-coated tablets
Hrvatska	Zopiklon Grindeks 3,75 mg filmom obložene tablete
	Zopiklon Grindeks 5 mg filmom obložene tablete
	Zopiklon Grindeks 7,5 mg filmom obložene tablete
Republika Češka	Zopiclone Grindeks
Danska	Somnols 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg filmovertrukne tabletter
Estonija	Zopiclone Grindeks
	Zopiclone Baltijos Bite
Finska	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg <u>tabletti, kalvopäällysteinen</u>
Francuska	ZOPICLONE GRINDEKS 3,75 mg, comprimé pelliculé
	ZOPICLONE GRINDEKS 5 mg, comprimé pelliculé
	ZOPICLONE GRINDEKS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable
Njemačka	Zopiclon Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg Filmdabletten
Grčka	Zopiclone/Grindeks 3,75 mg, 5 mg <u>επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία</u>
	Zopiclone/Baltijos Bite 7,5 mg <u>επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία</u>
Mađarska	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg filmtablett
Irska	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg film-coated tablets
Italija	Zopiclone Grindeks
Latvija	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg apvalkotās tabletes
	Zopiclone Baltijos Bite 7,5 mg apvalkotās tabletes
Litva	Zopiclone Grindeks 3,75 mg plėvele dengtos tabletės
	Zopiclone Grindeks 5 mg plėvele dengtos tabletės
	Zopiclone Baltijos Bite 7,5 mg plėvele dengtos tabletės
Luksemburg	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg filmbeschichtete Pellen
Nizozemska	Zopiclon Grindeks 3,75 mg filmomhulde tabletten
	Zopiclon Grindeks 5 mg filmomhulde tabletten
	Zopiclon Grindeks 7,5 mg filmomhulde tabletten
Norveška	Sonlax
Poljska	Zopiclone Grindeks
	Zopiclone Baltijos Bite
Portugal	Zopiclona Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg comprimidos revestidos por película
Rumunjska	Zopiclonă Grindeks 3,75 mg, 5 mg comprimate filmate
	Zopiclonă Baltijos Bite 7,5 mg comprimate filmate
Slovačka	Zopiclone Grindeks 3,75 mg, 5 mg filmom obalené tablety
	Zopiclone Baltijos Bite 7,5 mg filmom obalené tablety
Slovenija	Zopiklon Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg filmsko obložene tablete
Španjolska	Zopiclona Grindeks 3,75 mg, 5 mg, 7,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u rujnu 2024.