**Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika**

neo-angin kadulja pastile bez šećera

*2,4-diklorbenzilni alkohol*
*amilmetakrezol*
*levomentol*

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

**Što se nalazi u ovoj uputi**:

1. Što su neo-angin kadulja pastile bez šećera i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?
3. Kako uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati neo-angin kadulja pastile bez šećera?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije


## 1. Što su neo-angin kadulja pastile bez šećera i za što se koriste?

neo-angin kadulja pastile bez šećera su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se djelovanje temelj na kombinaciji 2,4-diklorbenzilnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola.

Lijek je namijenjen za kratkotrajno potporno liječenje upale sluznice ždrijela praćene tipičnim simptomima poput grlobolje, crvenila ili otokline.

neo-angin pastile bez šećera su namijene za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3-4 dana.

## 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

**Nemojte uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera**
- ako ste alergični na djelatne ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s osjetljivošću dišnih puteva kod kojih može doći do bronhokonstrikcije zbog ulja paprene metvice i mentola.
- lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.



HALMED
14 - 11 - 2025
ODOBRENO

**Upozorenja i mjere opreza**
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin kadulja pastile bez šećera u slučaju prethodnog dugotrajnog kašljanja, iskašljavanja ili promuklosti. Kod ustrajnih simptoma, porasta temperature ili pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s liječnikom jer će stanje možda biti potrebno liječiti s drugim lijekovima.

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju, ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon uzimanja ulja paprene metvice te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

**Djeca**
neo-angin kadulja pastile bez šećera se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

**Drugi lijekovi i neo-angin kadulja pastile bez šećera**
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

**neo-angin kadulja pastile bez šećera s hranom i pićem**
neo-angin pastile bez šećera nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

**Trudnoća, dojenje i plodnost**
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dostupnih kliničkih podataka o primjeni neo-angin kadulja pastila bez šećera u trudnoći nema ili su vrlo ograničeni. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin kadulja pastile bez šećera izravno ili neizravno štetno djeluju na trudnoću, razvoj ploda, porod ili razvoj djeteta.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za plod, stoga se ne preporučuje primjena ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

**Upravljanje vozilima i strojevima**
Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

**neo-angin kadulja pastile bez šećera sadrži pomoćne tvari**
Lijek sadrži boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Jedna neo-angin kadulja pastila bez šećera sadrži 2,58 g izomalta koji je zamjena za šećer što odgovara otprilike 6 kcal (26 kJ). Izomalt može imati blagi laksativni učinak. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

## 3. Kako uzimati neo-angin kadulja pastile bez šećera?
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

**Preporučena doza je:**
**Odrasli i djeca starija od 6 godina** trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svaka 2-3 sata. Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.



HALMED
14 - 11 - 2025
ODOBRENO

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3-4 dana, javite se liječniku.

**Primjena u djece**
Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

**Ako uzmete više neo-angin kadulja pastila bez šećera nego što ste trebali**
Nema prijavljenih slučajeva predoziranja.
U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave opisane u dijelu 4. mogu se javiti u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku koji će provesti simptomatsko liječenje.

**Ako ste zaboravili uzeti neo-angin kadulja pastile bez šećera**
Ako ste zaboravili uzeti neo-angin kadulja pastile bez šećera ili ste uzeli manje nego što je potrebno, nastavite ih uzimati u skladu s uputama.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom neo-angin kadulja pastila bez šećera obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## 4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave nuspojave, iako se one neće javiti kod svakog.

**Moguće nuspojave i njihova učestalost:**
Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): nadraženost sluznice usta i želuca.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): mogu se javiti alergijske reakcije poput oticanja usta i jezika.

*Dodatne nuspojave u djece*
Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana (laringospazam) u dojenčadi i djece do 2 godine starosti.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## 5. Kako čuvati neo-angin kadulja pastile bez šećera?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.



HALMED
14 - 11 - 2025
ODOBRENO

## 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

**Što neo-angin kadulja pastile bez šećera sadrže?**

*Djelatne tvari:*
Jedna pastila sadrži: 1,20 mg 2,4 diklorbenzilnog alkohola; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,90 mg levomentola.

*Pomoćne tvari:* eterično ulje paprene metvice, izomalt, tartaratna kiselina, eterično ulje kadulje, boja Ponceau 4R (E124), boja Quinoline Yellow (E104), boja Patent Blue V (E131).

**Kako neo-angin kadulja pastile bez šećera izgledaju i sadržaj pakiranja?**
neo-angin kadulja pastile bez šećera su boje meda, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.

24 (2x12) pastile u PVC/PVDC//Al blisteru.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet**
DIVAPHARMA GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Njemačka

**Proizvođač**
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Njemačka

**Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**
Clinres farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61, 10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01/2396 900

**Način i mjesto izdavanja lijeka**
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u kolovozu 2025.**



HALMED
14 - 11 - 2025
ODOBRENO