

## Sažetak opisa svojstava lijeka

### 1. NAZIV LIJEKA

Canesten 1 combi 500 mg tableta za rodnici i 10 mg/g krema

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta za rodnici sadrži 500 mg klotrimazola; 1 g krema sadrži 10 mg klotrimazola.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom: cetilni i stearilni alkohol i benzilni alkohol.

1 g krema sadrži 100 mg cetilnog i stearilnog alkohola i 20 mg benzilnog alkohola.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta za rodnici i krema za vanjsku primjenu (kombinirano pakiranje).

Tableta je bijela, duguljasta, dimenzija 24,5 x 10 mm.

Krema je bijela i nema mirisa.

### 4. KLINIČKI PODACI

#### 4.1. Terapijske indikacije

Canesten 1 combi 500 mg tableta za rodnici i 10mg/ml krema namijenjena je za liječenje infekcija rodnice (vaginitis) uzrokovanih gljivicama sličnih kvascima (najčešće *Candida*).

Krema za vanjsku primjenu namijenjena je u žena za liječenje infekcije stidnih usana i područja oko njih te u muškaraca za upalu glavića i kožice muškog uda koju su uzrokovale kvasnice (kandidni vulvitis i kandidni balanitis).

#### 4.2. Doziranje i način primjene

##### Liječenje infekcija rodnice:

##### *1-dnevno liječenje*

Jednu tabletu za rodnici treba umetnuti što dublje u rodnici uvečer. Najbolje je da bolesnica pritom leži na leđima i malo savije noge.

Canesten tabletama za rodnici potrebna je vлага u rodnici da se mogu posve otopiti. Ako je rodnica suha, tableta za rodnici neće se posve otopiti. Iz rodnice će se izlučiti komadići tablete, koji se mogu vidjeti na donjem rublju. Da bi se to izbjeglo, preporučujemo da se lijek umetne što dublje u rodnici. Ako se tableta za rodnici u jednoj noći potpuno ne otopi, preporučujemo primjenu kreme za rodnici.

##### Liječenje kandidnog vulvitisa/ kandidnog balanitisa:

Krema za vanjsku primjenu: dva do tri puta na dan tanak sloj krema nanijeti na oboljele dijelove kože (vanjsko spolovilo do čmara kod žena, glavić i kožica kod muškaraca) i utrljati. Liječenje obično traje od 1 do 2 tjedna.

##### *Opće upute*

Ukoliko simptomi perzistiraju dulje od 7 dana bolesnica možda ima stanje koje zahtjeva liječenje prema preporuci liječnika te se bolesnica treba obratiti liječniku.

H A L M E D  
07 - 01 - 2022  
O D O B R E N O

Ako je potrebno, liječenje se može ponoviti. Ipak, rekurentne infekcije mogu upućivati na to da u podlozi postoji za to medicinski razlog. Bolesnica se treba obratiti liječniku ukoliko se simptomi ponovno javе unutar 2 mjeseca.

Ako su istodobno inficirane stidne usne i područje oko njih, potrebno je i lokalno liječenje kremom za vanjsku primjenu uz intravaginalno liječenje (kombinirano liječenje).

Primjena aplikatora kod trudnica se ne preporučuje. Tijekom trudnoće tableta za rodnici mora se primijeniti prstom, bez aplikatora, kako bi se sprječile ozljede vrata maternice (vidjeti dio 4.6).

Izbjegavati kontakt s očima. Ne gutati.

Lijek je namijenjen odraslim bolesnicama i djevojkama u dobi od 12. godine života nadalje.

Kako bi se, osim vulvovaginalne infekcije, isključili drugi uzroci simptoma, potrebna je procjena liječnika prije primjene lijeka Canesten u djece od 12 do 15 godine i u žena u postmenopauzi. Početnu infekciju mora uvijek dijagnosticirati liječnik.

#### **4.3. Kontraindikacije**

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

#### **4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi**

Bolesnica se treba se obratiti svom liječniku u slučaju:

- vrućice (temperatura od 38 °C ili više)
- infekcije rodnice tijekom prvog tromjesečja trudnoće (vidjeti dio 4.6)
- dobi između 12. i 15. godina ili prve infekcije rodnice
- dobi iznad 60 godina
- ponovne infekcije unutar 2 mjeseca
- boli u donjem dijelu abdomena, boli u leđima
- neugodnog mirisa iscjetka iz rodnice
- mučnine
- krvarenja iz rodnice i / ili boli u ramenima.

Tijekom menstruacije liječenje ovim lijekom ne smije se provoditi, već mora završiti prije početka menstruacije.

Tijekom primjene ovog lijeka bolesnica ne smije koristiti tampone, sredstva za ispiranje rodnice, spermicide ili druge vaginalne proizvode.

Preporučuje se izbjegavanje vaginalnog odnosa u slučaju vaginalne infekcije i dok se koristi ovaj lijek jer bi se partner mogao zaraziti. Potrebno je i lokalno liječenje spolnog partnera ako su kod njega prisutni simptomi (npr. svrbež i upala).

Tablete za rodnici i krema koje sadrže klotrimazol mogu smanjiti djelotvornost i sigurnost proizvoda od lateksa kao što su kondomi i dijafragme kada se primjenjuju na genitalnom području (žene: intravaginalno, stidne usne i područje oko njih u stidnici; muškarci: kožica i glavić penisa). Taj je učinak privremen i nestaje poslije liječenja.

Cetilni i stearilni alkohol koji se nalaze u Canesten 10mg/g kremi mogu izazvati lokalnu kožnu reakciju (npr. kontaktni dermatitis).

Canesten 10 mg/g krema sadrži benzilni alkohol koji može uzrokovati alergijske reakcije. Benzilni alkohol može uzrokovati blagi lokalni nadražaj.

H A L M E D  
07 - 01 - 2022  
O D O B R E N O

#### **4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija**

Istodobno liječenje klotrimazolom primjenjenim intravaginalno i takrolimusom (FK-506; imunosupresor) može dovesti do povećane razine takrolimusa u plazmi te slično i liječenje sirolimusom. Bolesnike stoga treba pažljivo motriti za simptome predoziranja takrolimusu ili sirolimusu, ukoliko je potrebno određivanjem razine takrolimusa u plazmi.

#### **4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje**

##### Trudnoća

Dok je u trudnica dostupna ograničena količina kliničkih podataka, ispitivanja na životinjama ne daju naznake direktnih ili indirektnih štetnih utjecaja na reproduksijsku toksičnost (vidjeti dio 5.3). Klotrimazol se može koristiti tijekom trudnoće. Ipak, tijekom prvog tromjesečja trudnoće savjetuje se početi s liječenjem samo po preporuci liječnika.

Tijekom trudnoće za liječenje mogu se koristiti samo tablete za rodnici, bez kreme, budući da se one mogu primijeniti prstom, bez aplikatora (vidjeti dio 4.2).

##### Dojenje

Nema podataka o izlučivanju klotrimazola u majčino mlijeko. Međutim, sistemska apsorpcija nakon primjene je minimalna i malo je vjerojatno da će dovesti do sistemskih učinaka. Klotrimazol se može koristiti tijekom dojenja.

##### Plodnost

Nisu provedena ispitivanja u ljudi o utjecaju klotrimazola na plodnost. Ispitivanja na životinjama nisu pokazala nikakav učinak lijeka na plodnost (vidjeti dio 5.3).

#### **4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima**

Canesten ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

#### **4.8. Nuspojave**

Slijedeće nuspojave su zabilježene tijekom primjene nakon odobrenja za stavljanje klotrimazola u promet. Kako su ove reakcije prijavljene spontano, iz populacije nepoznate veličine, nije uvijek moguće pouzdano procijeniti njihovu učestalost, stoga je njihova učestalost nepoznata.

**Poremećaji imunološkog sustava:** anafilaktička reakcija, angioedem, preosjetljivost

**Krvožilni poremećaji:** sinkopa, hipotenzija

**Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja:** dispneja

**Poremećaji probavnog sustava:** bol u abdomenu, mučnina.

**Poremećaji kože i potkožnog tkiva:** osip, urtikarija

**Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki:** ljuštenje rodnice, iscijedak iz rodnice, krvarenje iz rodnice, vulvovaginalna nelagoda, vulvovaginalni eritem, vulvovaginalni osjećaj pečenja, vulvovaginalni svrbež, vulvovaginalna bol.

**Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:** iritacija na mjestu primjene, edem, bol

#### **Prijavljanje sumnji na nuspojavu**

H A L M E D  
07 - 01 - 2022  
O D O B R E N O

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

#### **4.9. Predoziranje**

Nema rizika od akutne intoksikacije jer nije vjerojatno da će se dogoditi nakon jedne lokalne primjene prevelike doze (primjena na velikoj površini pri uvjetima povoljnim za apsorpciju) ili slučajne oralne primjene. Ne postoji specifičan antidot.

### **5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA**

#### **5.1. Farmakodinamička svojstva**

Farmakoterapijska skupina: Ginekološki antiinfektivi i antiseptici; Derivati imidazola, ATK oznaka: G01AF02

##### Mehanizam djelovanja

Klotrimazol djeluje na gljivice tako što koči sintezu ergosterola. Posljedica su toga strukturalna i funkcionalna oštećenja gljivične citoplazmatske membrane.

Klotrimazol ima širok antimikozni spektar djelovanja *in vitro* i *in vivo*: djeluje na dermatofite, kvasnice, pljesni itd.

U odgovarajućim pokušnim uvjetima MIK za te vrste gljivica bile su u području manjem od 0,062–8 µg/ml supstrata. Klotrimazol djeluje prije svega fungistatički ili fungicidno, što ovisi o koncentraciji klotrimazola na mjestu djelovanja. Djelovanje *in vitro* ograničeno je na razmnožavanje gljivice; gljivične spore vrlo su malo osjetljive.

Klotrimazol djeluje i na gram-pozitivne mikroorganizme (streptokoki/stafilokoki / *Gardnerella vaginalis*) i gram-negativne mikroorganizme (*Bacteroides*).

*In vitro* klotrimazol sprječava razmnožavanje *Corynebacteriuma* i gram-pozitivnih koka, osim enterokoka (u koncentracijama od 0,5 do 10 µg/ml supstrata).

Primarna rezistencija osjetljivih vrsta gljivica vrlo je rijetka; razvoj sekundarne rezistencije kod osjetljivih je gljivica do sada primjećen samo u vrlo rijetkim slučajevima u terapijskim uvjetima.

#### **5.2. Farmakokinetička svojstva**

Farmakokinetskim ispitivanjima nakon primjene na koži i u rodnici utvrđeno je da se apsorbira vrlo mala količina klotrimazola (3–10 %). Apsorbirani klotrimazol u jetri se brzo metabolizira u farmakološki neaktivni metabolit. Najviša je koncentracija klotrimazola u plazmi nakon vaginalne primjene doze od 500 mg bila niža od 10 ng/ml što ukazuje na činjenicu da klotrimazol primjenjen intravaginalno ne uzrokuje izmjerljive sistemske učinke ili neželjene učinke.

#### **5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene**

Neklinički podaci na osnovi uobičajenih ispitivanja farmakološke sigurnosti, toksičnosti kod ponavljanih doza, genotoksičnosti, kancerogenog potencijala i utjecaja na sposobnost razmnožavanja ne pokazuju poseban rizik za čovjeka.

U štakora su se, 4 sata nakon primjene, klotrimazol i/ili njegovi metaboliti izlučili u mlijeko u količinama većim nego u plazmi za faktor 10 do 20, nakon čega je do 24 sata slijedio pad za faktor 0,4.

## **6. FARMACEUTSKI PODACI**

### **6.1. Popis pomoćnih tvari**

*tableta za rođnicu:* kalcijev laktat pentahidrat;  
kukuruzni škrob;  
krospovidon;  
silicijev dioksid, koloidni, bezvodni;  
laktatna kiselina;  
laktoza hidrat;  
magnezijev stearat;  
hipromeloza;  
celuloza, mikrokristalična

*krema:*

benzilni alkohol;  
cetilpalmitat;  
cetyl i stearilni alkohol;  
oktildodekanol;  
polisorbat 60;  
sorbitanstearat;  
procjišćena voda

### **6.2. Inkompatibilnosti**

Nije primjenjivo.

### **6.3. Rok valjanosti**

U originalnom pakiranju: 3 godine

Rok valjanosti i način čuvanja kreme u primjeni: 3 mjeseca nakon prvog otvaranja.

### **6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

### **6.5. Vrsta i sadržaj spremnika**

1 tablet za rođnicu u aluminijskom blisteru (PA/Al/PVC blister) i 1 aplikator, te 20 g kreme u aluminijskoj tubi s membranom i PE zatvaračem na navoj, u kutiji



### **6.6. Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom**

*Primjena tablete za rođnicu bez aplikatora (tijekom trudnoće)*


Tabletu za rođnicu treba uvečer gurnuti opranim rukama što dublje u rođnicu. Najbolje je da bolesnica pritom leži na ledima s malo savijenim nogama.

*Primjena tablete za rođnicu pomoći aplikatora*


1. Najprije se izvuče klip aplikatora dok se ne zaustavi. Tableta za rođnicu namjesti se u aplikator tako da zaobljeni dio tablete (približno polovica tablete) viri van. Pritom se zaobljeni dio aplikatora prstima malo stisne.



2. Aplikator se gurne što dublje u rodnicu (najbolje je da bolesnica pritom leži na ledima).



3. Klip aplikatora oprezno se gurne do kraja dok se tableta ne smjesti u rodnici. Zatim se aplikator izvadi.
4. Canesten 3 tablete za rodnicu 200 mg: Nakon uporabe aplikator se dobro opere vrućom vodom (ne kipućom).



## 7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb

## 8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

HR-H-388992163

## 9. DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 17.02.1995.

Datum posljednje obnove odobrenja: 27.12.2016.

## 10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

07.01.2022.

H A L M E D  
07 - 01 - 2022  
O D O B R E N O