

## Sažetak opisa svojstava lijeka

### 1. NAZIV LIJEKA

Femoston conti mini 0,5 mg/2,5 mg filmom obložene tablete

### 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka filmom obložena tableta sadrži 0,5 mg 17 $\beta$ -estradiola (u obliku hemihidrata) i 2,5 mg didrogesterona.

Pomoćna tvar: laktoza 117,4 mg.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

### 3. FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta.

Okrugle, bikonveksne tablete, s oznakom „379“ na jednoj strani (promjera 7 mm).

Žute tablete od 0,5/2,5 mg.

### 4. KLINIČKI PODACI

#### 4.1. Terapijske indikacije

Hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) simptoma nastalih zbog nedostatka estrogena kod žena u postmenopauzi koje može započeti najmanje 12 mjeseci nakon zadnje menstruacije.

Iskustvo u liječenju žena starijih od 65 godina je ograničeno.

#### 4.2. Doziranje i način primjene

Femoston conti mini je kontinuirano kombinirano hormonsko nadomjesno liječenje.

Estrogen i progestagen se daju svaki dan bez prekida.

Dnevna je doza jedna tableta jednom dnevno tijekom 28-dnevnog ciklusa.

Primjena Femostona conti mini treba biti kontinuirana, bez prekida između pakiranja.

Za početak i nastavak liječenja postmenopauzalnih simptoma treba primijeniti najnižu djelotvornu dozu kroz najkraće moguće vrijeme (vidjeti dio 4.4.).

Kontinuirano kombinirano liječenje može se započeti Femostonom conti mini ovisno o vremenu proteklom od menopauze i težini simptoma. Žene u prirodnoj menopauzi trebaju započeti liječenje Femostonom conti mini najmanje 12 mjeseci nakon zadnje menstruacije. Kod žena s kirurški induciranom menopauzom liječenje može početi odmah.

Doza se potom može prilagoditi ovisno o kliničkom odgovoru.

Žene koje prelaze s drugog kontinuiranog sekvencijskog ili cikličkog preparata za liječenje trebaju završiti 28-dnevni ciklus i potom započeti liječenje Femostonom conti mini.

Žene koje prelaze s drugog kontinuiranog kombiniranog liječenja mogu započeti liječenje u bilo kojem trenutku.

Zaboravljenu dozu lijeka treba uzeti što je prije moguće. Ako je prošlo više od 12 sati, preporuča se nastaviti sa sljedećom dozom bez uzimanja zaboravljene tablete. U tom slučaju može biti povećana vjerojatnost probojnog ili točkastog krvarenja.

Femoston conti mini može se uzimati bez obzira na uzimanje hrane.

Za primjenu kroz usta.

*Pedijatrijska populacija:*

Ne postoji relevantna indikacija za primjenu Femostona conti mini u pedijatrijskoj populaciji.

### **4.3. Kontraindikacije**

- Poznata preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1..
- Poznat, rak dojke u prošlosti ili suspektan rak dojke
- Poznati ili suspekti o estrogenima ovisni maligni tumori (npr. rak endometrija)
- Genitalno krvarenje nepoznatog uzroka
- Neliječena hiperplazija endometrija
- Prijašnja ili postojeća venska tromboembolija (duboka venska tromboza, plućna embolija)
- Poznati trombofilijski poremećaji (npr. deficijencija proteina C, proteina S ili deficijencija antitrombina; vidjeti dio 4.4.)
- Aktivna ili nedavna arterijska tromboembolijska bolest (npr. angina, infarkt miokarda)
- Akutna bolest jetre ili bolest jetre u anamnezi, sve dok se vrijednosti jetrene funkcije ne vrate na normalne vrijednosti
- Porfirija
- Meningeom ili meningeom u anamnezi

### **4.4. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi**

Pri liječenju postmenopauzalnih simptoma, HNL treba primijeniti samo za one simptome koji nepovoljno utječu na kvalitetu života. U svim slučajevima najmanje jednom godišnje valja pažljivo procijeniti rizike i koristi liječenja, a primjenu HNL-a nastaviti sve dok je korist liječenja veća od rizika.

Podaci o riziku povezanom s HNL-om u liječenju preuranjene menopauze su ograničeni. Zbog niskog apsolutnog rizika kod mlađih žena, omjer koristi i rizika kod tih žena može biti povoljniji nego kod starijih žena.

#### Liječnički pregled/praćenje

Prije početka ili ponovnog uvođenja HNL-a, treba uzeti potpunu osobnu i obiteljsku anamnezu. Fizikalni pregled (uključujući pregled zdjeličnih organa i pregled dojki) treba biti usmjeren anamnezom, ali i kontraindikacijama i mjerama opreza. Tijekom liječenja preporučuju se redoviti pregledi, a njihovu učestalost i vrstu treba individualno prilagoditi svakoj ženi. Ženama treba savjetovati koje promjene na dojkama trebaju prijaviti svome liječniku ili medicinskoj sestri (vidjeti „Rak dojke“ u nastavku). Pretrage, uključujući odgovarajuće metode prikaza, primjerice mamografiju, treba provoditi u skladu s trenutno prihvaćenim metodama probira prilagođenim individualnim kliničkim potrebama.

### Stanja koja zahtijevaju nadzor

Ukoliko je bilo koje od sljedećih stanja prisutno, pojavilo se u prošlosti, i/ili se pogoršalo tijekom trudnoće ili prethodnog hormonskog liječenja, potrebno je pažljivo nadziranje bolesnice. Treba uzeti u obzir da se takva stanja mogu ponovno javiti ili pogoršati tijekom primjene Femostona conti mini, osobito:

- Leiomiom (uterini fibroid) ili endometrioza
- Čimbenici rizika za tromboembolijske poremećaje (vidjeti u nastavku)
- Čimbenici rizika za tumore ovisne o estrogenu npr. rak dojke kod srodnika prvog reda
- Hipertenzija
- Poremećaji jetre (npr. adenom jetre)
- Diabetes mellitus s ili bez poremećaja na krvnim žilama
- Kolelitijaza
- Migrena ili (teška) glavobolja
- Sistemski lupus eritematosus
- Hiperplazija endometrija u anamnezi (vidjeti u nastavku)
- Epilepsija
- Astma
- Otoskleroza

### Meningeom

- Pojava meningeoma (pojedinačnih i multiplih) prijavljena je u vezi s primjenom lijeka Femoston conti mini 0,5/2,5. Bolesnice treba nadzirati radi moguće pojave znakova i simptoma meningeoma u skladu s kliničkom praksom. Ako je bolesnici dijagnosticiran meningeom, svako liječenje koje uključuje lijek Femoston conti mini 0,5/2,5 treba prekinuti (vidjeti dio 4.3). Nakon prekida liječenja opaženo je smanjenje tumora.

### Razlozi za trenutni prekid liječenja

Liječenje se mora prekinuti u slučaju otkrivanja kontraindikacija, kao i u sljedećim situacijama:

- Žutica ili pogoršanje funkcije jetre
- Značajno povišenje krvnog tlaka
- Novi napadaj glavobolje tipa migrene
- Trudnoća

### Hiperplazija i rak endometrija

- Dugotrajnija primjena samog estrogena povećava rizik razvoja hiperplazije i raka endometrija kod žena s očuvanom maternicom. Zabilježen je 2 do 12 puta povećan rizik od razvoja raka endometrija kod žena koje primjenjuju sam estrogen u odnosu na one koje ga ne primjenjuju, ovisno o trajanju liječenja i dozi estrogena (vidjeti dio 4.8.). Nakon prestanka liječenja, rizik može ostati povećan barem 10 godina.
- Cikličko dodavanje progestagena najmanje 12 dana u mjesecu/28-dnevnom ciklusu ili kontinuirano kombinirano liječenje estrogenom i progestagenom kod nehisterektomiranih žena može smanjiti porast rizika povezan s HNL-om sa samim estrogenom.
- Prvih mjeseci primjene može se javiti probojno krvarenje i točkasto krvarenje. Ako se jave nakon nekog vremena primjene ili nastave nakon što je primjena prekinuta, treba ispitati razlog krvarenja što može uključivati biopsiju endometrija kako bi se isključila njegova maligna promjena.

### Rak dojke

Sveukupni dokazi pokazuju povećani rizik od raka dojke kod žena koje uzimaju kombinirani estrogensko-progestagenski ili samo estrogenski HNL, a taj rizik ovisi o trajanju HNL-a.

Kombinirano estrogensko-progestagensko liječenje:

- Randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje *Women's Health Initiative Study* (WHI, ispitivanje Inicijative za žensko zdravlje) i metaanaliza prospektivnih epidemioloških ispitivanja dosljedno ukazuju na povećani rizik od raka dojke kod žena koje uzimaju kombinirani estrogensko-progestagenski HNL, a koji postaje vidljiv nakon otprilike 3 (1-4) godine (vidjeti dio 4.8.).

Liječenje samo estrogenom:

- WHI ispitivanjem nije ustanovljen povećan rizik od raka dojke kod histerektomiranih žena na HNL-u samo s estrogenom. Opservacijska ispitivanja uglavnom su pokazala mali porast rizika od raka dojke, a koji je niži nego u žena koje koriste kombinirano estrogensko-progestagensko liječenje (vidjeti dio 4.8.).

Rezultati velike metaanalize pokazali su da će se nakon prekida terapije dodatni rizik s vremenom smanjiti, a vrijeme potrebno za povratak na početnu vrijednost ovisi o trajanju prethodne primjene HNL-a. Kada se HNL primjenjivao više od 5 godina, rizik može trajati 10 ili više godina.

HNL, osobito kombinacija estrogena i progestagena, uzrokuje povećanje gustoće mamografskog prikaza što može nepovoljno utjecati na radiološko otkrivanje raka dojke.

#### Rak jajnika

Rak jajnika mnogo je rjeđi od raka dojke. Epidemiološki dokazi na osnovi velike meta-analize ukazuju na blago povećani rizik u žena koje uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) koja sadrži samo estrogen ili kombinaciju estrogena i progestagena, što postaje vidljivo unutar 5 godina uporabe, dok se rizik s vremenom smanjuje nakon prestanka primanja terapije. Neke druge studije, uključujući studiju WHI, ukazuju na to da uporaba kombiniranih hormonskih nadomjesnih terapija (HNT) može biti povezana sa sličnim ili neznatno manjim rizikom (vidjeti dio 4.8.).

#### Venska tromboembolija

- HNL je povezan s 1,3 do 3 puta povećanim rizikom za razvoj venske tromboembolije (VTE), tj. duboke venske tromboze ili plućne embolije. Vjerojatnost da do toga dođe veća je u prvoj godini primjene HNL-a nego kasnije (vidjeti dio 4.8.).
- Žene s poznatim trombofilijским stanjima imaju povećan rizik za razvoj VTE-a, a HNL može dodatno povećati rizik. Stoga je HNL kontraindiciran kod tih žena (vidjeti dio 4.3.).
- Općepoznati čimbenici rizika za VTE uključuju: primjenu estrogena, stariju dob, veće kirurške zahvate, produljenu imobilizaciju, pretilost (indeks tjelesne mase, ITM  $>30 \text{ kg/m}^2$ ), trudnoću/poslijeporođajni period, sistemski lupus eritematosus (SLE) i rak. Nije postignut konsenzus o mogućoj ulozi varikoznih vena u razvoju VTE-a.
- Kao i kod svih bolesnika u poslijeoperativnom razdoblju, posebnu pozornost valja posvetiti provođenju profilaktičkih mjera za sprječavanje VTE-a nakon operacije. Kad se nakon elektivnog operativnog zahvata očekuje produljena imobilizacija, preporučeno je privremeno prekidanje HNL-a četiri do šest tjedana prije zahvata. Sve dok se ne postigne potpuna mobilnost, ne treba ponovno nastaviti liječenje.
- Ženama bez VTE-a u osobnoj anamnezi, ali čiji rođak u prvom koljenu ima anamnezu tromboze u ranoj dobi, može biti predložen probir nakon pomnog savjetovanja u vezi njegovih ograničenja (samo se dio trombofilijских poremećaja utvrdi probirom). HNL je kontraindiciran ukoliko se otkrije trombofilijский poremećaj, uz trombozu kod članova obitelji, ili ako je poremećaj težak (npr.

deficijencija antitrombina, deficijencija proteina C, proteina S ili kombinacija poremećaja).

- Žene koje su na antikoagulantnoj terapiji zahtijevaju pomnu procjenu odnosa koristi i rizika primjene HNL-a.
- Ako venska tromboembolija nastane na početku liječenja, mora se prekinuti uzimanje lijeka. Bolesnicama treba reći da se obrate nadležnom liječniku odmah nakon što postanu svjesne mogućeg simptoma tromboembolije (npr. bolno naticanje noge, iznenadna bol u prsima, dispneja).

#### Bolest koronarnih arterija

Temeljem rezultata randomiziranih kontroliranih ispitivanja nema dokaza o zaštiti od infarkta miokarda kod žena sa ili bez bolesti koronarnih arterija koje su na HNL-u s kombinacijom estrogena i progestagena ili samo estrogenom.

Kombinirano liječenje estrogenom i progestagenom:

Relativni rizik od bolesti koronarnih arterija malo je povećan tijekom liječenja HNL-om s kombinacijom estrogena i progestagena. Obzirom da je osnovni apsolutni rizik pojave bolesti koronarnih arterija jako ovisan o dobi, broj dodatnih slučajeva bolesti koronarnih arterija zbog primjene estrogena i progestagena je jako nizak kod zdravih žena blizu menopauze, ali se povećava sa starijom životnom dobi.

Liječenje samo estrogenom:

Randomizirana kontrolirana ispitivanja ne ukazuju na povećan rizik od bolesti koronarnih arterija u histerektomiranih žena koje primjenjuju terapiju samim estrogenom.

#### Ishemijski moždani udar

Kombinirano liječenje estrogenom i progestagenom i liječenje samo estrogenom povezano je s povećanjem rizika od ishemijskog moždanog udara do 1,5 puta. Relativni rizik se ne mijenja sa životnom dobi ili vremenom od menopauze. Međutim, budući da osnovni rizik od moždanog udara jako ovisi o životnoj dobi, ukupni rizik od moždanog udara kod žena koje uzimaju HNL povećava se sa životnom dobi (vidjeti dio 4.8.).

#### Ostala stanja

- Estrogeni mogu uzrokovati retenciju tekućine, stoga se bolesnice s oštećenjem funkcije srca ili bubrega moraju pomno nadzirati.
- Pri liječenju estrogenom zabilježeni su rijetki slučajevi značajnog porasta triglicerida u plazmi koji mogu uzrokovati pankreatitis, stoga se mora pažljivo nadzirati žene s već postojećom hipertrigliceridemijom tijekom nadomjesnog liječenja estrogenom ili tijekom HNL-a.
- Egzogeni estrogen može izazvati ili pogoršati simptome nasljednog ili stečenog angioedema.
- Estrogeni povišuju globulin koji veže tiroidne hormone (TBG, engl. *thyroid binding globulin*) što vodi porastu ukupnih tiroidnih hormona u krvi izmjerenih kao jod vezan za proteine (PBI engl. *protein-bound iodine*), razina T4 (izmjerenih u koloni ili radioimunotestom) ili razina T3 (izmjerenih radioimunotestom). Smanjen je unos T3 rezina (smole), što odražava povišeni TBG. Koncentracije slobodnog T4 i T3 su nepromijenjene. Razine ostalih vezujućih proteina u serumu mogu biti povišene, npr. globulina koji veže kortikosteroide (CBG, engl. *corticoid binding globulin*), proteina koji veže spolne hormone (SHBG, engl. *sex-hormone-binding globulin*) što dovodi do povećane koncentracije cirkulirajućih kortikosteroida i spolnih hormona u plazmi. Koncentracije slobodnih ili biološki

aktivnih hormona su nepromijenjene. Ostali proteini plazme mogu biti povišeni (angiotenzinogen/supstrat renina, alfa-1-antitripsin, ceruloplazmin).

- HNL ne poboljšava kognitivnu funkciju. Postoje stanoviti dokazi o povećanom riziku od demencije u žena koje počnu koristiti kontinuirano kombinirano ili samo s estrogenom hormonsko nadomjesno liječenje nakon 65 godina starosti.
- Bolesnice s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, potpunim nedostatkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi smjele uzimati ovaj lijek.
- Ovo kombinirano estrogensko-progestagensko liječenje nije kontracepcijsko.

### **Povišenja ALT-a**

Tijekom kliničkih ispitivanja kombiniranog režima liječenja infekcije virusom hepatitisa C (HCV) ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirirom i dasabuvirom sa ili bez ribavirina, povišenja ALT-a viša od 5 puta iznad gornje granice normale (GGN) bila su značajno češća u žena koje su uzimale lijekove koji sadrže etinilestradiol, kao što su KHK. Nadalje, i među bolesnicama liječenima glekaprevirom/pibrentasvirom ili sofosbuvirom/velpatasvirom/voksilaprevirom, opažena su povišenja ALT-a u žena koje su uzimale lijekove koji sadrže etinilestradiol, kao što su KHK.

Žene koje su uzimale lijekove koji umjesto etinilestradiola sadrže druge estrogene, kao što je estradiol, zajedno s ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirirom i dasabuvirom sa ili bez ribavirina, imale su stopu povišenja ALT-a sličnu onoj u žena koje nisu primale nikakve estrogene; međutim, zbog ograničenog broja žena koje su uzimale te druge estrogene, opravdan je oprez kod istodobne primjene sa sljedećim kombiniranim režimima liječenja: ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirirom i dasabuvirom sa ili bez ribavirina; glekaprevirom/pibrentasvirom ili sofosbuvirom/velpatasvirom/voksilaprevirom. Vidjeti dio 4.5.

### **4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija**

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

#### Djelotvornost estrogena i progestagena može biti smanjena:

- Metabolizam estrogena i progestagena može biti povećan uz istodobnu primjenu tvari za koje je poznato da induciraju enzime koji metaboliziraju lijekove, posebno enzime citokroma P450, kao što su antikonvulzivi (npr. fenobarbital, karbamazepin, fenitoin) i antiinfektivi (npr. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).
- Ritonavir i nelfinavir, iako poznati kao snažni inhibitori, kad se uzimaju istodobno sa steroidnim hormonima imaju inducirajuća svojstva.
- Biljni pripravci koji sadrže gospinu travu (*Hypericum perforatum*) mogu inducirati metabolizam estrogena i progestagena.
- Klinički, povećan metabolizam estrogena i progestagena može dovesti do smanjenja učinka i promjena u profilu uterinog krvarenja.

#### **Učinak HNL-a s estrogenima na druge lijekove**

Pokazalo se da hormonski kontraceptivi koji sadrže estrogene značajno smanjuju koncentraciju lamotrigina u plazmi kada se primjenjuju istodobno zbog indukcije glukuronidacije lamotrigina. To može smanjiti kontrolu napadaja. Iako potencijalna interakcija između hormonske nadomjesne terapije i lamotrigina nije ispitana, očekuje se da slična interakcija postoji, što može dovesti do smanjenja kontrole napadaja kod žena koje uzimaju oba lijeka zajedno.

#### **Farmakodinamičke interakcije**

Tijekom kliničkih ispitivanja kombiniranog režima liječenja HCV-a ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirovom i sadabuvirom sa ili bez ribavirina, povišenja ALT-a viša od 5 puta iznad gornje granice normale (GGN) bila su značajno češća u žena koje su uzimale lijekove koji sadrže etinilestradiol, kao što su KHK-i. Dodatno, također u bolesnika liječenih glekaprevirom/pibrentasvirom ili sofosbuvirom/velpatasvirom/voksilaprevirom, zabilježena su povišenja ALT-a u žena koje su uzimale lijekove koji sadrže etinilestradiol kao što su KHK-i.

Žene koje su uzimale lijekove koji umjesto etinilestradiola sadrže druge estrogene, kao što je estradiol, zajedno s ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirovom i dasabuvirom sa ili bez ribavirina, imale su stopu povišenja ALT-a sličnu onoj u žena koje nisu primale nikakve estrogene; međutim, zbog ograničenog broja žena koje su uzimale te druge estrogene, opravdan je oprez kod istodobne primjene sa sljedećim kombiniranim režimima liječenja: ombitasvirom/paritaprevirom/ritonavirovom i dasabuvirom sa ili bez ribavirina; glekaprevirom/pibrentasvirom ili sofosbuvirom/velpatasvirom/voksilaprevirom (vidjeti dio 4.4).

#### 4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje

##### Trudnoća

Femoston conti mini nije indiciran tijekom trudnoće. Ako dođe do trudnoće tijekom primjene Femostona conti mini, liječenje se mora odmah prekinuti.

Ne postoje odgovarajući podaci o upotrebi estradiola/didrogesterona u trudnica. Rezultati većine dosadašnjih epidemioloških ispitivanja vezanih za nenamjernu izloženost fetusa kombinaciji estrogena i progestagena ne upućuju na teratogeni ili fetotoksični učinak.

##### Dojenje

Femoston conti mini nije indiciran tijekom dojenja.

##### Plodnost

Femoston conti mini nije indiciran za žene plodne dobi.

#### 4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Femoston conti mini ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i/ili rada sa strojevima.

#### 4.8. Nuspojave

Najčešće prijavljene nuspojave kod bolesnica liječenih estradiolom/didrogesteronom tijekom kliničkih ispitivanja su glavobolja, abdominalna bol, bol/osjetljivost dojki i bol u leđima.

Sljedeće nuspojave su zabilježene tijekom kliničkih ispitivanja (n=4929) s dolje naznačenim učestalostima.

\*Nuspojavama prijavljenim nakon stavljanja lijeka u promet, a koje nisu zabilježene tijekom kliničkih ispitivanja, dodijeljena je učestalost "rijetko".

| MedDRA<br>klasifikacija<br>organskih<br>sustava | Vrlo često<br>≥1/10 | Često<br>≥1/100, <1/10 | Manje često<br>≥1/1000, < 1/100 | Rijetko<br>≥1/10 000,<br><1/1000 |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

| <b>MedDRA<br/>klasifikacija<br/>organskih<br/>sustava</b>                                                  | <b>Vrlo često<br/>≥1/10</b> | <b>Često<br/>≥1/100, &lt;1/10</b>                                                     | <b>Manje često<br/>≥1/1000, &lt; 1/100</b>                                                                                                      | <b>Rijetko<br/>≥1/10 000,<br/>&lt;1/1000</b>                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infekcije i<br/>infestacije</b>                                                                         |                             | Vaginalna<br>kandidijaza                                                              | Simptomi slični<br>cistitisu                                                                                                                    |                                                                                 |
| <b>Dobroćudne,<br/>zloćudne i<br/>nespecificirane<br/>novotvorine<br/>(uključujući ciste<br/>i polipe)</b> |                             |                                                                                       | Porast veličine<br>leiomioma                                                                                                                    |                                                                                 |
| <b>Poremećaji krvi i<br/>limfnog sustava</b>                                                               |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                 | Hemolitička<br>anemija*                                                         |
| <b>Poremećaji<br/>imunološkog<br/>sustava</b>                                                              |                             |                                                                                       | Preosjetljivost                                                                                                                                 |                                                                                 |
| <b>Psihijatrijski<br/>poremećaji</b>                                                                       |                             | Depresija, nervoza                                                                    | Utjecaj na libido                                                                                                                               |                                                                                 |
| <b>Poremećaji<br/>živčanog sustava</b>                                                                     | Glavobolja                  | Migrena,<br>omaglica                                                                  |                                                                                                                                                 | Meningeom*                                                                      |
| <b>Poremećaji oka</b>                                                                                      |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                 | Povećanje<br>zakrivljenosti<br>rožnice*,<br>nepodnošljivost<br>kontaktnih leća* |
| <b>Srčani<br/>poremećaji</b>                                                                               |                             |                                                                                       |                                                                                                                                                 | Infarkt miokarda                                                                |
| <b>Krvožilni<br/>poremećaji</b>                                                                            |                             |                                                                                       | Venska<br>tromboembolija,<br>hipertenzija,<br>periferna<br>vaskularna bolest,<br>varikozne vene                                                 | Moždani udar*                                                                   |
| <b>Poremećaji<br/>probavnog<br/>sustava</b>                                                                | Abdominalna bol             | Mučnina,<br>povraćanje,<br>abdominalna<br>distenzija<br>(uključujući<br>flatulenciju) | Dispepsija                                                                                                                                      |                                                                                 |
| <b>Poremećaji jetre<br/>i žuči</b>                                                                         |                             |                                                                                       | Abnormalna<br>jetrena funkcija,<br>katkada sa<br>žuticom,<br>astenijom ili<br>malaksalošću, te<br>bol u abdomenu,<br>bolesti žučnog<br>mjechura |                                                                                 |
| <b>Poremećaji kože</b>                                                                                     |                             | Alergijske kožne                                                                      |                                                                                                                                                 | Angioedem,                                                                      |

| <b>MedDRA<br/>klasifikacija<br/>organskih<br/>sustava</b>   | <b>Vrlo često<br/>≥1/10</b> | <b>Često<br/>≥1/100, &lt;1/10</b>                                                                                                                                                   | <b>Manje često<br/>≥1/1000, &lt; 1/100</b> | <b>Rijetko<br/>≥1/10 000,<br/>&lt;1/1000</b>                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>i potkožnog tkiva</b>                                    |                             | reakcije (npr. osip, urtikarija, svrbež)                                                                                                                                            |                                            | vaskularna purpura, nodozni eritem*, kloazma ili melazma koje se mogu zadržati i nakon prestanka uzimanja lijeka* |
| <b>Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</b> | Bol u leđima                |                                                                                                                                                                                     |                                            | Grčevi u nogama*                                                                                                  |
| <b>Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki</b>            | Bol/osjetljivost dojki      | Poremećaji ciklusa (uključujući postmenopauzalno točkasto krvarenje, metroragiju, menoragiju, oligo/amenoreju, neredoviti ciklus, dismenoreju), bol u zdjelici, cervikalni iscjedak | Povećanje grudi, "predmenstrualni sindrom" |                                                                                                                   |
| <b>Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene</b>        |                             | Astenična stanja (astenija, umor, malaksalost) periferni edem                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                   |
| <b>Pretrage</b>                                             |                             | Povećanje tjelesne težine                                                                                                                                                           | Smanjenje tjelesne težine                  |                                                                                                                   |

#### Rizik od raka dojke

- Zabilježen je do 2 puta povećan rizik od raka dojke kod žena koje uzimaju kombinaciju estrogena i progestagena dulje od 5 godina
- Povećani rizik kod žena pri primjeni samo estrogenskog liječenja niži je od onoga primijećenog kod žena pri primjeni kombiniranog estrogensko-progestagenskog liječenja.
- Stupanj rizika ovisi o duljini primjene (vidjeti dio 4.4.)
- U nastavku su prikazane procjene apsolutnog rizika na temelju rezultata najvećeg randomiziranog placebom kontroliranog ispitivanja (ispitivanje WHI) i najveće metaanalize prospektivnih epidemioloških ispitivanja.

#### **Najveća metaanaliza prospektivnih epidemioloških ispitivanja**

**Procijenjeni dodatni rizik od raka dojke nakon 5 godina primjene kod žena s indeksom tjelesne mase (ITM) 27 kg/m<sup>2</sup>**

| Dob na početku HNL-a (u godinama)                                                                                                                             | Incidencija na 1000 žena koje nikad nisu koristile HNL tijekom 5 godina (50-54 godine) <sup>a</sup> | Omjer rizika | Dodatni slučajevi na 1000 žena koje su koristile HNL nakon 5 godina |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Samo estrogenski HNL</b>                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |                                                                     |
| 50                                                                                                                                                            | 13,3                                                                                                | 1,2          | 2,7                                                                 |
| <b>Kombinirani estrogensko-progestagenski HNL</b>                                                                                                             |                                                                                                     |              |                                                                     |
| 50                                                                                                                                                            | 13,3                                                                                                | 1,6          | 8,0                                                                 |
| Napomena: Budući da se osnovna incidencija raka dojke razlikuje u državama članicama EU-a, broj dodatnih slučajeva raka dojke proporcionalno će se mijenjati. |                                                                                                     |              |                                                                     |

<sup>a</sup>Prema stopama osnovne incidencije u Engleskoj 2015. kod žena s ITM-om od 27 (kg/m<sup>2</sup>).

#### Procijenjeni dodatni rizik od raka dojke nakon 10 godina primjene kod žena s ITM-om od 27 (kg/m<sup>2</sup>)

| Dob na početku HNL-a (u godinama)                                                                                                                           | Incidencija na 1000 žena koje nikad nisu koristile HNL tijekom 10 godina (50-59 godina) <sup>a</sup> | Omjer rizika | Dodatni slučajevi na 1000 žena koje su koristile HNL, nakon 10 godina |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Samo estrogenski HNL</b>                                                                                                                                 |                                                                                                      |              |                                                                       |
| 50                                                                                                                                                          | 26,6                                                                                                 | 1,3          | 7,1                                                                   |
| <b>Kombinirani estrogensko-progestagenski HNL</b>                                                                                                           |                                                                                                      |              |                                                                       |
| 50                                                                                                                                                          | 26,6                                                                                                 | 1,8          | 20,8                                                                  |
| Napomena: Budući da se osnovna incidencija raka dojke razlikuje u zemljama EU-a, broj dodatnih slučajeva raka dojke također će se proporcionalno mijenjati. |                                                                                                      |              |                                                                       |

<sup>a</sup> Prema stopama osnovne incidencije u Engleskoj 2015. kod žena s ITM-om od 27 (kg/m<sup>2</sup>).

#### WHI ispitivanje u SAD-u – dodatan rizik od raka dojke nakon 5-godišnje primjene

| Raspon godina                              | Incidencija na 1000 žena u skupini koja je uzimala placebo tijekom 5 godina | Omjer rizika i 95% CI | Dodatni slučajevi na 1000 žena koje su na HNL-u tijekom 5 godina (95% CI) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>CEE samo estrogen</b>                   |                                                                             |                       |                                                                           |
| 50-79                                      | 21                                                                          | 0,8 (0,7 – 1,0)       | -4 (-6 – 0) <sup>b</sup>                                                  |
| <b>CEE + MPA – estrogen i progestagen‡</b> |                                                                             |                       |                                                                           |
| 50-79                                      | 17                                                                          | 1,2 (1,0 – 1,5)       | +4 (0 – 9)                                                                |

‡ Kad je analiza bila ograničena na žene koje nisu primjenjivale HNL prije ispitivanja, porast rizika nije bio očit tijekom prvih 5 godina liječenja; nakon 5 godina rizik je bio veći nego kod žena koje nisu primjenjivale HNL

<sup>b</sup> WHI ispitivanje u žena bez maternice koje nisu pokazivale povećan rizik od raka dojke

#### Rizik od raka endometrija

Postmenopauzalne žene s očuvanom maternicom:

U žena s očuvanom maternicom koje ne uzimaju HNL, rizik je otprilike pet dijagnoza raka endometrija na 1000 žena.

U žena s očuvanom maternicom ne preporuča se samo estrogenska primjena HNL-a jer povećava rizik od raka endometrija (vidjeti dio 4.4.). Ovisno o trajanju primjene i dozi estrogena, u epidemiološkim ispitivanjima se porast rizika od raka endometrija kretao između 5 i 55 novih slučajeva na 1000 žena u dobi između 50 i 65 godina.

Dodavanjem progestagena liječenju samo estrogenom najmanje 12 dana po ciklusu može smanjiti porast rizika. U MWS ispitivanju primjena kombiniranog HNL-a (sekvencijsko ili kontinuirano) tijekom pet godina nije povećala rizik raka endometrija (relativni rizik od 1,0 (0,8-1,2)).

#### Rak jajnika

Uporaba hormonske nadomjesne terapije (HNT) koja sadrži samo estrogen i ili kombinaciju estrogena i progestagena povezuje se s blago povećanim rizikom od dijagnoze raka jajnika (vidjeti dio 4.4.).

Meta-analiza 52 epidemiološke studije ukazala je na povećani rizik od nastanka raka jajnika u žena koje trenutno primaju hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) u usporedbi sa ženama koje nikada nisu primale hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) (RR 1,43, 95 %CI, 1,31-1,56). U žena u dobi od 50 do 54 godine koje primaju hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT) 5 godina to rezultira otprilike jednim dodatnim slučajem na 2000 korisnica. U žena u dobi od 50 do 54 godine koje ne primaju hormonsku nadomjesnu terapiju (HNT), otprilike dvjema ženama od 2000 bit će dijagnosticiran rak jajnika u razdoblju od 5 godina.

#### Rizik od venske tromboembolije

HNL je povezano s porastom relativnog rizika od razvoja venske tromboembolije (VTE), tj. duboke venske tromboze ili plućne embolije od 1,3 do 3 puta. Veća je vjerojatnost da do pojave toga dođe u prvoj godini primjene HNL-a (vidjeti dio 4.4.). Prikazani su rezultati WHI ispitivanja:

#### **WHI ispitivanje – dodatan rizik od VTE-a tijekom 5-godišnje primjene**

| Raspon godina                                | Incidencija na 1000 žena u skupini koja je uzimala placebo tijekom 5 godina | Omjer rizika i 95% CI | Dodatni slučajevi na 1000 žena koje su na HNL-u |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Samo oralni estrogen <sup>c</sup>            |                                                                             |                       |                                                 |
| 50-59                                        | 7                                                                           | 1,2 (0,6 – 2,4)       | 1 (-3 – 10)                                     |
| Kombinacija oralnog estrogena i progestagena |                                                                             |                       |                                                 |
| 50-59                                        | 4                                                                           | 2,3 (1,2 – 4,3)       | 5 (1 – 13)                                      |

<sup>c</sup> ispitivanje na ženama bez maternice

#### Rizik od bolesti koronarnih arterija

Zabilježen je mali porast rizika od bolesti koronarnih arterija kod žena starijih od 60 godina na kombiniranom estrogensko-gestagenskom HNL-u (vidjeti dio 4.4.).

#### Rizik od ishemijskog moždanog udara

Kombinirano liječenje estrogenom i progestagenom ili liječenje samo estrogenom povezano je s porastom relativnog rizika od ishemijskog moždanog udara do 1,5 puta. Rizik od hemoragijskog moždanog udara ne povećava se tijekom primjene HNL-a.

Relativni rizik ne mijenja se sa životnom dobi ili duljinom primjene, no osnovni rizik od moždanog udara jako ovisi o životnoj dobi, stoga se ukupni rizik od moždanog udara kod žena koje primjenjuju HNL povećava sa životnom dobi (vidjeti dio 4.4.).

#### **WHI kombinirano ispitivanje – dodatan rizik od ishemijskog moždanog udara<sup>d</sup> tijekom 5-godišnje primjene**

| Raspon godina | Incidencija na 1000 žena u skupini koja je uzimala placebo tijekom 5 godina | Omjer rizika i 95% CI | Dodatni slučajevi na 1000 žena koje su na HNL-u tijekom 5 godina |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 50-59         | 8                                                                           | 1,3 (1,1–1,6)         | 3 (1-5)                                                          |

<sup>d</sup>nije razlikovan ishemijski i hemoragijski moždani udar

### **Ostale prijavljene nuspojave koje su povezane s estrogenskim/progestagenskim liječenjem**

#### Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine:

Dobroćudne i zloćudne novotvorine ovisne o estrogenu, npr. rak endometrija, rak jajnika. Povećanje veličine meningeoma.

#### Poremećaji imunološkog sustava:

Sistemska eritematozni lupus

#### Poremećaji metabolizma i prehrane:

Hipertrigliceridemija

#### Poremećaji živčanog sustava:

Vjerojatna demencija, koreja (chorea), egzacerbacija epilepsije

#### Krvožilni poremećaji:

Arterijska tromboembolija

#### Poremećaji probavnog sustava:

Pankreatitis (kod žena s postojećom hipertrigliceridemijom)

#### Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Multiformni eritem

#### Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava:

Inkontinencija urina

#### Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki:

Fibrocistične promjene u dojkama, erozija cerviksa maternice

#### Prirođeni, obiteljski i genetski poremećaji:

Pogoršanje porfirije

#### Pretrage:

Porast ukupnih tiroidnih hormona

#### Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

### **4.9. Predoziranje**

Estradiol i didrogesteron su tvari niske toksičnosti. U slučaju predoziranja mogu se pojaviti simptomi kao što su mučnina, povraćanje, osjetljivost dojki, omaglica, abdominalna bol, omamljenost/umor i krvarenje zbog ustezanja. Ne očekuje se da bi bilo potrebno bilo koje specifično ili simptomatsko liječenje.

Navedene informacije odnose se i za slučaj predoziranja kod djece.

## 5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

### 5.1. Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav, Kombinacije progestagena i estrogena, ATK oznaka: G03FA14

#### Estradiol

Djelatna tvar, sintetski 17 $\beta$ -estradiol, kemijski je i biološki identičan endogenom humanom estradiolu. Nadomješta smanjeno stvaranje estrogena kod žena u menopauzi i ublažava menopauzalne simptome.

#### Didrogesteron

Didrogesteron je oralno aktivan progestagen čija se djelotvornost može usporediti s onim primijenjenim parenteralno.

Kako estrogeni potiču rast endometrija, estrogeni bez hormonske ravnoteže povećavaju rizik od razvoja hiperplazije i raka endometrija. Dodatak progestagena značajno smanjuje estrogenom izazvan rizik od hiperplazije endometrija kod nehisterektomiranih žena.

#### Podaci iz kliničkih ispitivanja

- Ublažavanje simptoma uslijed nedostatka estrogena i krvarenja
- Ublažavanje simptoma menopauze postignuto je u prvih nekoliko tjedana liječenja.

Smanjenje umjerenih do teških navala vrućine s Femostonom conti mini bilo je statistički značajno u odnosu na placebo od 4. tjedna na dalje. Broj umjerenih do teških navala vrućine dalje se smanjivao do kraja liječenja u 13. tjednu.

U dva ispitivanja je amenoreja (izostanak krvarenja ili točkasto krvarenje) uočena u 91% odnosno 88% žena tijekom 10.-12. mjeseca liječenja. Tijekom prva 3 mjeseca liječenja pojavilo se nepravilno ili točkasto krvarenje kod 10% odnosno 21% žena te kod 9% i 12% tijekom 10.-12. mjeseca liječenja

### 5.2. Farmakokinetička svojstva

#### Estradiol

##### Apsorpcija:

Apsorpcija estradiola ovisi o veličini čestica: mikronizirani estradiol brzo se apsorbira iz gastrointestinalnog trakta.

U sljedećoj su tablici prikazani srednji farmakokinetički parametri stanja dinamičke ravnoteže estradiola (E2), estrona (E1) i estron sulfata (E1S) za svaku dozu mikroniziranog estradiola. Navedene su srednje vrijednosti (standardna devijacija, SD).

| Estradiol 0,5 mg            |             |             |                             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Parametar                   | E2          | E1          | Parametar                   | E1S         |
| C <sub>max</sub><br>(pg/ml) | 34,8 (30,4) | 182 (110)   | C <sub>max</sub><br>(ng/ml) | 6,98 (3,32) |
| C <sub>min</sub><br>(pg/ml) | -           | -           | -                           | -           |
| C <sub>av</sub><br>(pg/ml)  | 21,5 (16,0) | -           | -                           | -           |
| AUC 0- $\tau$               | 516 (383)   | 2959 (2135) | AUC 0- $\tau$               | 82,0 (42,6) |

|           |  |  |           |  |
|-----------|--|--|-----------|--|
| (pg*h/ml) |  |  | (ng*h/ml) |  |
|-----------|--|--|-----------|--|

#### Distribucija:

Estrogeni se nalaze ili nevezani ili vezani. Oko 98 - 99% doze estradiola veže se za proteine plazme, od čega oko 30 - 52% za albumin i oko 46 - 69% za globulin koji veže spolne hormone (SHBG).

#### Biotransformacija:

Estradiol se opsežno metabolizira nakon oralne primjene. Glavni nekonjugirani i konjugirani metaboliti su estron i estron sulfat. Ovi metaboliti mogu pridonijeti estrogenskim učincima neposredno ili nakon pretvorbe u estradiol. Estron sulfat može proći enterohepatičku cirkulaciju.

#### Eliminacija:

Glavni spojevi u urinu su glukuronidi estrona i estradiola. Poluvrijeme eliminacije je između 10 i 16 sati. Estrogeni se izlučuju u majčino mlijeko.

#### Ovisnost doze i vremena:

Nakon dnevne oralne primjene Femostona koncentracije estradiola su postigle stanje dinamičke ravnoteže nakon otprilike pet dana.

Općenito, izgleda da se koncentracije u stanju dinamičke ravnoteže postignu unutar 8 do 11 dana primjene.

#### Didrogesteron

##### Apsorpcija:

Nakon oralne primjene didrogesteron se brzo apsorbira s  $T_{max}$  između 0,5 i 2,5 sati. Apsolutna biorasploživost didrogesterona (20 mg oralne doze naspram 7,8 mg intravenske infuzije) je 28%.

Iduća tablica prikazuje srednje farmakokinetičke parametre za stanje dinamičke ravnoteže didrogesterona (D) i dihidrodidrogesterona (DHD). Navedene su srednje vrijednosti (SD).

| <b>Didrogesteron 2,5 mg</b> |                 |             |
|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Parametar                   | D               | DHD         |
| C <sub>max</sub> (ng/ml)    | 0,759 (0,313)   | 18,9 (7,22) |
| C <sub>min</sub> (ng/ml)    | 0,0309 (0,0209) | -           |
| C <sub>av</sub> (ng/ml)     | 0,117 (0,0455)  | -           |
| AUC 0-τ (ng*h/ml)           | 2,81 (1,09)     | 90,4 (44,1) |

#### Distribucija:

Nakon intravenske primjene didrogesterona volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže je oko 1400 l. Didrogesteron i DHD se vežu za proteine plazme više od 90%.

#### Biotransformacija:

Didrogesteron se brzo metabolizira u DHD nakon oralne primjene. Razine glavnog aktivnog metabolita 20 α-dihidrodidrogesterona (DHD) postižu vrhunac oko 1,5 sat nakon primjene. Koncentracije DHD-a u plazmi su znatno više od matičnog lijeka. Omjeri AUC-a i C<sub>max</sub>-a za DHD i didrogesteron su 40 i 25. Prosječno terminalno poluvrijeme didrogesterona varira između 5 i 7, a DHD-a između 14 i 17 sati. Zajedničko svojstvo svih okarakteriziranih metabolita je zadržavanje 4,6-dien-3-on strukture matičnog lijeka i odsutnost 17α-hidroksilacije. Time se objašnjava nedostatak estrogenskih i androgenih učinaka didrogesterona.

#### Eliminacija:

Nakon oralne primjene obilježenog didrogesterona prosječno se u urinu izluči 63% doze. Ukupni

plazmatski klirens je 6,4 l/min. Unutar 72 sata izlučivanje je potpuno. DHD se u urinu pojavljuje uglavnom kao konjugat glukuronske kiseline

#### Ovisnost doze i vremena:

Farmakokinetika pojedinačne i višestrukih doza je linearna u rasponu oralnih doza od 2,5 do 10 mg. Usporedba kinetike pojedinačne i višestrukih doza pokazala je da farmakokinetika didrogesterona i DHD-a nije promijenjena kao posljedica ponavljano doziranja. Stanje dinamičke ravnoteže je postignuto nakon 3 dana liječenja.

### **5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene**

Ne postoje neklinički podaci o sigurnosti primjene koji bi mogli biti od važnosti propisivaču lijeka u ciljnoj populaciji, a da nisu već navedeni u drugom dijelovima Sažetka opisa svojstava lijeka (SPC).

#### Procjena rizika za okoliš (ERA)

Ovaj lijek može predstavljati rizik za vođeni okoliš. Lijekove koji bolesniku nisu potrebni se ne smije bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima ili vratiti u ljekarnu (vidjeti dio 6.6.).

## **6. FARMACEUTSKI PODACI**

### **6.1. Popis pomoćnih tvari**

#### Jezgra tablete:

laktoza hidrat  
hipromeloza  
kukuruzni škrob  
silicijev dioksid, koloidni, bezvodni  
magnezijev stearat

#### Ovojnica:

makrogol 3350  
poli(vinilni alkohol)  
talk  
titanijev dioksid (E171)  
željezov oksid, žuti (E172)

### **6.2. Inkompatibilnosti**

Nije primjenjivo.

### **6.3. Rok valjanosti**

Femoston conti mini 0,5 mg/2,5 mg:  
4 godine

### **6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

#### **6.5. Vrsta i sadržaj spremnika**

Kalendarsko pakiranje s 28 tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

#### **6.6. Posebne mjere za zbrinjavanje**

Ovaj lijek može predstavljati rizik za vodeni okoliš. Lijekove koji bolesniku nisu potrebni se ne smije bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima ili vratiti u ljekarnu (vidjeti dio 5.3.).

### **7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Theramex Ireland Limited  
3rd Floor, Kilmore House, Park Lane  
Spencer Dock, Dublin 1  
Irska

### **8. BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

HR-H-831928897

### **9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA**

Datum prvog odobrenja: 25.03.2013.  
Datum posljednje obnove odobrenja: 27.04.2020.

### **10. DATUM REVIZIJE TEKSTA**

15. kolovoza 2025.