

## **Sažetak opisa svojstava lijeka**

### **1. NAZIV LIJEKA**

Strepsils 0,6 mg/1,2 mg pastile bez šećera s okusom limuna

### **2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV**

Jedna pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola i 1,2 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom:

Jedna pastila sadrži 459 mg maltitola (E965) i 1834 mg izomalta (E953) – vidjeti dio 4.4.

Pomoćne tvari koje sadrže alergene:

Aroma limuna u ovom lijeku sadrži: citral, citronelol, d-limonen, geraniol, linalool i benzilni alkohol (vidjeti dio 4.4.).

Za cijeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

### **3. FARMACEUTSKI OBLIK**

Pastila.

Bijela do bijedo žuta, okrugla pastila karakterističnog okusa limuna, sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

### **4. KLINIČKI PODACI**

#### **4.1 Terapijske indikacije**

Strepsils pastile bez šećera s okusom limuna indicirane su za ublažavanje simptoma infekcija usne šupljine i ždrijela u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

#### **4.2 Doziranje i način primjene**

Doziranje

Za ublažavanje simptoma lijek je potrebno primijeniti kratkotrajno u najnižim učinkovitim dozama.

Trajanje primjene

Preporučuje se lijek uzimati najviše 3 dana.

*Odrasli i adolescenti*

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata. Najviša dnevna doza je 12 pastila tijekom 24 sata.

*Pedijatrijska populacija*

Djeca starija od 6 godina: Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata. Najviša dnevna doza je 12 pastila tijekom 24 sata.

Djeca mlađa od 6 godina: Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina (vidjeti dio 4.3.).

### *Starije osobe*

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

### Način primjene

Za orofaringealnu primjenu. Pastilu polako otopiti u ustima.

Pastile ne bi trebalo uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

### **4.3 Kontraindikacije**

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.  
Djeca mlađa od 6 godina.

### **4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi**

Lijek je potrebno čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.

Ako simptomi nakon tri dana i dalje traju ili se pogoršaju, potrebno je obratiti se liječniku.

Lijek sadrži izomalt i maltitol sirup koji mogu imati blagi laksativni učinak ako se uzimaju više puta na dan.

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja fruktoze ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija. Ukupna najviša dnevna doza natrija (MDD) je 0,12 mmol.

Ovaj lijek sadrži aromu s citralom, citronelolom, d-limonenom, geraniolom, linaloolom i benzilnim alkoholom koji mogu izazvati alergijske reakcije.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet ako ste trudni ili dojite, ili ako imate bolesti jetre ili bubrega jer se velike količine benzilnog alkohola mogu nakupiti u Vašem tijelu i uzrokovati nuspojave (zvane "metabolička acidzoza").

### **4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija**

Nisu poznate klinički značajne interakcije.

### **4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje**

#### Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni amilmetakrezola i 2,4-diklorbenzilnog alkohola u trudnica ograničeni (manje od 300 trudnoća). Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavati primjenu lijeka Strepsils pastile bez šećera s okusom limuna tijekom trudnoće.

#### Dojenje

Nije poznato izlučuju li se amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol ili metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenčad/dojenčad.

Strepsils pastile bez šećera s okusom limuna se ne smiju koristiti tijekom dojenja.

#### Plodnost

Podaci o utjecaju na plodnost nisu dostupni.

#### **4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima**

Strepsils pastile bez šećera s okusom limuna ne utječu ili zanemarivo utječu na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

#### **4.8 Nuspojave**

Popis sljedećih nuspojava odnosi se na one zabilježene pri primjeni 2,4-diklobenzilnog alkohola i amilmetakrezola u dozama odobrenim za bezreceptni način izdavanja lijeka i pri kratkotrajnoj primjeni.

Nuspojave koje su bile povezane s 2,4-diklorbenzilnim alkoholom i amilmetakrezolom navedene su ispod, razvrstane prema organskom sustavu i učestalosti.

Učestalosti se definiraju kao:

Vrlo često ( $\geq 1/10$ )

Često ( $\geq 1/100$  i  $< 1/10$ )

Manje često ( $\geq 1/1000$  i  $< 1/100$ )

Rijetko ( $\geq 1/10\,000$  i  $< 1/1000$ )

Vrlo rijetko ( $< 1/10\,000$ )

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su navedene u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Organski sustav	Učestalost	Nuspojava
Poremećaji imunološkog sustava	Nepoznato	Preosjetljivost <sup>a b1</sup>
Poremećaji probavnog sustava	Nepoznato	Bol u abdomenu <sup>a b</sup> , mučnina <sup>a b</sup> , oralna nelagoda <sup>a b2</sup>

<sup>a</sup>2,4-diklorbenzilni alkohol

<sup>b</sup>amilmetakrezol

Opis odabranih nuspojava

<sup>1</sup> Reakcije preosjetljivosti mogu se pojaviti u obliku osipa, angioedema, urtikarije, bronhospazama i hipotenzija sa sinkopom.

<sup>2</sup> Oralna nelagoda može se pojaviti u obliku iritacije grla, oralne paresteze, edema usta i glosodinije.

#### Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

#### **4.9 Predoziranje**

S obzirom na prirodu i veličinu pakiranja Strepsils pastila bez šećera s okusom limuna, slučajno ili namjerno predoziranje je malo vjerojatno.

Predoziranje ne bi trebalo uzrokovati poteškoće, osim želučano-crijevne nelagode. Liječenje bi trebalo biti simptomatsko.

## **5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA**

### **5.1 Farmakodinamička svojstva**

Farmakoterapijska skupina: pripravci za liječenje bolesti grla, antiseptici, ATK oznaka: R02AA03.

2,4-diklorbenzilni alkohol i amilmetakrezol su antiseptici i imaju antibakterijska (baktericidna i bakteriostatska), antifungalna i antiviralna svojstva.

I 2,4-diklorbenzilni alkohol i amilmetakrezol reverzibilno blokiraju depolarizacijom inducirane ionske kanale na način sličan lokalnim anesteticima.

Kombiniranjem dvaju antiseptika, diklorbenzilnog alkohola i amilmetakrezola, opaža se sinergistički antibakterijski učinak koji rezultira smanjenjem kombinirane doze korištene u Strepsils pastilama u usporedbi sa svakom djelatnom tvari zasebno.

Antibakterijski i antifungalni učinak Strepsils pastila protiv mikroorganizama koji uzrokuju grlobolju ustanovljen je kako u *in vitro*, tako i u *in vivo* ispitivanjima, a antibakterijski i antifungalni učinak zabilježen je *in vitro* nakon jednominutnog kontakta na *S. pyogenes*, *S. aureus*, *H. influenza*, *M. catarrhalis*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *S. pneumoniae*, *B. parapetussis* i *C. albicans*, a *in vivo* je pokazano ukupno smanjenje broja bakterija. Dokazan je i *in vitro* antiviralni učinak 2,4-diklorbenzilnog alkohola i amilmetakrezola, kao i Strepsils pastila na virusu s ovojnicom, uključujući virusne influence A, parainfluence, respiratori sincicijski virus, citomegalovirus i koronavirus, nakon jednominutnog kontakta. Tijekom dugogodišnje uporabe Strepsils pastila u svijetu nije utvrđeno nikakvo smanjenje učinkovitosti protiv različitih patogena što ukazuje na to da ne dolazi do razvoja rezistencije.

U kliničkim ispitivanjima dokazan je analgetski učinak Strepsilsa na ublažavanje grlobolje, pružajući ublažavanje boli i olakšanje poteškoća kod gutanja s početkom djelovanja unutar 5 minuta i trajanjem do 2 sata. Olakšanje gutanja i boli bilo je veće kod uzimanja Strepsils pastila nego placebo ( $p<0,05$ ). Također je dokazano znatno veće olakšanje u usporedbi s olakšanjem nakon primjene placebo, pri trajanju liječenja do 3 dana ( $p<0,05$ ).

Također se pokazalo da Strepsils pastile značajno smanjuju post-operativnu grlobolju i promuklost od 20 minuta do 24 sata nakon intubacije.

Ispitivanje provedeno kod djece (u dobi 6 do 16 godina) s akutnom i kroničnom ponavljačicom grloboljom pokazalo je smanjenje subjektivnih i objektivnih simptoma grlobolje, u trajanju više od 3 dana.

### **5.2 Farmakokinetička svojstva**

DCBA se metabolizira u jetri gdje se stvara hipurna kiselina koje se izlučuje urinom. Nema dostupnih podataka o metabolizmu i eliminaciji amilmetakrezola.

Ispitivanje oralne bioraspoloživosti provedeno sa Strepsils pastilama pokazalo je brzo oslobađanje 2,4-diklorbenzilnog alkohola i amilmetakrezola u slinu, s postizanjem vršnih vrijednosti unutar 3-4 minute nakon primjene pastile. Udvоstručenje volumena sline uočeno je unutar minute i vrijednosti iznad početnih održale su se za vrijeme otapanja pastile, tijekom otprilike 6 minuta. Kvantitativno mjerljive količine djelatnih tvari izlučivale su se do 20-30 minuta nakon uzimanja doze; utvrđena koncentracija djelatnih tvari upućuje na produženo zadržavanje u mukozi ustiju i grla.

Scintigrafska ispitivanja sa Strepsils pastilama sa šećerom pokazala su prisutnost djelatnih tvari u ustima i grlu čak dva sata nakon konzumacije i postupnog otapanja pastile, pružajući dugotrajno olakšanje boli u grlu.

### **5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene**

LD<sub>50</sub> za 2,4-diklorbenzilni alkohol određena kod štakora iznosi 3 g po kg tjelesne težine. Na temelju ovih podataka, NOAEL (najviša razina bez opaženog štetnog učinka) za 2,4-diklorbenzilni alkohol utvrđena je kod dnevne doze od 100 mg po kg tjelesne težine kod ljudi.

Ispitivanja na životinjama nisu pokazala negativne učinke na tijek trudnoće niti na fetalni razvoj.

## **6. FARMACEUTSKI PODACI**

### **6.1 Popis pomoćnih tvari**

aroma limuna (sadrži: benzilni alkohol, d-limonen, geraniol, citral, citronelal, citronelol, cineol, ekstrakti smreke i borovice, ekstrakt limuna, ekstrakt limunske trave, ekstrakt lipe, ekstrakt limuna i limete, (R)-p-menta-1,8-dien, linalool, ekstrakt *Litsea cubeba*, 6-metilhept-5-en-2-on, ekstrakt *Iris florentina*, pin-2(10)-en, ekstrakt timijana)  
boja Quinoline Yellow (E104)  
saharinnatrij (E954)  
tartaratna kiselina  
tekući maltitol (E965)  
izomalt (E953)

### **6.2 Inkompatibilnosti**

Nije primjenjivo.

### **6.3 Rok valjanosti**

3 godine.

### **6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka**

Čuvati na temperaturi do 25 °C.

### **6.5 Vrsta i sadržaj spremnika**

PVC/PVdC/AI blister.

Pakiranje sadrži 16 (2x8) ili 24 (2x12) pastile u blisteru, u kutiji.

### **6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje**

Nema posebnih zahtjeva.

## **7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

Reckitt Benckiser d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 269D

10000 Zagreb

**8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET**

HR-H-088743684

**9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA**

Datum prvog odobrenja: 15. lipnja 1999.

Datum posljednje obnove: 24. listopada 2016.

**10. DATUM REVIZIJE TEKSTA**

11. listopad 2022.